Zool.

635

(19

Krüger jun: inv: et Del: 1794. allg: Reis: zu Wasser, ü: Land. T. 17. S. 486.

Herrn von Büffons

Naturgeschichte der Vögel.

Aus dem Französischen übersetzt,
mit Anmerkungen, Zusätzen und vielen Kupfern
vermehrt,
durch

Bernhard Christian Otto,

der W. und A. Doctor, Professor der Arzneywissenschaft zu Frankfurt an der Oder; der Schles. patriot. ökonom., der Lundischen physiograph. der Berlinischen und Hallischen Naturforschenden Gesellschaften Mitglied.

Neunzehnter Band.

Mit allergnädigstem Königl. Preuß. Privilegio.

Berlin, 1792.
Bey Joachim Pauli, Buchhändler.

N 4 4/15

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Inhalt

des neunzehnten Bandes

von

Büffons Naturgeschichte der Vögel.

Der Papagey. S. 7.
Die Papageyen der alten Welt.
Die Kakatuen. S. 35.
1. Der Kakatu mit der weißen Haube. S. 39.
2. Der Kakatu mit der gelben Haube. S. 41.
Anhang. S. 44.
3. Der Kakatu mit der rothen Haube. S. 45.
Anhang. S. 47.
4. Der kleine Kakatu mit dem fleischfarbenen Schnabel. S. 50.
Anhang. Der kleine rothbauchige Kakatu. S. 53.
5. Der schwarze Kakatu. S. 54.
Anhang. S. 57.
Die eigentlich sogenannten Papageyen. S. 57.
1. Der Jaco oder aschenfarbne Papagey. S. 58.
2. Der grüne Papagey. S. 78.
3. Der bunte Papagey. S. 81.
4. Der Vaza oder der schwarze Papagey. S. 84.

5. Der Maskarin. S. 87.
Anhang. S. 89.
6. Der Papagey mit dem blutfärbigen Schnabel. S. 93.
7. Der große grüne Papagey mit dem blauen Kopfe. S. 95.
8. Der Papagey mit dem grauen Kopfe. S. 96.

Die Lorys. S. 99.
1. Der Lori-Noira. S. 101.
Spielarten des Noira. S. 104.
Anhang. S. 106.
2. Der Lori mit dem Halsbande. S. 107.
3. Der dreyfarbige Lori. S. 110.
Anhang. S. 112.
4. Der karmosinfarbne Lori. S. 113.
Anhang. S. 115.
5. Der rothe Lori. S. 116.
6. Der rothe und violette Lori. S. 118.
7. Der große Lori. S. 119.

Die Sittich-Loris. S. 123.
1. Der rothe Sittich-Lori. S. 124.
2. Der violet und rothe Sittich-Lori. S. 126.
3. Der dreyfarbige Sittich-Lori. S. 128.

Die Sittiche aus der alten Welt.

Die Sittiche mit langem und gleichgestuftem Schwanze. S. 130.
Der große Sittich mit dem lebhaft rothen Halsbande. S. 131.
Anhang zu dem großen Sittich mit dem hellrothen Halsbande. S. 135.
Der Sittich mit dem doppelten Halsbande. S. 138.
Anhang. S. 140.
Der Sittich mit dem rothen Kopfe. S. 141.
Der Sittich mit dem blauen Kopfe. S. 143.
Der Lori-Sittich. S. 145.
Der gelbe Sittich. S. 148.
Der Sittich mit dem lasurblauen Kopfe. S. 150.
Anhang. S. 152.
Der Maus-Sittich. S. 153.
Der Sittich mit Knebelbärten. S. 155.
Anhang. S. 157.
Der Sittich mit dem blauen Gesichte. S. 158.
Der blaubäuchige Papagey. S. 161.
Der Sittich mit den verbrämten Flügeln. S. 165.

Sit-

Sittiche mit langem und ungleichem Schwanze aus der alten Welt.
Der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde. S. 165.
Der kleine Sittich mit dem rosenrothen Kopfe und den langen Schwanzfedern. S. 169.
Der große Sittich mit den langen Schwanzspitzen. S. 172.
Der große Sittich mit röthlichen Flügeln. S. 174.
Der Sittich mit der rothen Kehle. S. 176.
Der große Sittich mit der schwarzen Kopfbinde. S. 178.
Der grün und rothe Sittich. S. 181.
Der gehaubte Sittich. S. 183.
Die Sittiche mit kurzem Schwanze aus der alten Welt. S. 185.
Der Sittich mit dem blauen Kopfe. S. 187.
Der Sittich mit dem rothen Kopfe, oder der guineische Sperling. S. 191.
Der Coulacissi. S. 199.
Der Sittich mit vergoldeten Flügeln. S. 202.
Der Sittich mit dem grauen Kopfe. S. 204.
Der Sittich mit den bunten Flügeln. S. 206.
Der Sittich mit den blauen Flügeln. S. 208.
Der Sittich mit der Halsbinde. S. 209.
Der Sittich mit schwarzen Flügeln. S. 211.
Der Arimanon. S. 213.
Die Papageyen der neuen Welt.
Die Aras. S. 215.
Der rothe Ara. S. 218.
Anhang. S. 232.
Der blaue Ara. S. 238.
Anhang. S. 243.
Der grüne Ara. S. 245.
Der schwarze Ara. S. 254.
Zusatz. Der große grüne Ara des Edwards. S. 256.
Die Amazonen und die Kriks. S. 258.
Die Amazonenpapageyen. S. 264.
Die Amazoninpapagey mit gelben Kopfe. S. 265.
Anhang. S. 268.
Spielarten oder Gattungen, welche den Amazonen mit dem gelben Kopfe sehr nahe sind. S. 269.

Der Tarabe, oder die Amazonin mit rothem Kopfe. S. 272.
Die Amazoninpapagey mit dem weißen Kopfe. S. 273.
Die gelbe Amazonin. S. 277.
Anhang. S. 279.
Der Ajurucurau. S. 280.
Spielarten des Ajurucurau. S. 282.
Die Kriks. S. 293.
Der Krik mit dem gelben Kopfe und der gelben Kehle. S. 294.
Der Müller oder der gepuderte Krik. S. 298.
Der roth und blaue Krik. S. 300.
Der Krik mit blauem Gesichte. S. 303.
Der Krik. Fünfte Gattung. S. 305.
Der Krik mit dem blauen Kopfe. S. 308.
Spielarten des Kriks mit dem blauen Kopfe. S. 310.
Anhang. S. 315.
Der Krik mit dem violetten Kopfe. S. 516.
Die Papageyen. S. 320.

Anzeige der im neunzehnten Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Büffon enthaltenen Abbildungen.

1. Der Kakatu mit der weißen Haube. Büffon, Pl. 263. S. 39.
2. Der Kakatu mit der gelben Haube. Büffon, Pl. 14. S. 41.
3. Der Kakatu mit der rothen Haube. Büffon, Pl. 498. S. 45.
4. Der Kakatu mit dem fleischfarbenen Schnabel. Büffon, Pl. 191. S. 50.
5. Der schwarze Kakatu. Seligm. IX. Tab. 6. S. 54.
6. Der Jaco oder aschfarbne Papagey. Büffon, Pl. 311. S. 58.
7. Eben derselbe. Edwards, Tab. 163. S. 58.
8. Der grüne Papagey. Büffon, Pl. 514. S. 78.
9. Der bunte Papagey. Büffon, Pl. 526. S. 81.
10. Eben derselbe. Edwards, Tab. 165. S. 81.
11. Der Vaza, oder der schwarze Papagey. Büffon, Pl. 500. S. 84.

12. Der Maskarin. Büffon, Pl. 35. S. 87.
13. Der Papagey mit dem blutfarbigen Schnabel. Büffon, Pl. 713 S. 93.
14. Der große grüne Papagey mit dem blauen Kopfe. Büffon, Pl. 862. S. 95.
15. Der Papagey mit dem grauen Kopfe. Büffon, Pl. 288 S. 96.
16. Der Lori=Noira. Büffon, Pl. 216 S. 101.
17. Spielart des Noira. Frisch, Taf. 45. S. 104.
18. Der Lori mit dem Halsbande. Büffon, Pl. 119. S. 107.
19. Eben derselbe. Büffon, Pl. 84. S. 107.
20. Der dreyfarbige Lori, Büffon, Pl. 168. S. 110.
21. Der karmosinfarbne Lori. Büffon, Pl. 518. S. 113.
22. Der rothe Lori. Büffon, Pl. 519. S. 116.
23. Der rothe und violette Lori. Büffon, Pl. 684. S. 118.
24. Der große Lori. Büffon, Pl. 683. S. 119.
25. Der rothe Sittich=Lori. Edwards, 4. tab. 173. S. 124.
26. Der violet und rothe Sittich=Lori. Büffon, Pl. 141. S. 126.
27. Der dreyfarbige Sittich=Lori. Büffon, Pl. 240. S. 128.
28. Der große Sittich mit dem lebhaft rothen Halsbande. Büffon, Pl. 642. S. 131.
29. Der Sittich mit dem doppelten Halsbande. Büffon, Pl. 215. S. 138.
30. Der Sittich mit dem rothen Kopfe. Büffon, Pl. 264. S. 141.
31. Der Sittich mit dem blauen Kopfe. Büffon, Pl. 192. S. 143.
32. Der Lori=Sittich. Büffon, Pl. 552. S. 145.
33. Der gelbe Sittich. Frisch, Taf. 53. S. 148.
34. Der Sittich mit dem lasurblauen Kopfe. Seligmann, VIII. Tab. 82. Fig. 2. S. 150.
35. Der Maus=Sittich. Büffon, Pl. 768. S. 153.
36. Der Sittich mit Knebelbärten. Büffon, Pl. 517. S. 155.
37. Der Sittich mit dem blauen Gesichte. Büffon, Pl. 61. S. 158.
38. Der molukkische Sittich. Büffon, Pl. 743. S. 160.
39. Der Sittich mit verbrämten Flügeln. Büffon. Pl. 287, S. 163.
40. Der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde. Büffon. Pl. 551. S. 165.

41.

41. Der kleine Sittich mit dem rosenrothen Kopfe und den langen Schwanzfedern. Büffon, Pl. 888. S. 169.
42. Der große Sittich mit den langen Schwanzspitzen. Büffon. Pl. 887. S. 172.
43. Der große Sittich mit röthlichen Flügeln. Büffon, Pl. 239. S. 174.
44. Der Sittich mit der rothen Kehle. Seligmann, VII. tab. 24. S. 176.
45. Der große Sittich mit der schwarzen Kopfbinde. Seba Thes. Tab. 38. Fig. 4. S. 178.
46. Der Sittich mit dem blauen Kopfe. Büffon, Pl. 190. Fig. 2. S. 187.
47. Der Sittich mit dem rothen Kopfe. Büffon, Pl. 60. S. 191.
48. Der kleine grün und rothe Sittich. Seligmann I, Taf. 11. S. 191.
49. Der Coulacissi. Büffon, Pl. 520. Männchen und Weibchen. S. 199.
50. Der Sittich mit vergoldeten Flügeln. Seligmann VIII. Taf. 38. Fig. 2. S. 202.
51. Der Sittich mit dem grauen Kopfe. Büffon, Pl. 791. Fig. 2. S. 204.
52. Der Sittich mit den bunten Flügeln. Büffon, Pl. 791. Fig. 1. S. 206.
53. Der Sittich mit blauen Flügeln. Pl. 455. Fig. 1. S. 208.
54. Der Sittich mit der Halsbinde. Sonnerat Guinea, Tab. 39. S. 209.
55. Der Sittich mit schwarzen Flügeln. Sonnerat, Tab. 4. S. 211.
56. Der Arimanon. Büffon, Pl. 455. Fig. 2. S 213.
57. Der große rothe Ara. Büffon, Pl. 12. S. 218.
58. Der kleine rothe Ara. Büffon, Pl. 641. S. 218.
59. Der blaue Ara. Büffon, Pl. 36. S. 238.
60. Der grüne Ara. Büffon, Pl. 383. S. 245.
61. Der große grüne Ara. Seligmann IX, Tab. 2. S. 256.
62. Der gelbköpfige Amazonen = Papagey. Büffon, Pl. 312. S. 269.
63. Der Amazonen = Papagey mit dem weißen Kopfe. Büffon, Pl. 549. S. 273.
64. Eben derselbe. Büffon, Pl. 335. S. 273.
65. Die gelbe Amazonin. Büffon, Pl. 13. S. 277.
66. Der Ajurucurau. Büffon, Pl. 547. S. 280.

67. Abart des Ajurucurau. Seligmann VI. Tab. 57. S. 289.
68. Der Krik mit dem gelben Kopfe. Frisch, Taf. 48. S. 294.
69. Der Müller, oder der gepuderte Krik. Büffon, Pl. 861. S. 298.
70. Der Krik mit blauem Gesichte. Büffon, Pl. 360. S. 303.
71. Der Krik. Büffon, Pl. 839. S. 305.
72. Der Krik mit dem blauen Kopfe. Seligmann VI. Tab. 12. S. 308.
73. Abart des Kriks mit dem blauen Kopfe. Seligmann VI. Tab. 59. S. 311.
74. Eine andere dergleichen. Seligmann VI. Tab. 56. S. 313.
75. Der taplirte Papagey. Büffon, Pl. 120. S. 316.

Der

Herrn von Büffons

Naturgeschichte der Vögel.

XIX. Band.

1792.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Der Papagey. a) 1)

Die Thiere, die der Mensch am meisten bewundert hat, sind diejenigen, die ihm geschienen haben an seiner Natur Theil zu haben; er ist jedesmal erstaunt, wenn er eins gesehen hat,

a) Ψιττακη, griechisch. Παπαγας, neugriechisch. Lateinisch, Psittacus; Deutsch Sittich, Papagey; Sittich heißen eigentlich die Perruches, und Papagey die großen Perroquets. Englisch Poppinjay, Poppingay (die Perroquets); Maccavs, (die Aras); Perroqueets, (die Perruchen); Spanisch Papagio; Italienisch, Papagallo (die Perroquets), Peroquetto, (die Perruches); Illyrisch, Pappauseck; Polnisch, Papuga; Türkisch Dadi; Altmexikanisch Tuznena, nach de Laet; Brasilianisch, Ajuru; und die Perruches Tui (Marcgr.) Altfranzösisch, Papegaut, von Papagallus, Papagallo; worin Aldrovand einen Ausdruck von Würde und Vortreflichkeit dieses Vogels zu finden glaubt, welchen seine Fähigkeiten

welches einige menschliche Handlungen vornahm, oder nachahmte, der Affe, vermittelst der Aehnlichkeit seiner äußern Bildung, und der Papagey wegen der Nachahmung der Rede, haben ihm mit besonten und Schönheit als den Pabst der Vögel betrachten läßt, *Aldr.* I. p. 635.

V.

1) Psittacus. Rostrum aduncum: mandibula superiore mobili vera instructa. Nares in rostri basi. Lingua carnosa, obtusa, integra. Pedes scansorii. *Linne syst. nat.* XII. p. 139. Gen. 45. XIII. I. p. 312.

Psittaci. Digiti quatuor membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti. Crura ad calcaneum usque plumosa: Rostrum breve, aduncum, superne convexum, cujus crassities latitudinem superat. *Briss. oruith.* in 8. Tom. II. p. 93. Gen. LIII. Nach Brisson sind

Arae, Franz. Arus, engl. Maccaos, die großen langgeschwänzten.

Cacatuae, Franz. Kakatoes, engl. Cackatoons, große meist weiße kurzschwänzige.

Lorii, Franz. und engl. Lorys, große kurzschwänzige, meist rothe.

Psittaci, franz. Perroquets, engl. Parrots, große bunte.

Psittacae, franz. Perruches, engl. lang tailed Parakeets, kleine langschwänzige.

Psittaculae, franz. Petites Perruches, engl. Parrakeets, kleine kurzschwänzige.

Psittacus. Möhring Geuer. Av. p. 48. Gen. 41.

O.

besondern Vorrechten begabte Wesen, Wesen die zwischen dem Menschen und Thier mitten inne stehen, geschienen: ein falsches Urtheil, das durch den ersten Anschein entstanden ist, aber durch Prüfung und Nachdenken bald widerlegt wird. Die Wilden, die gegen den großen Schauplatz der Natur sehr unempfindlich, sehr gleichgültig gegen alle ihre Wunder sind, haben durch nichts können in Erstaunen gebracht werden, als durch den Anblick der Affen und Papageyen. Diese nur sind die Thiere, die ihre dumme Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Sie halten mit ihren Kanots ganze Stunden an, um die Sprünge des Sapajous zu betrachten; und die Papageyen sind die einzigen Vögel die sie mit Vergnügen ernähren und erziehen, und die sie auszubilden sich die Mühe nehmen; denn sie haben die kleine Kunst, die unter uns noch unbekannt ist, gefunden, die schönen Farben, die das Gefieder dieser Vögel schmücken, mannigfaltiger und reicher zu machen. b)

Der Gebrauch der Hände, das Gehen auf zwey Füßen, die, obgleich plumpe Aehnlichkeit des Gesichts; der Mangel des Schwanzes, der bloße

b) Man nennet die Perroquets Tapirés, denen die Wilden künstliche Farben geben. Wie man sagt, geschiehet dieses mit Froschblut, welches sie tropfenweise in die kleinen Wunden junger Papageyen fallen lassen, indem sie ihnen die Federn ausreißen. Die Federn, welche wieder wachsen, verändern die Farbe und werden, wenn sie grün oder gelb waren, pomeranzenfarbig, rosenroth oder buntstreifig, nachdem die Mittel sind, welche sie anwenden.

Hintere, die Gleichförmigkeit der Geschlechtstheile, die lage der Brüste, die monatliche Reinigung der Weibchen, die leidenschaft der Männchen gegen unsre Frauenzimmer, alle Handlungen welche aus dieser Aehnlichkeit der Organisation entspringen können, haben gemacht, daß Menschen, die es selbst in der That halb waren, und die nicht weiter als nach äußerlichen Aehnlichkeiten vergleichen konnten, dem Affen den Namen eines wilden Menschen gaben. Was würde geschehen seyn? wenn durch eine Vereinbarung, die der Natur eben so möglich gewesen wäre, als jede andere, der Affe die Stimme des Papagey bekommen hätte, und wie er das Vermögen zu reden! Der redende Affe hätte das ganze menschliche Geschlecht vor Erstaunen stumm gemacht, und es so weit gebracht, daß der Philosoph große Mühe würde gehabt haben, zu erweisen, daß er bey allen diesen schönen menschlichen Eigenschaften nichts weiter als ein Thier ist. Es ist daher für unsre Einsicht ein Glück, daß die Natur die Nachahmung unserer Stimme und unserer Gebährden von einander abgesondert und in zwey sehr verschiedene Gattungen gelegt hat; und da sie alle Thiere mit einerley Sinne begabt, und einigen von ihnen Glieder und Werkzeuge gegeben hat, die der Menschen ihren ähnlich sind, sie ihm das Vermögen sich zu vervollkommnen vorbehalten hat; das einzige und prächtige Merkmal, welches allein unsern Vorzug ausmacht, und die Herrschaft des Menschen über alle andere Wesen bestätigt; denn man muß zwey Arten der Vervollkommung unterscheiden, ein unfruchtbares, welches sich auf die Erziehung des Einzelnen einschränkt, und ein fruchtbares, welches sich über die ganze

Art

Art verbreitet, und sich so weit ausdehnen läßt, als man es durch den Unterricht der Gesellschaft anbauet. Keines von den Thieren ist dieser letztern Vervollkommung fähig; sie sind heutiges Tages das, was sie gewesen sind, und was sie immer seyn werden, und niemals etwas mehr; weil, indem ihre Erziehung bloß das Individuum betraf, sie nichts auf ihre Jungen fortpflanzen können, als was sie selbst von ihrem Vater und ihrer Mutter empfangen haben; anstatt daß der Mensch von allen Zeiten her Erziehung empfängt, die Unterweisungen anderer Menschen sammelt, und durch einen weisen Gebrauch der Zeit alle Augenblicke der Dauer seiner Gattung benutzen kann, um sie immer mehr und mehr zu vervollkommnen. Wie müssen wir auch die traurigen Zeitalter beklagen, wo die Barbarey unsern Fortgang nicht nur aufgehalten, sondern uns sogar wieder zu der Unvollkommenheit zurück geworfen hat, aus welcher wir uns losgewunden hatten! ohne diese unglückselige Abwechselungen, wäre das Menschengeschlecht immer beständig dieser ruhmvollen Vollkommenheit entgegengegangen, welche sein größtes Vorrecht ausmacht, und allein sein Glück machen kann. Allein der bloße wilde Mensch, welcher sich aller Gesellschaft entziehen würde, und nur eine individuelle Erziehung hätte, würde seine Gattung nicht vervollkommnen können, und würde selbst in Absicht auf den Verstand von diesen Thieren nicht unterschieden seyn, welchen man seinen Namen gegeben hat, er würde nicht einmal eine Sprache haben, wenn er seine Familie flöhe und seine Kinder bald nach ihrer Geburt verließe. Der Zärtlichkeit der Mutter also hat man die ersten Keime der Gesellschaft;

sellschaft; ihre fortdaurende Sorgfalt, ihre anhaltende Zärtlichkeit ist es, der man die Entwickelung dieser ersten Keime schuldig ist: die Schwachheit des Kindes erfordert beständige Aufmerksamkeit, und bringt die Nothwendigkeit dieser Dauer von Liebe hervor, während welcher das Geschrey der Nothdurft und die Antworten der Zärtlichkeit anfangen eine Sprache zu bilden, deren Ausdrücke durch eine zwey- bis dreyjährige wechselseitige Uebung festgesetzt und beyden Theilen verständlich werden; anstatt daß bey den Thieren, deren Wachsthum weit geschwinder vor sich geht, die Zeichen, wodurch sie einander ihre Bedürfnisse und Hülfe andeuten, da sie nur sechs Wochen oder zwey Monate wiederholet werden, nur leichte und flüchtige Eindrücke machen können, und welche in dem Augenblick verschwinden, da sich das junge Thier von seiner Mutter trennt. Es kann also keine Sprache, sie mag nun aus Worten oder aus Zeichen bestehen, statt finden, als unter den Menschen, aus der angeführten Ursache; denn man darf die Hervorbringung der Worte nicht dem besondern Bau unserer Organe zuschreiben, da sie der Papagey aussprechen kann, wie der Mensch; aber schwatzen heißt nicht reden, und Worte machen keine Sprache aus, als wenn sie einen Verstand haben und denselben mittheilen können. Nun fehlet diesen Vögeln, denen in Absicht auf die Leichtigkeit Worte hervorzubringen nichts mangelt, das Vermögen durch diese Worte einen Sinn auszudrücken, welches allein die hohe Eigenschaft der Sprache ausmacht: sie sind dieses Vorzugs beraubt, wie alle andre Thiere, und zwar aus eben der Ursache, nemlich wegen den schnellen Wachsthum

thum in ihrem ersten Alter, wegen der kurzen Dauer ihrer Gesellschaft mit ihren Aeltern, deren Sorgen sich blos auf ihre körperliche Erziehung einschränken, und nicht oft genug wiederholt, noch lange genug fortgesetzt worden, um dauerhafte und wechselseitige Eindrücke zu machen, ja nicht einmal genug, um die Vereinigung einer beständigen Familie zu stiften, welches die erste Stufe aller Gesellschaft und die einzige Quelle jeder Einverständnisse ist.

Das Vermögen unsere Worte oder unsere Gebehrden nachzuahmen, giebt also den Thieren, welche mit diesem Anschein eines natürlichen Talents begabt sind, gar keinen Vorzug. Der Affe, welcher sich gebärdet, der Papagey, welcher unsere Worte wiederholt, sind deswegen nicht mehr im Stande an Verstand zu wachsen, und ihre Gattung zu vervollkommnen. Dieses Talent schränkt sich bey dem Papagey darin ein, daß es ihn uns wichtiger macht, aber es setzt bey ihm keinen Vorzug über andere Vögel voraus, als daß, da er leichter als irgend einer die Worte nachahmen, der Sinn des Gehörs und die Sprachwerkzeuge mehr Aehnlichkeit mit dem Menschen haben müssen; und diese Aehnlichkeit, welche bey dem Papagey im höchsten Grade ist, findet sich, bis auf einige Abweichungen, bey mehrern andern Vögeln, deren Zunge dick, zugerundet und ungefähr von der Bildung, wie die Zunge des Papageys ist: die Staaren, die Amseln, die Häher, die Dohlen u. s. w. können Worte nachahmen; die, welche eine gespaltene Zunge haben, und dieses sind fast alle unsere kleinen Vögel, pfeiffen leichter als sie schwatzen.

Endlich diejenigen, bey welchen sich die zum Pfeifen gehörige Organisation mit der Empfindlichkeit des Ohrs, und der Gabe sich dessen wieder zu erinnern was es durch dieses Werkzeug empfangen hat, vereinigt, lernen leicht Arien wiederholen, oder musikalisch pfeiffen. Der Kanarienvogel, der Zeisig, der Hänfling, der Blutfinke, scheinen von Natur Tonkünstler zu seyn. Der Papagey, es mag nun von der Unvollkommenheit der Organe oder vom Mangel des Gedächtnisses seyn, läßt nur ein Geschrey oder sehr kurze Redensarten von sich hören, und kann weder singen, noch modulierte Arien wiederholen; indessen ahmt er alles Geräusche, das er hört, das Mauen der Katzen, das Bellen der Hunde, und das Geschrey der Vögel eben so leicht nach, als er die Sprache der Menschen nachmacht: er kann also die Töne ausdrükken und sie artikuliren, nicht aber sie moduliren, oder mit ihnen steigen und fallen, welches beweißt, daß er weniger Gedächtniß, weniger Geschmeidigkeit in den Organen, und eine eben so trockene und rohe Kehle hat, als sie bey den Singvögeln weich und zärtlich ist. [2]) Uebrigens muß man auch zwey Arten

2) Kein Vogel hat doch die Aehnlichkeit in den Sprachorganen oder im Sprechen mit dem Menschen im höchsten Grade. Es fällt ihnen die Aussprache vieler Wörter gar nicht leicht. Wenn sie aber auch die lange Erziehung, welche das Kind genießt, hätten, würden sie ja doch wohl keine ordentliche Sprache lernen, wie der Verfasser zu behaupten scheint. Daß die Papageyen nicht singen, muß auch eingeschränkt werden. Einige rothschwänzige blaugraue Papageyen singen recht angenehm.

Arten der Nachahmung unterscheiden, eine, die Ueberlegung und Gefühl leitet, und eine maschinenmäßige und absichtslose; die erste wird erlangt, die zweyte, so zu sagen, angebohren. Die eine ist nichts als die Folge des gemeinschaftlichen Instinkts, der durch die ganze Gattung verbreitet ist; und bestehet in nichts als in der Gleichheit der Bewegungen und der Handlungen jedes Individuums, welche alle einerley Hang zu haben oder gedrungen zu seyn scheinen, einerley Dinge zu thun; je dummer sie sind, je vollkommner ist diese Nachahmung, die der Gattung vorgezeichnet ist. Ein Schaaf thut und wird niemals etwas anders thun als was andere thun und gethan haben: die erste Zelle einer Biene gleichet der letzten; die ganze Gattung hat nicht mehr Verstand als ein einziges Individuum; und darin bestehet der Unterschied zwischen Verstand und Instinkt: also ist natürliche Nachahmung bey jeder Gattung nichts, als eine Folge von Gleichheit, eine Nothwendigkeit die um so blinder und verstandloser ist, je gleicher sie ausgetheilet war: die andere Nachahmung, die man als künstlich ansehen muß, kann sich weder vertheilen, noch der Gattung mittheilen; sie gehört bloß dem Individuum, das sie empfängt, welches sie besitzt, ohne sie geben zu können: der Papagey der noch so gut unterrichtet ist, wird das Talent zu sprechen nicht auf seine Jungen fortpflanzen. Alle Nachahmung die den Thieren durch die Kunst und Sorgfalt der Menschen mitgetheilt wird, bleibt bey dem Individuum, dem sie eingeprägt worden: und obgleich diese Nachahmung wie die erste ganz von der Organisation abhängt; so setzt sie doch besondere Kräfte voraus, welche etwas an den Verstand zu gränzen

scheinen,

scheinen, als Empfindsamkeit, Aufmerksamkeit und Gedächtniß; so daß die Thiere, die dieser Nachahmung fähig sind, und welche dauerhafte Eindrücke und eine Art von Erziehung, von Seiten des Menschen annehmen können, vorzügliche Gattungen in der Reihe der organisirten Wesen sind; und wenn diese Erziehung leicht ist, wenn sie der Mensch ohne Mühe allen Individuen geben kann, so gewinnt die Gattung, wie die Gattung des Hundes, über die andern Thiergattungen den Vorzug, so lange sie ihre Verbindung mit dem Menschen unterhält; denn der Hund, wenn er der Natur allein überlassen ist, fällt zum Fuchs oder Wolf herab, und kann sich von sich selbst nicht über sie erheben.

Wir können also alle Wesen, wenn wir uns ihnen nähern, veredeln, aber wir werden nie Thiere lehren, sich selbst zu vervollkommnen; Jedes Individuum kann von uns entlehnen, ohne daß die Gattung Vortheil davon hat, und dieses rührt daher, weil sie sich unter einander nicht verstehen; keines kann dem andern mittheilen, was es von uns empfangen hat; aber alle sind ungefähr gleich fähig eine individuelle Erziehung anzunehmen: denn obgleich die Vögel in Absicht auf die Verhältnisse des Körpers und die Bildung ihrer Glieder, von den vierfüßigen Thieren sehr unterschieden sind, so werden wir doch sehen, daß sie, da sie eben die Sinne haben, eben des Grades der Erziehung fähig sind. Man lehret der Agami ohngefähr eben das thun, was unsere Hunde thun: ein wohlgezogener Zeisig bezeigt seine Liebe durch eben so lebhafte weit unschuldigere und minder fal-

sche Schmeicheleyen, als eine Katze: Wir haben auffallende Beyspiele c) von dem, was die Auferziehung

c) Man brachte mir, sagt Herr Fontaine, im Jahre 1763 einen gefangenen Busart, er war damals äusserst wild und sogar grausam. Ich unternahm ihn zu zähmen, und erreichte meinen Zweck, indem ich ihn fasten ließ, und zwang, sein Futter aus meinen Händen zu holen; ich machte ihn dadurch sehr vertraulich, und nachdem ich ihn ohngefähr sechs Wochen eingeschlossen gehalten hatte, fing ich an, ihm einige Freyheit zu lassen, mit der Vorsicht, ihm die beyden Flügelspitzen zusammen zu binden. In diesem Zustande gieng er in meinem Garten, und kam zu mir, wenn ich ihn rief, sein Futter zu holen. Nach einiger Zeit, wie ich mich seiner Treue versichert hielt, befreiete ich ihn von seinen Banden, und band ihm über den Fängenn eine Schelle von anderthalb Zoll im Durchschnitte an, und befestigte auf seiner Brust eine Kupferplatte, darauf mein Name gegraben war. Mit dieser Vorsicht gab ich ihm die völlige Freyheit. Es währte auch nicht lange, so mißbrauchte er dieselbe, aber er nahm seinen Flug just bis zu dem Walde von Belesme. Ich hielt ihn für verloren, aber nach vier Stunden sahe ich ihn in meinen Saal, welcher offen war, hereinstürzen, und von fünf andern Weihen verfolgt, welche Jagd auf ihn machten, und ihn gezwungen hatten, seinen Zufluchtsort aufzusuchen.

Seit dieser Zeit ist er mir immer treu geblieben, indem er alle Abend unter mein Fenster zu schlafen kam. Er ward so vertraut mit mir, daß er ein besonderes Vergnügen in meiner Gesellschaft zu haben schien. Er war bey jedem Mittagessen gegenwärtig, setzte sich auf einer Ecke des Tisches, und liebkosete mich sehr oft mit seinem Kopfe und Schnabel, wobey er ein kleines scharfes Geschrey machte,

ziehung über Raubvögel vermag, welche unter allen am wildesten und am schwersten zu bezähmen zu seyn

welches er bisweilen sanfter zu machen wußte. Es ist wahr, ich hatte allein diesen Vorzug. Er folgte mir an einem Tage, da ich zu Pferde war, indem er über zwey Meilen flog. Er liebte weder die Hunde noch Katzen, fürchtete sie aber auch gar nicht. Er hatte bisweilen groben Streit mit ihnen auszustehen, aber er kam immer siegreich davon. Ich hatte vier sehr starke Katzen, welche ich in meinem Garten, in Gegenwart meines Bußarts, zusammen kommen ließ, und ihnen ein Stück rohes Fleisch hinwarf, die Katze, welche am schnellsten war, bemächtigte sich desselben, die übrigen liefen nach, aber der Vogel fiel auf den Leib der Katze, die den Bissen hatte, kniff mit seinem Schnabel ihr die Ohren, und schlug ihr mit seinen Krallen die Seiten so heftig, daß die Katze gezwungen ward, ihren Raub fahren zu lassen. Oft bemächtigte sich eine andere Katze desselben sogleich, aber erfuhr dasselbe Schicksahl, bis daß endlich der Bußart, welcher immer den Vortheil davon trug, dasselbe, ohne es fahren zu lassen, erhielt. Er wußte sich so gut zu vertheidigen, daß, wenn er sich von allen vier Katzen zugleich angefallen sah, er mit seinem Raube in den Fängen davon flog, und durch sein Geschrey den gewonnenen Sieg ankündigte; endlich weigerten die Katzen sich, welche des Betrugs überdrüßig waren, sich in den Streit einzulassen.

Dieser Bußart hatte einen besondern Wiederwillen; er wollte niemals eine rothe Mütze auf dem Kopfe eines Bauern leiden, und besaß die Kunst, ihnen dieselbe so geschickt wegzunehmen, daß sie ihren Kopf unbedeckt fanden, ohne zu wissen, wer ihnen ihre Mütze genommen habe. Er nahm auch die Peruken ab, ohne Schaden zu thun, und trug diese Mützen und Peruken auf den höchsten Baum

seyn scheinen. In Asien kennt man die Kunst Tauben zu unterrichten, daß sie auf hundert Mei-

Baum eines benachbarten Gartens, wo die gewöhnliche Niederlage aller seiner Räubereyen war. Er litte keinen andern Raubvogel in der Gegend, griff sie mit vielem Muthe an, und brachte sie zur Flucht. Auf meinem Hofe that er keinen Schaden; das Federvieh, welches sich anfangs für ihn fürchtete, gewöhnte sich allgemach an ihn; die jungen Hühner und Enten haben nie von ihm den geringsten Anfall erlitten; er badete sich mitten unter den letzten; aber besonders war es, daß er nicht gleiche Mäßigung bey den Nachbaren zeigte; ich mußte es bekannt machen lassen, daß ich allen Schaden bezahlen werde, welchen er ihnen anrichten könne, unterdessen ward er doch einigemal geschossen, und bekam über funfzehn Schüsse, ohne einen Bruch zu erhalten. Aber eines Tages begab es sich, daß er frühe am Rande des Waldes zog, und einen Fuchs anzufallen wagte; der Holzwärter sahe ihn auf den Schultern des Fuchses, und schoß zweymal nach ihm; der Fuchs ward getödtet, und meinem Bußart ward der Flügel zerbrochen; dieses Bruches ohngeachtet kam er dem Jäger aus den Augen, und war sieben Tage verlohren. Dieser Mensch merkte an der Schelle, daß es mein Vogel gewesen sey, und gab mir den folgenden Tag davon Nachricht. Ich schickte nach dem Orte, ihn suchen zu lassen, aber man konnte ihn nicht finden, und nur nach sieben Tagen fand er sich wieder ein. Ich hatte die Gewohnheit, ihn alle Abend mit Flöten zu rufen, worauf er sechs Tage nicht antwortete, aber am siebenten hörete ich in der Entfernung ein schwaches Geschrey, welches ich für das von meinem Bußart hielte, ich wiederholte das Flöten noch einmal, und hörete dasselbe Geschrey. Ich gieng nach der Seite, wo ich es gehöret hatte, und fand

endlich

len Briefe hin und her tragen. Die größere und mehr bekannte Kunst der Falknerey zeigt uns, daß wenn man den natürlichen Trieb der Vögel leitet, man ihn so sehr vervollkommnen kann als den Naturtrieb anderer Thiere. Alles dieses scheint zu beweisen, daß wenn der Mensch eben so viel Zeit und Sorgfalt auf die Erziehung eines Vogels oder irgend eines andern Thiers wenden wollte, als man auf die Erziehung eines Kindes wendet, sie durch Nachahmung das thun würden, was dieses aus Verstand thut; der einzige Unterschied bestünde in dem Erfolg: der Verstand der immer fruchtbar ist, theilt sich mit und verbreitet sich immer zunehmend, über die ganze Gattung, anstatt daß die nothwendig unfruchtbare Nachahmung, sich durch die, welche sie empfangen haben, weder verbreiten noch fortpflanzen läßt.

Und

endlich meinen armen Bußart, dem der Flügel zerbrochen war, und über eine halbe Meile gegangen war, um wieder zu seinem Zufluchtsort zu kommen, von da er nicht über hundert und zwanzig Schritte entfernt war. Obgleich er äußerst abgezehrt war, machte er mir doch viele Liebkosungen; er brauchte an sechs Wochen sich zu erholen und sich von seinen Wunden zu heilen, da er dann wie vorher zu fliegen anfing und seine vorigen Gewohnheiten ohngefähr ein ganzes Jahr auszuüben, und darauf auf immer unsichtbar ward. Ich bin sehr überzeugt, daß er aus Versehen getödtet sey, freywillig würde er mich nicht verlassen haben. Aus einem Briefe des Herrn Fontaine, eines Predigers bey St. Petri in Belesme an den Herrn Grafen von Büffon vom 28. Januar 1778.

V.

Und diese Erziehung, welche wir den Thieren geben, und sie dadurch zu den nützlichsten oder uns angenehmsten Vögeln machen, scheint sie allen übrigen, und besonders denen von ihrer eigenen Art verhaßt zu machen. So bald ein gezähmter Vogel seine Freyheit sucht und in den Wald fliegt, versammlen sich sogleich die übrigen, um ihn zu bewundern, und mißhandeln und verfolgen ihn gleich, als wenn er von einer friedlichen Art wäre; Man sehe davon ein Beyspiel an der Weihe, und ich habe dergleichen an einer Elster und Heher gesehen; wie man ihnen die Freyheit gab, versammleten sich die wilden ihrer Art, fielen über sie her und verfolgten sie: sie lassen sie nicht in ihrer Gesellschaft zu, als bis diese gezähmten Vögel alle Zeichen ihrer Zuneigung zu uns verlohren haben, so wie alle Kennzeichen, wodurch sie sich von ihren wilden Geschwistern unterscheiden, als wenn diese Kennzeichen in ihnen die Empfindung der Furcht zurückriefe, die sie für den Menschen ihren Tyrannen haben, und den Haß welchen seine Anhänger und Sklaven verdienen.

Uebrigens sind die Vögel unter allen Geschöpfen am unabhängigsten und am stolzesten auf ihre Freyheit, weil sie vollkommner und ausgebreiteter als bey allen andern Thieren ist; da ein Vogel nur einen Augenblick braucht, um die Hinderniße von sich zu entfernen und sich über seine Feinde zu erheben, da er durch die Geschwindigkeit seiner Bewegung, und durch den Vortheil seines Standorts in einem Element, in welches sie nicht kommen können, über sie weg ist, so sieht er alle andere Erdthiere als plumpe und kriechende Wesen an, die

an der Erde gefesselt sind, er würde sich nicht einmal vor den Menschen fürchten, wenn ihn die Kugel und der Pfeil nicht gelehrt hätten, daß er ohne von seinen Platz zu gehen, erreichen, treffen, und den Tod in die Ferne bringen kann. Da die Natur den Vögeln Flügel gab, hat sie ihnen die Eigenschaften der Unabhängigkeit und die Werkzeuge der hohen Freyheit ertheilet; auch haben sie kein Vaterland als die Himmelsgegend die ihnen paßlich ist.

Sie sehen die Abwechselungen vorher und verändern das Clima, indem sie den Jahrszeiten voreilen; sie lassen sich nirgends wohnhaft nieder, ehe sie die luftbeschaffenheit erforscht haben. Die meisten kommen erst an, wenn der sanfte Hauch des Frühlings die Wälder bereits grün gekleidet hat; wenn er die Gewächse hervortreibt, die sie nähren sollen; wenn sie ihre Wohnung aufschlagen, sich ein Lager machen, und sich im Schatten verbergen können, kurz wenn die Natur, welche die Kräfte der Liebe belebet, der Himmel und die Erde ihre Wohlthaten zu vereinbaren scheinen, um ihr Glück vollkommen zu machen. Indessen wird diese Zeit des Vergnügens bald eine Zeit der Unruhe; bald werden sie eben diese Feinde zu befürchten haben, über welche sie mit Verachtung herumschwebten; die wilde Katze, der Marder, das Wiesel werden bald das, was ihnen am liebsten ist, aufzufressen suchen, die Schlange wird sich hinaufwinden, ihre Eyer zu verschlingen und ihre Brut zu zerstöhren, sie mögen ihr Nest so hoch, oder so verborgen angelegt haben als sie wollen, ihre Feinde werden es doch zu entdecken, zu erreichen und zu verwüsten wissen; und die Kinder, dieser liebenswürdige Theil

des

des Menschengeschlechts, der aber immer, weil er nichts zu thun hat, Schaden anrichtet, werden ohne Ursach diesen heiligen Pfändern ihrer liebe Gewalt anthun. Oft opfert sich die zärtliche Mutter auf, in der Hofnung, ihre Jungen zu retten; sie läßt sich lieber fangen als daß sie dieselben verläßt; sie will lieber ein gleiches unglückliches Schicksal mit ihnen ertragen, als allein gehen und ihrem Geliebten durch ihr Geschrey anzukündigen, der sie doch allein trösten könnte, indem er den Schmerz mit ihr theilte. Das Gefühl der mütterlichen liebe ist daher weit stärker als das Gefühl der Furcht, und tiefer gewurzelt als das Gefühl der liebe, weil hier diese Neigung in dem Herzen einer Mutter über beyde den Vorzug behauptet, und sie lieber Freyheit und leben vergessen macht.

Warum ist die Zeit großer Vergnügungen auch die Zeit großer Besorgnisse? Warum ist der Wollustvollste Genuß immer mit grausamen Unruhen begleitet, auch bey den freysten und unschuldigsten Wesen? Ist dieses nicht ein Vorwurf, den man der Natur dieser gemeinschaftlichen Mutter aller Wesen machen kann? Ihre Wohlthätigkeit ist niemals rein noch von langer Dauer. Dieses glückliche Paar, welches sich aus Wahl vereinigt, das mit Uebereinstimmung und in Gemeinschaft seine Wohnung der liebe erbauet, und an seine werdende Familie die zärtlichste Sorgfalt verschwendet hat.

Und wenn es ans Erziehen kommt, so zeigen sich alsdenn erst die furchtbarsten Feinde, die sie mit desto größern Vortheil angreifen. Der Raub-

vogel erscheint wie ein Blitz und stürzt sich auf das ganze Volk, Vater und Mutter sind oft seine ersten Schlachtopfer, und die Jungen, deren Flügel noch nicht genug geübt sind, können ihm nicht entgehen. Diese würgende Vögel jagen allen andern Vögeln eine so lebhafte Furcht ein, daß man sie bey ihrem bloßen Anblick erschrecken sieht, selbst die, welche in Sicherheit in unsern Hühner-Höfen leben, der Feind mag auch noch so weit entfernt seyn, zittern, so bald sie ihn erblicken, und welche auf dem Felde leben, werden von eben der Angst ergriffen, und geben sie deutlich zu erkennen durch ihr Geschrey und ihre eilende Flucht nach Oerter, wo sie sich verbergen können. Der freyeste Zustand der Natur hat also auch seine Tyrannen, und unglücklicherweise sind sie es allein, denen diese höchste Freyheit gehört, die sie mißbrauchen, und diese gänzliche Unabhängigkeit, die sie zu den stolzesten unter allen Thieren macht; der Adler verachtet den Löwen und nimmt ihm ungestraft seinen Raub, er tyrannisirt auf eben die Art die Bewohner der Luft und der Erde, und er würde vielleicht die Herrschaft über einen großen Theil der Natur an sich gerissen haben, wenn die Waffen des Menschen ihn nicht auf die Gipfel der Gebirge verwiesen, und ihn an unzugängliche Oerter getrieben hätten, wo er noch ungestöhrt und ohne Nebenbuhler aller Vortheile seiner tyrannischen Herrschaft genießt.

Der Blick, den wir nur eilend auf die Fähigkeiten der Vögel geworfen haben, ist hinreichend uns zu beweisen, daß in der Kette der großen Ordnung der Wesen, die Vögel den ersten Rang nach

Men-

Menschen haben müssen. Die Natur hat in dem kleinen Umfang ihres Körpers mehr Kraft zusammengedrängt als sie in die großen Massen der mächtigsten Thiere vereinigt hat, sie hat ihnen mehr Leichtigkeit gegeben, ohne etwas von der Festigkeit ihrer Organisation wegzunehmen, sie hat ihnen eine ausgebreitetere Herrschaft über die Bewohner der Luft, der Erde und des Wassers eingeräumt; sie hat ihnen eine ausschließende Gewalt über das ganze Geschlecht der Insekten zugetheilt, welche von ihr bloß ihr Daseyn erhalten zu haben scheinen, um das Daseyn ihrer Zerstöhrer, denen sie zur Speise dienen, zu erhalten und zu befestigen; sie herrschen eben so über die kriechende Thiere, von welchen sie die Erde reinigen, ohne ihren Gift zu befürchten, über die Fische, die sie aus ihrem Elemente herausholen, um sie zu verzehren, und endlich über die vierfüßigen Thiere, die sie ebenfalls zu Schlachtopfern machen. Man hat Weihen Füchse angreifen, Falken Gazellen anfallen, Adler Schaafe wegschleppen, sowohl den Hund als den Haasen anfallen, sie tödten und in ihren Horst tragen sehen; und wenn wir zu allen diesen Vorzügen der Stärke und der Geschwindigkeit diejenigen fügen, welche die Vögel der Natur des Menschen näher bringen, den Gang auf zwey Beinen, die Nachahmung der Sprache, das musikalische Gedächtniß, so werden wir sie näher an uns sehen, als ihre äußere Gestalt anzuzeigen scheint; wir werden zu gleicher Zeit, wegen dem Eigenthume der Flügel, und dem Vorzug, den der Flug über den lauf hat, ihnen den Rang über allen Erdthieren zugestehen müssen. Allein wir gehen von dieser allgemeinen Betrachtung über die Vögel zu der

besondern Prüfung des Geschlechts der Papageyen über; dies Geschlecht, welches zahlreicher ist, als ein anderes, wird nicht unterlassen, uns große Beyspiele von einer neuen Wahrheit an die Hand zu geben; diese ist, daß bey den Vögeln sowohl als bey den vierfüßigen Thieren in den mittäglichen Ländern der neuen Welt, keine von den Gattungen der mittäglichen Länder der alten Welt befindlich ist, und umgekehrt, keiner von den Papageyen, die man in Afrika und dem großen Indien antrifft, wird in dem mittäglichen Amerika gefunden, und keiner von denen, die in diesem Theil der neuen Welt sind, ist in der alten befindlich. Auf diese allgemeine Wahrheit habe ich auch die Benennung dieser Vögel gegründet, deren Gattungen sehr verschieden und so mannigfaltig sind, daß wir ohne die, die uns unbekannt sind, mehr als hundert zählen können; und unter diesen hundert Gattungen giebt es nicht eine einzige, welche beyden Erdhälften gemein wäre. Dieses dient zu einem neuen Beweis derjenigen allgemeinen Wahrheit, die wir bereits in der Geschichte der vierfüßigen Thiere behauptet haben. Keines von denen, welches die Strenge der kalten Klimate nicht aushalten können, hat von dem einen festen lande zum andern übergehen können, weil diese Erdtheile nie als in den Gegenden von Norden zusammenfließen. Auf gleiche Weise verhält es sich mit Vögeln, welche, wie die Papageyen, nirgends, als in den heißen Klimaten leben und sich fortpflanzen können; sie sind, trotz der Stärke ihrer Flügel, ein Theil in die mittäglichen Länder der neuen, der andere in die von der alten Welt eingeschränkt geblieben, und sie bewohnen nur eine Zone von fünf und zwanzig

Gra-

Graden auf jeder Seite des Aequators. 3) Aber wird man sagen, weil die Elephanten und die andern vierfüßigen Thiere von Afrika und Indien, ursprünglich die länder des Nords in den beyden Erdhälften inne hatten, haben sich nicht auch ursprünglich die Kakatoes, die loris und die andern Vögel dieser nämlichen mittäglichen Gegenden unserer Erdhälfte in den mitternächtlichen Theilen beyder Welten befinden können? Wie ist es denn gekommen, daß die, welche ehedem das mitternächtliche Afrika bewohnten, nicht in die heißen länder des mittäglichen Amerika gedrungen sind? denn sie wären nicht, wie die Elephanten, durch die hohen Gebirge, noch durch die schmale länder der Erdenge aufgehalten worden, und der Grund, den man aus diesen Hindernissen hergenommen hat, läßt sich nicht auf die Vögel anwenden, welche leicht über die Gebirge kommen können; der Unterschied also, der sich zwischen den Vögeln aus dem mittäglichen Amerika und Afrika findet, setzt einige andere Ursachen voraus, als die, die in dem System von der kälter werdenden Erde und der Wanderung aller Thiere vom Nord zum Süd angenommen sind.

Dieser Einwurf, welcher anfänglich gegründet zu seyn scheinet, ist indessen nichts als eine neue Frage, welche, auf was für eine Art man sie auch geltend zu machen sucht, weder der Erklärung der allge-

3) Man sehe dagegen den Widerspruch des Herrn Pennant unten in der dritten Anmerkung unter dem Schmaragdparkit.

allgemeinen Thatsachen von dem ersten Ursprung der Thiere in den nordischen Ländern, von ihrer Wanderung nach den südlichen, und von ihrer Ausschließung der südamerikanischen Länder, entgegen gesetzt worden, noch ihr schaden kann; diese Thatsachen, was für Schwierigkeiten sie auch haben können, sind nichts desto weniger gewiß, und man kann, wie mich dünkt, die Frage auf eine befriedigende Art beantworten, ohne sich von dem System zu entfernen; denn die Vögelgattungen, die eine große Wärme nöthig haben, um zu dauern und sich zu vermehren, werden, trotz ihrer Flügel, nicht leichter einen Weg über die eisigten Gipfel der Gebirge genommen haben, als die Elephanten; niemals steigen die Papageyen und die übrigen mittäglichen Vögel hoch genug in die Luft, daß sie von einer Kälte ergriffen werden, die ihrer Natur zuwider ist, folglich werden sie nicht in die Länder des südlichen Amerika haben eindringen können, sondern würden, wie die Elephanten, in den mitternächtlichen Gegenden dieses Welttheils umgekommen seyn, so wie sie nach und nach kälter geworden sind; dieser Einwurf also, statt das System zu erschüttern, gereicht vielmehr dazu, es zu befestigen und es allgemeiner zu machen, weil nicht nur die vierfüßigen Thiere, sondern auch sogar die Vögel aus dem Süden unserer Erdhälfte, weder in das getrennte feste Land des südlichen Amerika haben eindringen, noch sich daselbst niederlassen können. Wir wollen nichts desto weniger zugeben, daß diese Ausschließung in Absicht auf die Vögel nicht so allgemein ist, als in Absicht auf die vierfüßigen Thiere, unter welchen man nicht eine einzige Gattung findet, die Afrika und Amerika gemein hät-

hätten, statt daß man unter den Vögeln eine kleine Anzahl finden kann, deren Gattungen in beyden Erdhälften sich befinden; aber die Ursachen sind besondere, und es gilt nur von gewissen Arten von Vögeln, die zu einer großen Kraft in den Flügeln das Vermögen hinzufügen, auf dem Wasser ausruhen zu können, und die, vermittelst der breiten Schwimmhäute an ihren Füßen, über die unermeßlichen Meere gezogen sind und noch ziehen, welche die beyden Erdhälften von Mittag gegen einander trennen. Und da die Papageyen weder Füße mit Häuten, noch einen hohen und lang anhaltenden Flug haben, so hat keiner von diesen Vögeln von einem festen Lande zum andern gehen können, wenn er nicht von Menschen herübergebracht worden ist d); man wird sich durch die Darlegung ihrer Namen, und durch die Vergleichung der Beschreibungen jeder Gattung, zu welchen wir alle Hererzählungen ihrer Aehnlichkeiten und ihrer Abweichungen, sowohl der generischen als specifischen auf-

d) Die Papageyen haben einen kurzen und schweren Flug, so daß sie nicht sieben bis acht Meilen queer über das Meer fliegen können; eine jede Insel des mittäglichen Amerikas hat ihre besondere Arten von Papageyen. Die auf der St. Lucie, St. Vincent, Dominique, Martinique und Guadeloupe sind von einander verschieden; die von den caraibischen Inseln sind ihnen gar nicht aleich, und die Papageyen der caraibischen Inseln finden sich gar nicht nach dem Orenoko zu, welches doch die nächste Gegend des festen Landes an diesen Inseln ist. Diese Anmerkung kommt von dem Herrn de la Borde, königlichem Arzte zu Cayenne.

aufbehalten, überzeugen; und diese Namenliste war vielleicht eben so schwer auseinander zu lesen, als die von den Affen, weil alle Naturbeschreiber vor mir die Gattungen, und sogar die Geschlechter der zahlreichen Heerden dieser zwey Klassen von Thieren, von welchen doch keine Gattung beyden Erdhälften zugleich angehört, auf einerley Weise vermengt haben.

Die Griechen kannten anfangs nur eine Art der Papageyen oder vielmehr des Sittichs; nemlich denjenigen, welchen wir jetzt den groſsen Sittich mit der Halsbinde nennen, welcher sich auf dem festen Lande von Indien findet. Die ersten von diesen Vögeln wurden von der Insel Trapobane in Griechenland durch den Onesikrit, dem Befehlshaber über Alexanders Flotte, gebracht; sie waren daselbst so neu und selten, daſs selbst Aristoteles keinen davon gesehen zu haben, und nur nach Erzählungen von ihm zu reden scheint e). Aber die Schönheit dieser Vögel, und ihre Gabe, Wörter nachzuahmen, machte sie bald zu einem Gegenstande des Luxus bey den Römern. Der strenge Cato macht ihnen darüber einen Vorwurf f); sie

setzten

e) Indica avis, cui nomen psittacae, quam loqui ajunt. *Aristot. Lib. VIII. Cap.* 12.

f) Dieser strenge Censor rief mitten im versammelten Rathe aus: O ihr Rathsherrn! o unglückliches Rom! welche Vorbedeutung für dich! In welche Zeiten sind wir verfallen, da wir Weiber Hunde auf ihren Knien ernähren und die Männer Papageyen

seßten sie in Kefigt von Silber, Schildpat und Elfenbein g), und der Preiß eines Papageyen war bey ihnen bisweilen höher, als der von einem Sclaven.

Man kannte in Rom keine andere Papageyen, als solche, die aus Indien kamen h), bis zu Neros Zeiten, da die Abgeordneten dieses Kayfers welche auf einer Insel des Nils, zwischen Sienne und Meroe fanden i), welches mit dem 24 bis 25sten Grade übereinkommen wird, welchen wir für diese Vögel als die Grenze angegeben haben, die sie nicht überschritten zu haben scheinen. Endlich berichtet Plinius, daß der Name Psittacus, welchen die Lateiner dem Papageyen beylegten, von seinem indischen Namen Psittace oder Sittace komme k). Die Portugiesen, welche die ersten

sind,

geyen auf der Hand tragen sehen. *Columell. Dict. antiq. Lib. III.*

g) Statius in psitt.

h) *Plin.* Lib. X. Cap. 42. Pausanias in Corinth.

i) A Sienne in Meroen . . . Insulam Gagaudem esse in medio eo tractu renunciavere (Neronis exploratores) inde primum visas aves psittacos. Etwas weiter hin fanden diese Reisende Affen. *Plin. Lib. VI. Cap.* 29.

k) India hanc avem mittit, sittacem vocat. *Plin. Lib. X. Cap. 42.* Man brachte sie noch im funfzehnten Jahrhunderte von diesen Ländern auf dem Wege über Alexandrien. Man sehe die Erzählung

von

sind, die um das Vorgebürge der guten Hoffnung gefahren sind, und die Küsten von Afrika ausgekundschaftet haben, fanden die Länder von Guinea und alle Inseln des indischen Oceans, wie das feste Land, mit verschiedenen Gattungen von Papageyen bevölkert, die in Europa alle unbekannt waren, und in so großer Menge, daß in Kalekut l) Bengalen, und auf den Küsten von Afrika die Indianer und Neger sich genöthigt sahen, in ihren Reis- und Maysfeldern zur Zeit ihrer Reife zu seyn, um diese Vögel davon zu entfernen, welche sie zu verwüsten kamen m). Diese große Menge der Papageyen in allen Gegenden, welche sie bewohnen n), scheinen zu beweisen, daß sie mehr als einmal brüten, weil jede Brut nicht so zahlreich ist; aber nichts gleichet der Mannigfaltigkeit der Gattungen von Vögeln dieses Geschlechts, die die Schif-

von Cadamostro. *Hist. gener. des Voy. Tom. II. p. 305.* V.

l) *Recueil des voy. qui ont servi a l'etabliss. de la Compagnie des Indes. Amsterd. 1702. Tom. III. p. 195.* V.

m) *Mandeslo*, suite d'Olearius. Tom. II. p. 144. V.

n) Unter vielen merkwürdigen Thieren ziehen die malabarischen Papageyen die Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich, sowohl wegen ihrer außerordentlichen Menge, als wegen der Verschiedenheit ihrer Arten. Dellon versichert, er habe oft das Vergnügen gehabt, zu sehen, daß man an zweyhundert mit einem Netze gefangen habe. *Hist. gener. des Voy. Tom. XI. p. 454.* V.

Schiffer in allen mittäglichen Gegenden der neuen Welt zu sehen bekommen, da sie dieselbe entdeckten. Verschiedene Inseln bekamen den Namen der Papageyeninseln. Dieses waren die einzigen Thiere, die Kolumb in der ersten fand, da er anlandete o), und diese Vögel dienten zum Gegenstand des Tausches bey dem ersten Handel, den die Europäer mit den Afrikanern hatten p). Endlich brachte man soviel Papageyen aus Amerika und Afrika, daß der Papagey der Alten vergessen wurde. Man kannte ihn zu Belons Zeiten bloß noch aus der Beschreibung, die sie von ihm hinterlassen hatten q); und doch, sagt Aldrovande, haben wir nur noch einen Theil von diesen Gattungen gesehen, wovon die Inseln und Länder der neuen Welt eine so große Anzahl ernähren, daß, um ihre unglaubliche Mannigfaltigkeit sowohl, als das prächtige ihrer Farben und ihre ganze Schönheit auszudrücken, man die Feder wegwerfen und den Pinsel ergreifen müßte.

Um nun soviel als es möglich ist der Ordnung zu folgen, die die Natur in dieser Menge von Gattungen

o) Cuanaham, eine der Cucayen.

V.

p) Man sehe die erste Reise des Christoph. Colomb. *Hist. gen. des Voy. Tom. XII.* im Anfange.

V.

q) *Nature des Oiseaux. p. 296.*

tungen beobachtet hat, sowohl in Absicht auf den Unterschied ihrer Gestalt, als in Absicht auf die Vertheilung der Klimate, so wollen wir zuerst das ganze Geschlecht dieser Vögel in zwey große Klassen abtheilen, davon die erste alle Papageyen der alten, die zweyte alle die aus der neuen Welt unter sich begreifen soll. Hernach wollen wir die erste wieder in fünf große Familien abtheilen; nämlich die **Kakatoes**, die eigentlich sogenannten **Papageyen**, die **Loris**, die **Sittiche mit langem**, und die **Sittiche mit kurzem Schwanze**; und eben so wollen wir die Papageyen der neuen Welt in sechs andere Familien bringen; nämlich, die **Aras**, die **Amazonen**, die **Kriks**, die **Papageyen**, die **Parkiten mit langem**, und endlich die **Parkiten mit kurzem Schwanze**. Jede von diesen eilf Horden oder Familien ist durch unterscheidende Charaktere ausgezeichnet, oder trägt wenigstens eine etwas besondere Livree, welche sie kenntlich macht, und die aus der alten Welt werden zuerst erscheinen.

Die

Die Papageyen der alten Welt.

Die Kakatuen.

Die größesten Papageyen der alten Welt sind die Kakatuen; daselbst gehören sie zu Hause, und scheinen aus dem mittäglichen Asien zu seyn. Ich weiß nicht, ob man deren auch in Ländern von Afrika findet, aber sicher ist es, daß man in Amerika keine antrifft; sie scheinen sich in den Ländern des mittäglichen Indiens a) und in allen Inseln des indischen Oceans verbreitet zu haben, in Ternate b),

a) Die Bäume dieser Stadt (Amadabat, der Hauptstadt von Guzuratte) und die auf dem Wege von Agra nach Brampour, welcher hundert funfzig teutsche Meilen beträgt, nährt eine unbegreifliche Menge der Papageyen. Es giebt da weiße oder perlgraue, mit einem fleischfarbenen Zopfe; man nennet sie Kakatus, wegen dieses Worts, das sie in ihrem Gesange ziemlich deutlich aussprechen. Diese Vögel sind durch ganz Indien sehr gemein, wo sie ihre Nester auf den Dächern der Häuser bauen wie die Schwalben in Europa. *Voyage de Mandeslo. Olearius II. p. 144.*

b) Voyage autour du monde par *Gemelli Carreri. Paris 1719. Tom. V. p. 5.*

Banda c), Ceram d), in den philippinischen e) und sondaischen Inseln f). Ihr Name Kakatoes, cacatua und Kakatu, kommt von der Aehnlichkeit ihres Geschreyes mit diesem Namen g). Man unterscheidet sie leicht von andern Papageyen durch ihr weißes Gefieder und durch ihren haakigten und runden Schnabel, und besonders durch eine Haube von langen Federn, damit ihr Kopf gezieret ist, und die sie nach Belieben erheben und niederlassen können h). Diese Kakatupapageyen lernen schwer reden. Es giebt sogar Gattungen, die gar nicht reden; allein sie lassen sich desto leichter erziehen; man

c) Recueil des Voyages qui ont servi a l'etabliss. de la Compagnie des Indes. *Amst. 1702. Tom. V. p. 26.*

d) *Dampierre Hist. gener. des Voyages. Tom. XI. p. 244.*

e) *Gemelli Carreri. l. c.*

f) *Voyage de Siam par le P. Tachard. Paris 1686. p. 130.*

g) Wir nahmen verschiedene Striche, damit wir um die Kakatuinsel segeln möchten, welche wegen der weißen Papageyen, die man daselbst findet, so genannt wird, und die beständig diesen Namen wiederholen. Diese Insel ist ziemlich nahe an Sumatra. Ebend.

h) Der Scheitel des Kopfs, welcher durch die langen nach hinten als ein Zopf liegenden Federn bedeckt wird, ist ganz nackt.

man macht sie ohne Mühe zahm i); sie scheinen sogar in einigen indianischen Gegenden Hausthiere geworden zu seyn, denn sie nisten auf die Dächer der Häuser k), und diese Leichtigkeit der Erziehung kommt von dem Grade ihrer Einsicht, welche grösser zu seyn scheint als die der übrigen Papageyen; sie hören mehr zu, verstehen und gehorchen besser; aber vergeblich bemühen sie sich, das zu wiederholen, was man ihnen sagt; es scheint, daß sie diesen Fehler durch andere Ausdrücke von Gefühl und durch zärtliche Schmeicheleyen ersetzen wollen; sie haben in ihren Bewegungen eine Artigkeit und eine Anmuth, welche ihre Schönheit noch vermehren. Man hat im Monath März 1775 zwey, ein Männchen und ein Weibchen in Paris gesehen, welche mit vieler Gelehrigkeit gehorchten, man mochte ihnen befehlen ihre Haube zu entfalten, oder leute durch ein Zeichen mit dem Kopfe zu grüßen, Gegenstände mit dem Schnabel oder mit der Zunge zu berühren, oder auf die Fragen ihres Herrn mit einem Zeichen des Beyfalls, welches vollkommen ein stummes Ja ausdrückte, zu antworten; sie zeigten auch durch wiederholte Zeichen die Anzahl der Personen, die im Zimmer waren, die Stunde, die Farbe der Kleider u. s. w. an. Sie küßten ein-

i) Zu Ternate sind diese Vögel Hausthiere und gelehrig; sie sprechen wenig und schreien viel. *Gemelli Carreri. V. p. 325.*

k) *Mandeslo.* a. a. O.

ander, indem sie sich wechselsweise die Schnäbel gaben; sie schmeichelten auch einander, und dieses Vorspiel zeigte die Neigung sich zu begatten an, und ihr Herr versicherte, daß sie sich auch wirklich oft, sogar in unsern Klima begatteten. Obgleich die Kakatuen sich, wie die übrigen Papageyen, ihres Schnabels bedienen, um auf und ab zu steigen, so haben sie doch ihren schweren und unangenehmen Gang nicht; sie sind im Gegentheil sehr behende, gehen artig, trottiren und machen kleine lebhafte Sprünge.

1. Der

Der Kakatu mit der weissen Haube. §39.

Büff Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 263.

1. Der Kakatu mit der weißen Haube. 1) 1)

Erste Gattung.

Pl. enl. 263.

Dieser Kakatu ist ohngefähr so stark als ein Huhn; sein Gefieder ist ganz weiß, eine gelbe Tinte unter den Flügeln und den Seitenfedern des Schwanzes ausgenommen; Schnabel und Füße

1) Psittacus albus cristatus. *Aldrovande Avi. tom. I. p. 668. L. II. C. 4.) Jonston Avi. p. 22. — Willughby, Ornithol. p. 74. — Ray Synopf. p. 30. n. 1. — Charleton Exercit. p. 74. n. 3.* idem. *Onomat. p. 66. n. 3.* — Kakatocha tota alba. *Klein Avi. p. 24. n. 6.* — Psittacus major brevicaudus, cristatus, niveus, capitis vertice nudo; remigibus majoribus et rectricibus lateralibus interius prima medietate sulphureis . . . Cacatua. *Briss. Ornithol. tom. III. p. 204. t. 21.* (Ed. in 8. 2. p. 99. n. 8.)

1) Le Kakatoes a hupe blanche. *Buffon Oiseaux in 12. Tom. XI. p. 128. n. 1.* Kakatoes des Moluques. *Buff. Planch. enl. 263.* Der ganz weiße Kakatoeha. Klein Vögel in 8. S. 46. *n. 6.* in 4to. S. 25. *n. 7.* Psittacus (cristatus) albus crista plicatili. *Linné Syst. Nat. XII. 1. p. 143.*

sind schwarz; seine schöne Haube ist das merkwürdigste; sie besteht aus zehn oder zwölf großen Federn, die nicht von der Art der weichen Federn, sondern von Natur wie Schwungfedern mit breiten Fahnen sind; sie sind von der Stirne nach hinten in zwey parallelen Linien gepflanzt, und bilden einen doppelten Fächer.

Der Kakatu mit der gelben Haube.

2. Der Kakatu mit der gelben Haube. m) 1)

Buff. Pl. enl. 14.

In dieser Gattung giebt es zwey Rassen, die sich nur durch die Größe von einander unterscheiden. Die Abbildung stellet den kleinen Race vor.

m) Psittacus albus galeritus. *Frisch. tab.* 50. Halle 2. *p.* 115. *n.* 31. — Kakatocha alba. *Klein, Avi. p.* 24 *n.* 15. — Psittacus Brachyurus albus, crista dependente flava. *Linn. Syst. Nat. ed. X. Gen.* 44. *Spec.* 16. — Avis Kakatocha orientalis, ex insulis Moluccis, cristata candidissima et sulphurea. *Seba. Vol. I. p.* 94. mit einer wenig genauen Zeichnung. Cackatoo ou Perroquer a tete blanche. *Albin. Tom. III. p.* 6. *tab.* 12. mit einer schlechten Figur und schlechten Ausmahlung. Psittacus major brevicaudus, cristatus, albus, inferne sulphureo adumbratus, crista sulphurea; macula infra oculos saturate sulphurea; rectricibus lateralibus interius prima medietate sulphureis. . . Cacatua, luteo cristata. *Briss. Ornithol. tom. IV. p.* 206. (Ed. in 8. Tom. II. p. 100. n. 9.)

1) Psittacus (cristatus) albus crista plicatili flava. *Linné Syst. Nat. XII. 1. p.* 143. *n.* 22.

Der Kakatu mit der gelben Haube.

Bey dem einen und dem andern ist das Gefieder weiß, mit einer gelben Tinte unter den Flügeln und dem Schwanze, und Flecken von eben der Farbe um die Augen herum; die Haube ist citrongelb, sie besteht aus langen, weichen, und faserichten Federn, die der Vogel erhebt und vorwärts fallen läßt; der Schnabel und die Füße sind schwarz. Es ist ein Kakatu von dieser Gattung und wahrscheinlich der erste, den man in Italien gesehen hat, welchen Aldrovand beschreibt; er bewundert die Niedlichkeit und Schönheit dieses Vogels, der übrigens eben so fähig, eben so sanft und gelehrig ist, als der von der ersten Gattung. Ich habe einen von diesen Papageyen lebend gesehen; die Art, wie er seine Freude ausdrückt, besteht darin, daß er mehrmals seinen Kopf lebhaft auf und ab bewegt, mit seinem Schnabel ein wenig knarrt, und seine schöne Haube erhebt; er giebt Liebkosung um Liebkosung; er berührt das Gesicht mit seiner Zunge, und scheinet einen lecken zu wollen; er giebt sanfte und liebliche Küsse; aber am angenehmsten scheint es ihm zu seyn,

Der weiße Kakatöhe. Klein Ord. d. Vögel in 8. S. 46. *n.* 5. in 4to. S. 25. *n.* 6.

Le Kakatoës a hupe jaune. *Buffon Oiseaux in* 12. *Tom. XI. p. 129. n. 2. pl. 3.*

Der Kakatu. Müller Naturſyſt. 2. *p.* 139 *n.* 22.

Lesser white Cockatoo. *Edw. glean. t.* 317. *Lath. Synopſ. I. 1. p. 258. n. 64.*

Psittacus (sulphureus) albus, crista plicatili acuminata, et macula infra oculos sulphureis. *Linné Syst. Nat. XIII. 1. p. 330. n. 94.*

Der kleine weiße Kakatua mit einem gelben Federbusche. Seligmann *IX. tab.* 7. (nach Edw.)

seyn, wenn man ihm die platte Hand unter den Körper legt, und mit der andern seinen Rücken berührt, oder bloß den Mund nahe bringt, um ihn zu küssen; alsdann drückt er sich fest auf die Hand, auf die er ruht, schlägt mit den Flügeln, öfnet den Schnabel halb, athmet stark, und scheint die grösseste Wollust zu empfinden; man kann sich, so oft man will, diese kleine Lust mit ihm machen; ein anderes von seinen Vergnügen macht man ihm, wenn man ihn kratzet, er zeigt seinen Kopf mit der kahlen Platte, hebt den Flügel auf, daß man ihm darunter reibe; er wetzt oft seinen Schnabel, indem er an Holz frißt und es zerbricht; es ist ihm unerträglich im Bauer zu seyn, aber er bedient sich dieser Freyheit blos, um seinem Herrn nahe zu seyn, den er nicht aus dem Gesicht verliert; er kommt, wenn man ihn ruft, und geht weg, wenn man es ihm befiehlt; doch zeigt er dabey seinen Kummer, den ihm dieser Befehl verursacht, indem er sich oft umkehrt, und Achtung giebt, ob man ihm nicht ein Zeichen zurückzukommen giebt; er ist sehr reinlich, und alles sein Betragen ist sehr artig und gefällig; er frißt Obst, Hülsenfrüchte, alle mehlichte Saamen, Backwerke, Eyer, Milch und alles, was süß ist, ohne zu sehr gezuckert zu seyn; übrigens war das Gefieder dieses Kakatu schöner weiß, als das von dem, welchen wir abgemahlt liefern n).

n) Dieser Vogel ist jetzt zu Nanci bey einer schönen, liebenswürdigen Frau, welche ihre große Freude daran hat. Anmerk. von Herr Sonini de Manancour.

Anhang.

Der Kakatu mit dem Zopfe (Crested cockatoo des Wirh,) scheinet auch hieher zu gehören. Er sagt: Ich kann diesen Vogel nicht anders als eine Abänderung von Linnés Kakatu (Psittacus cristatus) betrachten. Der Vogel scheint großer Abänderung, sowohl in der Größe als Farbe fähig zu seyn. Bey einigen erscheint das Weiße viel reiner als bey andern, und das Gelbe an dem Zopfe und Schwanze mehr hervorstechend. Alle bis jetzt bekannte Abarten haben schwarze Schnäbel und Beine. Der hier abgebildete Vogel scheinet etwas schlankere Gestalt als gewöhnlich zu haben. Die Farbe ist nicht rein weiß, sondern ein wenig auf den obern Theilen, und besonders auf dem Halse und den Schultern dunkel gefärbt. Die Federn auf der Stirn sind weiß, aber die langen lancettförmigen Federn daselbst, welche den Zopf bilden, sind hell Jonquillengelb. Der Schwanz ist oben weiß, und unterwärts gelblich; so auch die Flügel 2).

2) *White Voy. to N. S. Wales. p. 237. t. 26.*

O.

Der Kakatu mit der rothen Haube.

3. Der Kakatu mit der rothen Haube. o) 1)

Pl. enl. 498.

Dieser ist einer von den größesten in diesem Geschlecht, indem er gegen anderthalb Fuß lang ist; das oberste seines Zopfs, welcher nach hinten

o) Pſittacus major brevicaudus, criſtatus, albus, roſeo adumbratus, criſta ſubtus rubra, rectricibus lateralibus interius prima medietate ſulphureis. . . Cacatua rubro criſtata. *Briſſ. Ornithol. tom. IV. p. 209.* — Greater Cochateo. *Edwards, tom. IV. pl. 160.*

1) *Briſſ. ornith. ed. in 8. Tom. II. p. 101. n. 10.*

Weißer Kakatoeha mit pomeranzenfarbenem Buſche vom erſten Range. Klein Hiſt. d. Vögel in 4. S. 25 und 27. *n.* 5. Halle 112. n. 23.

Der größere Kakatoeha. Seligmann Vögel *VI. tab.* 55. (nach Edw.)

Pſittacus (moluccenſis) albus in colorem dilute roſeum inclinans, criſta ſubtus rubra, rectricibus lateralibus intus a baſi ad medium usque ſulphureis. *Linné Syſt. Nat. XIII. 1. p. 331. n. 96.*

Ka-

ten zu fällt, besteht aus weißen Federn, und bedeckt einen Bündel von rothen Federn.

V.

Kakatoës a hupe rouge. *Buffon Oiseaux VI. p. 95. pl. enl. 498.*

Great red crested Cockatoo. *Lath. Synopf. I. 1. p. 257. n. 62.*

O.

Anhang.

Der Verfasser ist in der Beschreibung dieses Vogels sehr kurz, und scheint sich auf die angeführten Beschreibungen zu beziehen. Brißon sagt: er ist ohngefähr so dick als der brasilianische Ara; seine Länge beträgt 1 $\frac{5}{12}$ Fuß und 3 linien, der Schnabel ist 2 $\frac{5}{12}$ Zoll dick, und 1 $\frac{3}{4}$ Zoll lang; der Schwanz sechs Zoll; der äußerste Vorderzehe 2 $\frac{1}{4}$ Zoll, der innere 1 $\frac{5}{12}$ Zoll; der äußerste Hinterzehe zwey Zoll, der innere Hinterzehe vierzehn linien. Die ausgebreiteten Flügelspitzen stehen viertehalb Fuß und sechs linien von einander. Die zusammengelegten Flügel gehen fast bis an das Ende des Schwanzes. Der Zopf besteht oben aus weißen, und unten aus rothen Federn. Von diesen Federn sind die vordersten 6 $\frac{1}{2}$ Zoll lang; die übrigen werden allgemach kürzer. Uebrigens ist dieser Zopf wie bey den übrigen Kakatus beschaffen. Die Augen umgiebt eine nackte grauweiße Haut; die Sehe ist schwarz, die Regenbogenhaut aber dunkel röthlich. Die Wurzel des Oberkiefers umgiebt eine nackte schwarze Haut, worin die Nasenlöcher liegen. Der Schnabel und die Nägel sind schwarzbläulich; die Füße aber sind bleyfarbig. Der Vogel hält sich auf den Molukkischen Inseln auf. Briß. a. a. O.

Klein

Klein sagt: er habe ihn zuerst (in seinem Prodromo avium) für einerley Vogel mit dem vorhergehenden Kakatu mit gelber Haube gehalten. Allein Herr Hofrath Wagner habe ihn eines andern überzeugt, und folgende Nachricht zugeschickt. Weil ich höre, daß Sie Paralipomena der Vogelgeschichte sammlen, so nehme ich mir die Freyheit zu erinnern, daß es S. 24. §. 15. n. 5. scheinet, als hielten Sie den weißen Kakatu mit safrangelben Busche auf dem Kopfe, und den ostindischen Kakatu von den Molukken für eine Art. Allein ich kann aufs gewisseste versichern, daß es zwo ganz unterschiedene Arten sind; denn wir haben sie hier beyde lebendig, und zu gleicher Zeit einige Jahre gehabt. Die erste Art mit safrangelben oder vielmehr mit ponceaurothen Federn auf dem Kopfe ist mehr als noch einmal so groß, und fast einem sogenannten indianischen Raben Macaov gleich, nur daß er einen kurzen und breiten Schwanz, etwas niedrige Beine, und fast größeren Kopf hat. In der Huppe auf den Kopf sind die größesten Federn fast eine Spanne lang, die obern weiß, und die darunter liegenden ponceaufarbig; die er nach Belieben aufrichten, vorwärts ziehen, und wiederum hinterwärts auf den Hals zurück legen kann. Der Schnabel und die Beine sind schwarz, und völlig so groß als bey einem indischen Raben. Diese Sorte ist rar und theuer. Er war damals der einzige in Holland, als ihn Sr. Durchl. (der Herr Markgraf von Brandenburg Culmbach) für hundert Louisd'or kaufen ließ. Er sprach verschiedene Worte ganz deutlich, und konnte lachen wie ein Mensch.

Der kleinere war so groß als eine Taube, hatte einen schwefelgelben Busch, und kam mit des Seba seiner völlig überein.

Daß aber die erste Sorte mit rothen Busche auch aus Ostindien, oder den Molukkischen Inseln komme, bezeuget Barchewitz in seiner ostindischen Reisebeschr. S. 147. u. 604. Wagner bey Klein a. a. Ort.

4. Der kleine Kakatu mit dem fleischfarbenen Schnabel. p) 1)

Buff. Planch. enl. 191.

Sein ganzes Gefieder ist weiß, einige blaßrothe Tinten auf den Schläfen, und an den Federn unter der Haube ausgenommen; diese rothe Tinte

p) Psittacus major brevicaudus, cristatus, albus, crista in exortu sulphurea, subtus pallide rubra, rectricibus cauda inferioribus pallide rubris albo terminatis; rectricibus lateralibus interius sulphureis. . . , Cacatua minor. *Briss. Ornithol. tom. IV. p. 211.* (Ed. in 8. Tom. II. p. 102. n. 11.)

v.

1) Psittacus (philippinarum) alba, crista sulphurea plicatili apice alba, orbitis ex flavicante rubris, tectricibus caudae inferioribus rubris albo punctatis. *Linné Syst. Nat. XIII. 1. p. 331. n. 95.*

Psittacus haematuropygius. Rother Kakatu. Müller Suppl. S. 77. *n.* 51.

Petit Kakatoës a bec couleur de chair. *Buffon Oiseaux VI. p. 96. Ed. in 12. XI. p. 133.*

Petit Kakatoës des philippines. *Buff. Planch. enl. 191.*

Red-

Der kleine Kakatu mit den Fleischfarbenen Schnabel

S. 30.

Brüff. Vögel XIX. Th. v. Brüff. fol. Pl. 191.

Tinte wird an den Deckfedern unter dem Schwanze stärker. An dem Anfange der Schulterfedern, der Federn seiner Haube, und an der innern Seite der Schwung- und dem größten Theil der Schwanzfedern, siehet man ein wenig hellgelb; die Füße sind schwärzlich; der Schnabel ist röthlichbraun, welches an dieser Gattung etwas besonderes ist, da alle Kakatuen einen schwarzen Schnabel haben. Es ist auch der kleinste, den ich in diesem Geschlecht kenne; Brisson vergleicht ihn in Absicht auf die Größe mit dem guineischen Papagey: indessen ist dieser doch weit kleiner; er hat eine Haube die rükwärts liegt, und die er nach Belieben erheben kann. Ich muß bemerken, daß der Vogel, den Brisson den Kakatu mit rothen Flügeln und rothem Schwanze nennt o), kein Kokatu zu seyn scheint, weil er der Haube nicht erwähnt, die doch der unterscheidende Charakter dieser Papagayen ist r); sonst redet er von diesem Vogel nur nach Aldrovande, der sich so ausdrückt: „Dieser Papagey muß unter die größten gezählt werden; er ist von der Größe eines Kapauns; sein ganzes Gefieder ist aschfarbenweiß; sein Schnabel ist schwarz und stark gebogen; das untere des Rückens,

Red-vented Cockatoo. *Brown. illustr. p. 10. tab. 5. Lath. Synops. l. i. p. 258. n. 63.*

♂.

q) *Ornithol. Tom. IV. p. 214. (Ed. in 8. Tom. II. p. 102. n. 12.)* Psittacus erythroleucus. L.

♀.

r) *Edw. pl. 160.*

der Steis, der ganze Schwanz und die Schwungfedern sind zinnoberroth s). Alle diese Abzeichen würden recht gut auf einen Kakatu passen, wenn die Haube dazu käme, und dieser große roth und weiße Papagey des Aldrovande, den wir nicht kennen, würde in diesem Falle eine fünfte Gattung der Kakatuen, oder eine Spielart in einer von den vorigen Gattungen ausmachen.

s) Psittacus erythroleucus. *Aldrovand. Av. Tom. I. p. 675.*

Psittacus major brevicaudus, sordide albus, ad cinereum vergens; uropygio, remigibus rectricibusque miniaceis. Le Kakatoes a ailes et queue rouges. Cacatua alis et cauda rubris. *Briss. l. c.*

Red and white Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 8. Lath. Synopf. l. 1. p. 260. n. 67.* Kakatoës a ailes et queue rouges. *Buff. Ois. p. 96. Ed. in 12. XI. p. 134. Halle 2. p. 112. n. 24.*

Psittacus (erythroleucus) cinereus, uropygio rectricibus remigibusque coccineis. *Linné Syst. Nat. XII. 1. p. 144. n. 23. XIII. 1. p. 332. n. 23.*

Der kleine rothbauchige Kakatu. *S. 53.*

Büff. Vögl. XIX. B. *Braun illustr.*

Anhang.

Der kleine rothbauchige Kakatu. [2])

Die Größe dieses Vogels kommt mit der des grauen Papageys überein. Der Kreis um den Augen ist gelblich roth. Der Schnabel ist weiß mit gelber Spitze. Die untern Schwanzdecken sind weiß mit karmosin Binden; die vier untersten Schwanzfedern sind hellgelb. Die Farbe des Schopfs ist weiß, ausgenommen eine oder zwey Federn unterhalb demselben, welche dazu dienen, denselben zu unterstützen wenn er aufgerichtet ist. Das übrige Gefieder dieses Vogels ist weiß, mit einem gelblichen Anstrich an dem Keilende der Federn. Dieser seltne Vogel war in der Sammlung der Lady Read. Brown.

2) The red-vented Cockatoo. *Brown. Illustr. p. 10. tab. 5.*

5. Der schwarze Kakatu. 1) 2)

Seligm. IX. *tab.* 6.

Edwards, welcher diesen Kakatu mitgetheilt hat, sagt: er sey eben so groß als ein Ara; sein ganzes Gefieder ist blaulich schwarz, und auf dem Rücken und den Flügeln dunkeler als auf der Unterseite des Körpers. Die Haube ist braun oder schwärzlich, und der Vogel hat, wie alle andere Kakatuen das Vermögen, sie empor zu heben, und sie wieder fast ganz platt an den Kopf niederzulegen. Die Backen sind unter dem Auge mit einer rothen nackten, und runzlichten Haut versehen, welche

1) The great black Cockatoo. *Edwards Glean.* part. III. p. 229. pl. 316.

V.

2) Der große schwarze Kakatua. Psittacus cristatus magnus niger. Seligm. Vögel IX. tab 6.

V.

Psittacus (aterrimus) niger, crista magna dilutiore, genis rubris nudis. *Linné Syst Nat* XIII. 1. p. 330. n. 93. (*Linn. Syst.* XII. sub Psitt. cristato. p. 144.)

Black Cackatoo. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 260. n. 66.

Der Schwartze Kakatu.

S. 54.

Krüger jun. del.

Büff Vögel XIX. Th.

Seelig. IX. t. 6.

welche den untern Kiefer des Schnabels umgiebt, dessen Farbe schwärzlich braun ist, wie die Farbe der Füße; das Auge ist schön schwarz, und man kann sagen, daß dieser Vogel der Neger unter den Kakatuen ist, deren Gattungen sonst alle weiß sind; er hat einen ziemlich langen Schwanz, welcher aus gestuften Federn besteht.

Die nach der Natur gemachte Abbildung ward von Edwards aus Zeilon geschickt, und er glaubt denselben Kakatus unter einer von den Figuren, welche van der Meulen in Amsterdam 1707 herausgegeben hat, und von Peter Schenk unter dem Namen des indianischen Raben geliefert ist, zu erkennen 2).

2) Wenn dieser Vogel nicht weiter, als nach der Edwardschen Abbildung bekannt wird, so könnte es wohl gar ein im Bauer schwarz gewordener Papagey seyn.

Anhang.

Ich will hier die Beschreibung eines Vogels folgen lassen, welchen White in Neusüdwales gefunden hat, und zu den Kakatus rechnet. Er sagt: „der Banksche Kakatoo von Neuholland, ist wenig von Lathams seinem, in dem Supplement beschriebenen, verschieden. Die Hauptfarbe ist olivenfarbig oder rostschwarz. Die Kopffedern sind ziemlich lang, und an den Seiten des Kopfs und des Zopfs, ist eine Mischung von schönem Gelb; aber keine von den Federn hat, (wie bey dem Lathamschen), an dem Ende einen büffelfarbigen Flecken, noch ist der untere Theil des Leibes mit Büffelfarbe durchkreutzt. Im dem Wuchse ist er kaum von der Lathamschen Abbildung verschieden.“ *White N. S. Whales. p.* 139. *t.* 3.

Er kommt in verschiedenen Stücken dem Neuholländischen Papagey, welcher auch solchen Zopf hat, nahe.

O.

Die

Die eigentlich sogenannten Papageyen.

Unter den Namen der eigentlich sogenannten Papageyen verstehen wir diejenigen Vögel, welche aus der alten Welt sind, und einen kurzen Schwanz haben, dessen Federn beynahe von gleicher Länge sind. Man gab ihnen ehemals den Namen Papegaurs, und wandte den Namen perroquet auf die Perruchen an a): nun ist das Gegentheil gebräuchlich geworden. Und da der Name Papegour oder Papegait vergessen worden, habe ich ihn auf die Familie der amerikanischen Papageyen übergetragen, welche nichts rothes in den Flügeln haben, um sie durch diesen generischen Namen von den Amazonen zu unterscheiden, deren Hauptabzeichen das rothe auf den Flügeln ist. Man kennt acht Gattungen von diesen eigenthümlichen Papageyen, die alle aus Afrika und dem großen Indien herstammen, und von diesen acht Gattungen man keine einzige in Amerika findet.

a) *Belon Nat. des Oiseaux. p. 298.*

I. Der Jaco oder aschenfarbne Papagey. b) [1])

a) *Buff. Pl. enl.* 311.

b) *Edw.* t. 163. (nach Seligmann Vögel *VI. tab.* 58.)

Dieses ist die Gattung, welche man jetzt am meisten nach Europa bringt, und die sowohl wegen der Annehmlichkeit ihrer Sitten, als wegen ihrem

b) Psittacus cinereus, seu subcaeruleus. *Aldrovande. Avi. tom. I. p. 675.* — *Willughby, Ornithol. p. 76.* — *Ray Synops. avi. pag. 31. n. 7.* — Psittacus cinereus cauda rubra. — *Frisch tab. 51. Klein, Aves. p. 25. n. 13.* Psittacus cinereus. *Jonston, Avi. p. 23.* — *Barrère Ornithol. Class. III. Gen. II. Sp. 2.* — *Charleton Exercit. p. 74. n. 8.* — Idem *Onomat. p. 67. n. 8.* Psittacus brachyurus canus, temporibus albis, cauda coccinea. . . . Psittacus erithacus. *Linn. Syst. Nat. ed. X. Gen. 44. Sp. 20.* — Grand papegaut. *Belon, Nat. des Oiseaux. p. 297.* mit einer schlechten Abbildung. *Belon portrait d'Oiseaux. p. 73.* a Papegay grand. Perroquet grand.

Perroquet de Fresne. *Albin av. Tom. I. pl. 12.*

Psittacus major brevicaudus, cinereus, oris pennarum in capite, collo et corpore inferiore cinereo-albis; uropygio et imo ventre cinereo-albis, oris pennarum cinereis; oculorum ambitu nudo

Der Faco oder aschenfarbene Papogey"

S. 58

Der Jaco od. Aschfarbne Papagey

S. 58.



Büff Vögel XIX Th. v. Büff. fol. Pl. 311.

ihrem Talent und ihrer Gelehrigkeit am beliebtesten ist, worin sie dem grünen Papagey wenigstens gleich kommt, ohne sein unangenehmes Geschrey zu haben. Das Wort Jaco, welches dieser Papagey gern auszusprechen scheint, ist der Name, den man ihm gewöhnlich giebt. Sein ganzer Leib hat eine schöne perlgraue und Schieferfarbe, welche dunkler oben auf dem Leibe, und weißlicher am Unterleibe ist; der Schwanz ist scharlachroth, und beschließt und hebt dieses glänzende, weiche, und gleichsam weiß gepuderte Gefieder von frischem Ansehen. Das Auge steht in einer weißen Haut, welche nackt, rauh ist, und die Backen bedeckt; der Schnabel ist schwarz. Die Füße sind grau; die Regenbogenhaut ist goldgelb: die Länge des ganzen Vogels beträgt einen Fuß. Die meisten dieser Papageyen werden aus Guinea gebracht c); sie kommen aus dem innern der länder dieses Theils

von

do candido; rectricibns coccineis. . . . Psittacus Guineensis cinereus. *Briss. Ornithol. tom. IV. p.* 310. (Ed. in 8. II. p. 127. n. 59.

V.

1) Psittacus (erithacus) brachiurus canus temporibus nudis albis cauda coccinea. *Linné Syst. Nat.* XII. I. *p.* 144. *n.* 24. XIII. I. *p.* 332. α. Aschgraue Papagey. Klein Ord. *p.* 47. *n.* 13. in 4to. *p.* 26. *n.* 19. *Mus Adolph. Frid.* I. *p.* 14. *Scopol. Ann.* I. *p.* 31. *n* 30. Der aschgraue Papagey mit rothem Schwanze. Scop Günther. *p.* 25 *n.* 30. *Lath. Synops.* I. I. *p.* 161. *n.* 68. Der aschfarbene Papagey. Halle Vögel 2. *p.* 116. *n.* 32.

D.

c) *Willughby.*

von Afrika d); man findet sie auch in Congo e), und auf der Küste von Angola f). Man lehrt sie sehr

d) Man findet sie an der ganzen Küste von Guinea, aber in kleiner Anzahl, und sie müssen größtentheils mitten aus dem Lande kommen. Man schätzet die von Benin, Calbari, Cabolopez höher, und deßfalls bringt man sie von da hieher. Man hütet sich aber nicht, daß sie viel älter sind, als die, welche man hier haben kann, und daß sie folglich nicht so gelehria sind, und nicht so leicht etwas begreifen. Alle Papageyen sind hier an der Küste, wie in dem Winkel von Guinea und den dazu gehörigen Oertern von blauer Farbe. — Diese Thiere sind so gemein in Holland, daß man sie dort weniger schätzt als hier, und daß sie dort nicht so theuer sind. *Bosman Voy. en Guinee. Utrecht.* 1705. Albin irret, wenn er sagt, daß diese Art aus Ostindien komme, sie scheint in Afrika eingeschränkt zu seyn; und höchst wahrscheinlich findet sie sich nicht in Amerika, obgleich Brisson sie in Jamaika setzt. Er that dies augenscheinlich nach Browns und Sloanes Anzeige; aber ohne sie nachzusehen, denn Sloane (Iamaic. II. p. 297.) sagt ausdrücklich, daß die Papageyen, die man in großer Anzahl zu Jamaika sehe, alle von Guinea dahin gebracht sind; diese Art findet sich nicht natürlich in einem Lande der neuen Welt. Unter der Menge Papageyen, welche man zu Para findet, kennet man nicht die graue Art, welche so gemein in Guinea ist. *Voy. de la Condamine. p.* 173. Thevet Singularités de la *France antarctique. Paris* 1558. *p.* 92.

V.

e) *Recueil des Voy. qui ont servi a l'etabliss. de la Compagnie des Indes. Amst.* 1702. *Tom. IV. p.* 321.

V.

f) *Hist. gener. des Voyages. T. V. p.* 76.

V.

sehr leicht reden g), und sie scheinen am liebsten die Stimme der Kinder nachzuahmen, und in dieser Absicht sich am leichtesten von ihnen unterrichten zu lassen. Uebrigens haben die Alten h) angemerkt, daß alle Vögel, die die menschliche Stimme nachzuahmen fähig sind, die Kinder am liebsten hören, und ihre Sprache nachmachen, da sie nicht so stark artikulirt ist, und wegen des hellen Tons mehr Analogie mit ihrem Stimmenwerkzeuge hat; indessen ahmt dieser Papagey auch den tiefen Ton einer ausgebildeten Stimme nach, aber diese Nachahmung scheint ihm mühsam zu seyn, und die Wörter, die er mit dieser Stimme ausspricht, sind nicht so deutlich. Einer von diesen Papageyen aus Guinea, welcher auf der Reise von einem alten Matrosen unterrichtet worden war, hatte seine heisere Stimme, und seinen Husten so vollkommen angenommen, daß man sich darin irren konnte; ob man ihn

g) Sie vermehren sich auch auf Isle de France und Bourbon, wohin man sie gebracht hat. *Lettres edifiantes, Recueil 18. p. 11.* Man lebte auf dieser Insel Maurice von Schildkröten, Tauben, grauen Papageyen und anderem Wilde, das man mit den Händen in den Wäldern greifen konnte. Außer den Nutzen, welchen man daraus zog, fand man viel Vergnügen daran. Bisweilen ließ man einen gefangenen grauen Papagey schreyen, und alsbald sahe man hundert um sich herfliegen, welche man dann mit Stöcken todt schlug. *Recueil des Voyages, qui ont servi a l'etablissement de la Compagnie des Indes. Amst. 1702. Tom. III. p. 195.*

h) *Albert. Lib. XXIII.*

ihn gleich hernach einer jungen Person gegeben hatte, und er nichts mehr als ihre Stimme hörte, so vergaß er doch die Unterweisungen seines ersten Lehrers nicht, und nichts war so lustig, als ihn von einer sanften und angenehmen Stimme in seine alte Heiserkeit, und in den Ton eines Seemannes übergehen zu hören. Dieser Vogel hat nicht nur die Geschicklichkeit die Stimme des Menschen nachzuahmen, er scheint auch eine Begierde darnach zu haben; man bemerkt sie bey seiner Aufmerksamkeit im Zuhören, und an der Mühe, die er sich giebt sie zu widerholen; und dieses Bestreben erneuert sich jeden Augenblick, denn er plaudert ohne Aufhören einige von den Sylben, die er gehört hat, und er sucht alle Stimmen die ihm vors Ohr kommen zu überschreien, indem er die seine mehr hindurch hören läßt. Oft erstaunt man ihn Wörter oder Töne wiederholen zu hören, die man ihn nicht gelernt hat, und von denen man nicht vermuthet, daß er sie gehöret hätte i): es scheint, daß er sich eine Tagsarbeit aufgiebt, und jeden Tag seine lection zu behalten sucht k); er ist sogar im Schlaf damit be-

i) Zum Beyspiel der Papagey Heinrichs des Achten, dessen Aldrovand erwähnt welcher in die Temse fiel und die Schiffer zu Hülfe rief, wie er sie von den Reisenden am Ufer hatte rufen gehöret. Er soll gerufen haben: Ein Boot für zwanzig Pfund!

V

k) Cardan geht so weit, daß er ihnen Nachdenken und inneres Ueberdenken über das, was man ihm bezeichnet hat, beylegt, und zwar, sagt er, aus Nachahmung und zum Ruhm, meditatur ob studium

beschäftigt, und Markgrav sagt: er schwatze im Schlaf l). Hauptsächlich sind es seine ersten Jahre, in welchen er diese Fähigkeit zeigt, wo er am meisten Gedächtniß, und wo man ihn am gescheidsten und gelehrigsten findet. Wenn dies Gedächtniß bey guter Zeit angebauet wird, wächst es zuweilen bis zum Erstaunen: wie z. B. bey dem Pagayen, von welchem Rhodiginus spricht m), und den ein Cardinal für hundert Sonnenthaler kaufte, weil er das apostolische Glaubensbekentniß ohne Anstoß hersagte n): wenn er aber älter wird, so wird er wiederspenstig, und lernt mit vieler Mühe. Uebrigens räth Olina die Abendstunde, wenn die Papageyen gegessen haben, zu ihrem Unterricht zu wählen, weil sie, wenn sie gesättigt sind, gelehriger und aufmerksamer werden. Man hat die Erziehung

dium gloriae.). Es muß die Liebe zum Wunderbaren mächtiger bey dem Philosophen gewesen seyn, daß sie ihn zu solchen Ungereimtheiten verleitete.

V.

l) Marcgrave versichert bey der von Aristoteles (Lib IV. Hist. anim. Cap. X.) unentschieden gelaßnen Frage: ob die aus einem Ey gebohrnen Vögel Träume hätten. Testor de meo psittaco, quem Lauram vocabam, quod saepius de nocte se ipsum expergiscens, semisomnus locutus est. *Marcgr.* p. 205.

V.

m) *Caelius Rhodig. antiq. lect.* Lib. III. Cap. 32.

n) Herr Boode versichert uns, einen Papagey gehabt zu haben, welcher auf dem Schiffe den Matrosen das Gebet vorsagte und nach dem Rosenkranz betete.

V.

ziehung des Papagey, mit der Erziehung des Kindes verglichen o); man hätte oft mehr Ursach die Erziehung des Kindes, mit der Erziehung des Papagey zu vergleichen; der, welcher in Rom einen Papagey unterrichtete, hielt eine kleine Ruthe in der Hand, und schlug ihm damit auf den Kopf. Plinius sagt: seine Hirnschaale sey sehr hart, und wenn ihn der, der ihn unterrichte, nicht stark treffe, so fühle er nichts von den Schlägen, mit denen man ihn strafen wolle p). Indessen fürchtet der, von welchem wir reden, die Peitsche so sehr oder mehr als ein Kind, das sie oft könnte gefühlt haben. Wenn er den ganzen Tag auf seine Stange gesessen hatte, und die Stunde in den Garten zu gehen herankam, und er von ungefehr zu bald herabstieg, (welches ihm doch selten begegnete) so war es genug, wenn man ihm nur mit der Peitsche drohete, oder sie ihm zeigte, um ihn eilend wieder hinaufzujagen. Er kam alsdann nicht mehr herab, sondern bezeigte nur seinen Verdruß und seine Ungeduld durch ein Schlagen mit den Flügeln, und durch Geschrey, welches er ausstieß. „Es ist natürlich zu glauben, daß der Papagey sich nicht selbst reden hört, sondern daß er meint, daß Jemand anders mit ihm rede: man hat ihm oft hören sich ein Pfötchen abfordern, und er ermangelte nicht auf seine eigne Frage zu antworten, indem er würklich das Pfötchen hinstreckte. Ob er schon den Ton der Kinderstimme sehr liebte, so zeigte er doch viel Haß gegen sie;

o) *Aelian.*

p) *Plin.* Lib. X. Cap. 42.

sie; er verfolgte, und wenn er sie erwischen konnte, so biß er sie bis aufs Blut. So wie er Gegenstände des Hasses hatte, so hatte er auch Gegenstände der heftigsten Liebe; sein Geschmack war zwar nicht sehr fein, aber er war sehr beständig; er liebte, allein er liebte bis zum rasendwerden die Küchenmagd, er folgte ihr überall nach, suchte sie an den Oertern auf, wo sie seyn konnte, und fast niemals vergebens; wenn er sie eine Zeitlang nicht gesehen hatte, so kletterte er mit dem Schnabel und den Klauen bis zu ihren Schultern hinauf, machte ihr tausend Liebkosungen und verließ sie nicht mehr, so viel Mühe sie sich auch gab, sich von ihm los zu machen, den Augenblick war er wieder hinter ihr; seine Anhänglichkeit hatte alle Zeichen der empfindsamsten Freundschaft; dieses Mädchen hatte ein beträchtliches und langwieriges Uebel an einem Finger, welches so schmerzhaft war, daß es sie zum Schreyen zwang; die ganze Zeit, daß sie sich klagte, gieng der Papagey nicht aus ihrer Kammer; er hatte das Ansehen, als ob er sie beklagte, indem er selbst klagte, aber so traurig, als wenn er wirklich litte. Jeden Morgen war sein erster Gang zu ihr; sein zärtliches Theilnehmen dauerte so lange als ihre Krankheit, und sobald sie davon befreyt war, wurde er ruhig, und liebte sie so als vorher. Indessen schien ihm diese heftige Neigung gegen dieses Mädchen mehr durch einige Umstände, die Beziehung auf ihren Dienst in der Küche hatten, als durch ihre Person eingeflößt zu seyn; denn da dieses Mädchen mit einer andern wechselte, so änderte die Neigung des Papagey bloß ihren Gegenstand, und schien von dem ersten Tage an eben so stark gegen diese neue Köchinn zu seyn, und folglich

geschwinder, als ihre Gefälligkeiten sie hätten einflößen oder gründen können q). Die Talente der Papageyen von dieser Gattung schränken sich nicht bloß auf die Nachahmung der Sprache ein, sie lernen auch gewisse Gebehrden und Bewegungen nachmachen. Scaliger hat einen gesehen, welcher den Tanz der Savoyarden nachahmte, und ihr Liedchen dazu wiederholte; dieser hörte sehr gern singen, und wenn er tanzen sah, hüpfte er auch herum, aber mit dem elendesten Anstande von der Welt, indem er die Pfoten einwärts setzte, und plump hinter sich fiel; dieses war seine größte Munterkeit; man fand auch eine tolle Freude und unaufhörliches Gewäsche an ihm, wenn er trunken war; denn alle Papageyen lieben den Wein, und zwar den spanischen oder Muskatenwein, und man hat schon zu Plinius Zeiten die Anwandelungen von Lustigkeit bemerkt, die die Weindünste in ihnen erregen r). Im Winter suchte er das Feuer; sein größtes Vergnügen in dieser Jahreszeit war, auf dem Kamin zu seyn, und wenn er sich erwärmt hatte, so zeigte er durch verschiedene Ausdrücke der Freude, wie wohl ihm war. Die Sommerregen machten ihm eben soviel Vergnügen, er blieb ganze Stunden darin, und damit die Nässe besser durchdringen konnte, breitete er seine Flügel aus, und ver-

q) Diese Anmerkung hat mir die Frau Nadault, meine Schwester, welcher dieser Papagey zugehörte, mitgetheilt.

v.

r) In vino praecipue lasciva. *Plin.* Lib. X. C. 42.

verlangte nicht eher unter das Dach zu gehen, als bis er bis auf die Haut naß war. Wann er auf seine Stange zurückkam, zog er alle seine Federn eine nach der andern durch den Schnabel; in Ermangelung des Regens badete er sich mit Vergnügen in einem Gefäße mit Wasser, und gieng öfters nach einander hinein, hatte aber immer große Sorge, daß sein Kopf nicht naß wurde; so gern er sich im Sommer badete, so sehr scheuete er es im Winter; wenn man ihm in dieser Jahrszeit ein Gefäß mit Wasser zeigte, so floh er, und schrie sogar dazu. Zuweilen sah man ihn gähnen, und dieses war fast immer ein Zeichen des Verdrusses. Er pfiff stärker und reiner als ein Mensch, aber, ob er gleich verschiedene Töne angab, so konnte er doch nie eine Arie pfeifen lernen. Er ahmte vollkommen das Geschrey der wilden und Hausthiere nach, zumal das Geschrey der Krähe, das er so gut nachahmte, daß man sich irren konnte; er plauderte fast nie in einem Zimmer, worinn Leute waren, aber wenn er allein in einem daran stoßenden Zimmer war, so schwatzte und schrie er um so mehr, jemehr man Geräusch in dem andern machte; er schien sogar sich zu erhitzen, und alles nach einander, was er wußte, schnell zu wiederholen, und war nie belebter und lärmender; des Abends gieng er freywillig in seinen Käfig, den er bey Tage floh; alsdann zog er eine Pfote in die Federn, oder klammerte sie an die Dräthe seines Bauers, steckte den Kopf unter den Flügel, und schlief, bis der Morgen wieder anbrach; doch wachte er oft bey Lichtern, und alsdann stieg er auf den Boden herab, um seine Klauen zu wetzen, und machte eben die Bewegung, wie eine Henne, die scharret; zuweilen fieng er des

Nachts, wenn er Helle sah, an zu pfeifen oder zu schwatzen, im Dunkeln aber war er ruhig und stumm s). Die Art der Gesellschaft, die sich vermittelst der Sprache zwischen den Papageyen und uns schließt, ist enger und angenehmer als die, auf welche der Affe durch seine sonderbare Nachahmung unserer Bewegungen und Gebehrden Anspruch machen kann. Wenn die Gesellschaft des Hundes, des Pferdes oder des Elephanten sich durch Gefühl und Nutzen wichtiger machen, so ist die Gesellschaft des redenden Vogels, des Vergnügens wegen, anziehender; er ergötzt, er zerstreut, er unterhält; in der Einsamkeit giebt er Umgang; im Umgange spricht er mit, er antwortet, er ruft, bewillkommt, wirft ein Gelächter aus, spricht mit einem zärtlichen Ton, und giebt sich das Ansehen des ernsten Menschen, der Denksprüche redet; seine Worte, die ihm von ungefähr entfallen, belustigen manchmal, weil sie gar nicht passen, und überraschen zuweilen, weil sie so genau treffen t). Dieses Spiel mit

s) Fortsetzung der Anmerkung von Frau Radault.

V.

t) Willughby erwähnt nach Clusius eines Papageyes, der, wenn man ihm sagte: Lache, lache Papagey, wirklich lachte, und gleich darauf sehr laut rief: O über den großen Narren, der mich lachen macht! Wir haben einen anderen gesehen, welcher mit seinem Herrn alt geworden war, und mit ihm die Schwachheiten des hohen Alters theilte; da er gewohnt war, fast keine andere Wörter zu hören, als, ich bin krank, so pflegte er, wenn man ihn frug: Wie gehts dir Paperchen, wie gehts? sich auf

mit Worten ohne Gedanken, hat, ich weiß nicht, was wunderliches und groteskes, und ohne leerer zu seyn, als so manch anderes Gerede, ist es doch immer unterhaltender. Mit dieser Nachahmung unserer Worte scheinet der Papagey etwas von unsern Neigungen und Sitten anzunehmen; er liebt und hasset; er hat Anhänglichkeiten, Eifersucht, Launen und Lieblingsgegenstände; er bewundert sich, giebt sich Beyfall, macht sich Muth; er wird fröhlich und traurig; er scheint bey Liebkosungen in Bewegung zu gerathen und zärtlich zu werden; er küßt mit Inbrunst; er lernt in einem Trauerhause seufzen u); und wenn er gewohnt wird, den geliebten

auf dem Kamin ausstrecken und kläglich zu antworten: Ich bin krank.

V.

Ich habe einen von diesen grauen, rothschwänzigen Papageyen bey einem Husarenoffizier gekannt, welcher oft den Ruf Husar gehöret hatte, und ihn bisweilen so laut aus dem Fenster, worin er hieng, über den Markt hören ließ, wenn ein Husar darüber gieng, daß dieser bisweilen glaubte, er solle ins Haus kommen.

C.

u) Man sehe in den Annalen des Constantin Manasses, die Geschichte des jungen Prinzen Leo, Sohn des Kayscrs Basilius, der von seinem unbarmherzigen Vater zum Tode verurtheilt war, den alle Seufzer der Menschen, die um ihn waren, nicht rühren konnten, und welchem von den Tönen des Vogels, der das Schicksahl des jungen Prinzen zu beklagen gelernet hatte, endlich das Herz erweicht ward.

liebten Namen einer Person, die vermißt wird, zu wiederholen, so erinnert er empfindliche Seelen an ihr Vergnügen und an ihren Kummer x). Die Geschicklichkeit, Töne zu artikuliren, die bey dem Papagey aufs höchste gebracht ist, erfordert in dem Werkzeug einen besondern und vollkommnern Bau; die Richtigkeit seines Gedächtnisses, obgleich der Verstand fehlt, setzt doch einen Grad von Aufmerksamkeit und eine Stärke von mechanischer Erinnerungskraft voraus, die keinem andern Vogel in einem solchen Maas zu Theil geworden ist. Auch haben alle Naturforscher die besondere Bildung des Schnabels, der Zunge und des Kopfs beym Papagey wahrgenommen; sein Schnabel, der außerhalb gerundet, innerhalb hohl und concav ist, macht in gewisser Art die Hohlung eines Mundes aus, in welchem sich die Zunge frey bewegt; wenn der Ton gegen den zirkelförmigen Rand der untern Kinnlade anschlägt, so modificirt er sich daran, wie er an einer Reihe Zähne thun würde, indem er sich von der Höhle des Oberschnabels, wie von einem Gaumen zurückwendet; also platzt der Ton nicht aus, und entwischt auch nicht in ein Gepfeife, sondern wird zu einer voll und runden Stimme. Im übrigen bildet die Zunge die unbedeutenden Töne, welche nichts als ein Gesang oder Geschrey seyn würden, zu artikulirten Tönen. Diese Zunge ist

x) *Aldrovand.* p. 662. Ein schönes, rührendes Stück, da ein Dichter, der seine Gebieterinn beweint, sich an seinen Papagey wendet, welcher ohne Unterlaß den Namen wiederholet.

ist rund und dicke, und verhältnißmäßig dicker bey dem Papagey als bey dem Menschen; sie würde sich auch freyer bewegen, wenn sie nicht von einer härtern Substanz als das Fleisch, und mit einer starken, und gleichsam hornartigen Haut überzogen wäre.

Aber diese so künstlich bereitete Organisation weicht noch sehr der Kunst, die die Natur anwenden müßte, um den Oberschnabel des Papageyen beweglich zu machen, um seinen Bewegungen die Stärke und Leichtigkeit zu geben, ohne zu gleicher Zeit seinem Oefnen zu schaden, und ein Organ stark genug mit Muskeln zu versehen, an dem man nicht einmal wahrnimmt, wo sie die Sehneu fest machen konnte; es ist nicht an der Wurzel dieses Stücks, wo sie ohne Kraft gewesen wären, noch an seinen Seiten, wo sie die Oefnung gesperrt hätten, wo sie angebracht werden konnten; die Natur hat ein anders Mittel erwählt, sie hat im Grunde des Schnabels zwey Beine festgemacht, welche von den zwey Seiten, und unter den beyden Backen, so zu sagen, eine Verlängerung der Substanz machen, und der Gestalt nach den Beinen, welche man bey dem Menschen Prerigoides nennt, ähnlich sind, ausgenommen, daß sie an ihrem hintern Ende nicht in ein anderes Bein eingepflanzt, sondern in ihren Bewegungen frey sind; dichte Bündel von Muskeln, die von dem Hinterkopfe auslaufen, und an diese Beine fest gemacht sind, setzen sie, und mit ihnen den Schnabel in Bewegung. Man muß bey dem Aldrovand y) ausführlicher die Kunst

y) *Av.* Tom. I. p. 640 und 641.

und Anordnung aller dieser bewunderswürdigen Maschinen sehen. Dieser Naturforscher merkt einen Raum zwischen dem Auge und der untern Kinnlade an, den man hier mit größerem Recht, als bey irgend einem andern Vogel, wo er von der Spaltung des Schnabels eingenommen wird, einen Backen nennen kann. Dieser Raum stellt bey dem Papagey um so mehr einen wahren Backen vor, da Bündel von Muskeln durch ihn laufen, und dazu dienen, sowohl die Bewegung des Schnabels zu stärken, als die Artikulation zu erleichtern. Dieser Schnabel ist sehr stark; mit ihm zerbricht der Papagey sehr leicht die Steine der Baumfrüchte; er zernagt das Holz, er krümmt und dreht die Stangen seines Käfigs auseinander, wenn sie ein wenig schwach sind, und er müde ist eingesperrt zu bleiben; er bedient sich seiner mehr als der Pfoten, um sich aufzuhängen oder sich im Steigen fortzuhelfen; er stützt sich beym Herabsteigen wie auf einen dritten Fuß, welcher seinen schwerfälligen Gang sichert, und hält ihn vor, wenn er niederfliegt, um mit ihm den ersten Stoß von seinem Fall aufzufangen z), und er ist ihm beym klettern oder packen eben so nützlich als seine Zehe. Der Beweglichkeit des Oberschnabels hat er das Vermögen, seine Speisen zu kauen, welches den übrigen Vögeln fehlt, zu verdanken. Alle Körner- und fleischfressende Vögel haben an ihrem Schnabel so zu sagen nichts als

z) Cum devolat rostro se excipit, illi innititur, levioremque se ita pedum iufirmitati facit. *Plin.* Lib. X. Cap. 42.

als eine Hand, mit welcher sie ihre Nahrung nehmen und in den Schlund werfen, oder ein Werkzeug, mit welchem sie dieselbe zerbrechen und zerreißen. Der Schnabel des Papageyen ist ein Maul, worin er seine Nahrung mit den Fingern schiebt. Er hält den Bissen an die Seite, und nagt nach seiner Bequemlichkeit a); die untere Kinnlade hat wenig Bewegung, und die merklichste ist von der rechten zur linken; oft macht sie der Vogel, ohne etwas zu fressen zu haben, und scheint leer zu kauen, welches auf die Einbildung gebracht hat, als ob er wiederkäuete; es ist wahrscheinlicher, daß er

a) Man muß bemerken, daß der äußerste Hinterzehe beweglich ist, und daß der Vogel ihn zur Seite und nach vorn legt, um dasjenige damit zu fassen und zu behandeln, was man ihm giebt; aber nur in diesem Falle macht er davon Gebrauch, und die übrige Zeit, wenn er geht oder aufsitzt, trägt er beständig zwey Zehe nach vorn, und zwey nach hinten. Apulejus und Solinus erwähnen Papageyen mit fünf Zehen; aber sie beziehen sich auf eine Stelle des Plinius, wo dieser Naturkundiger einer Race von Elstern diese besonders beylegt. *Plin.* Lib. X. Cap. 42.

v.

Discere alias negunt posse, quam quae ex genere earum (picarum) sunt, quae glande vescuntur: et inter eas facilius, quibus quini sunt digiti in pedibus, ac ne eas quidem ipsas primis duobus vitae annis. *Plin. l. c.* Hier ist doch wohl die Rede von Pica glandaria, dem Heher, welcher Eicheln frißt und auch sprechen lernet, aber freylich gewöhnlich vier Zehe hat.

alsdann die Schneide dieser Schnabelhälfte wetzet, welche ihm zum schneiden und nagen dient. Der Papagey hat beynahe gleichen Appetit nach allen Arten von Nahrung; in seinem Vaterlande lebt er fast von allen Arten von Früchten und Körnern; man hat bemerkt, daß der guineische Pagagey von dem Saamen des Saflors, welcher für den Menschen ein heftiges Purgirmittel ist, fett wird b); Im Hausthierstande frißt er fast von allen unsern Speisen, aber das Fleisch, welches er vorziehen würde, ist ihm äußerst schädlich; es veranlaßt ihm eine Krankheit, die eine Art von Pica, oder widernatürlichen Appetit ist, welche ihn nöthigt, seine Federn zu saugen, zu zernagen, und einen Kiel nach dem andern auszureißen, wo sein Schnabel hinreichen kann. Dieser aschenfarbne Papagey aus Guinea ist besonders dieser Krankheit unterworfen; auf diese Weise zerreißt er die Federn seines Körpers, und sogar seine schöne Schwanzfedern, die, wenn sie eimal ausgefallen sind, nie mit dem lebhaften Roth, welches sie zuvor hatten, wieder wachsen.

Zuweilen werden diese Papageyen nach einer Musterung weiß und rosenfarb gesprengt, welche Veränderung ihre Ursach vielleicht in einer Krankheit, oder in dem zunehmenden Alter hat. Diese durch Zufall veränderte Papageyen zeigt Brisson unter den Namen des guineischen Papageyen mit

b) Die Spanier nennen die Saamen dieses Carthamus auch Papageysaamen.

mit rothen Flügeln c), und des guineischen rothgeschäckten Papageyen d) als Spielarten an. Bey dem, den Edwards T. IV. pl. 163.*) vorstellt, sind die rothen Federn mit den grauen aufs ungefehr vermischt, als wenn der Vogel bunt gemacht wäre. Der graue Papagey ist, wie mehrere andere Gattungen dieses Geschlechts, der fallenden Sucht, und dem Podagra ausgesetzt e), doch ist er sehr stark, und lebt sehr lange f); Salerne versichert, er habe in Orleans einen gesehen, wel-

c) *Ornithologie.* Tom. IV. pag. 312. (Ed. in 8. Tom. II. P. 127. A.)

d) *Ibidem.* pag. 313. (Ed. in 8. II. P. 127. n. 49. B.)

*) Der aschfarbne und rothe Papagey. Plirtacus cinereus rubro maculatus. Seligmann Vögel VI. tab. 58. Ö.

Scopoli beschreibt noch einen Papagey, von dem er vermuthet, daß er vielleicht eine im Bauer entstandene Abartung des grauen Papageys sey. Er war roth und weiß, hatte nackende Backen und einen scharlachrothen Schwanz. Der Kopf war aschgrau; auf der Brust hatte er zwey graubraune Federn, und die vordersten Schwungfedern waren braungrau. *Scopoli Ann.* I. p. 32. Der rothe Papagey mit aschfarbenem Kopfe. Plittacus ruber. Scopoli durch Günther. S. 26. n. 31. Ö.

e) *Olina, Uccelleria.* pag. 23.

f) Der Herr de la Borde kannte am Vorgebürge von Domingo einen, welcher gewiß sechs und vierzig Jahr alt war. V.

welcher bey einem Alter von 60 Jahren noch lebhaft und munter war g).

Es ist etwas seltenes in unsern gemäßigten Himmelsstrichen, Papageyen zeugen zu sehen; aber das ist nicht so selten, daß man sie Windeyer legen sieht: indessen hat man doch einige Beyspiele, daß Papageyen in Frankreich geheckt worden sind. Herr de la Pigeoniere in der Stadt Marmande in Agenois hat einen Papagey von männlichen Geschlecht, und ein Weibchen, welche seit 5 oder 6 Jahren niemals ermangelt haben, jeden Frühling eine Brut zu machen, aus der Junge gekommen sind, die Vater und Mutter erzogen haben. Jede Brut bestand aus 4 Eyern, worunter immer 3 gute und ein lauteres waren. Die Art, sie nach ihrer Bequemlichkeit brüten zu machen, war, daß man sie in ein Zimmer that, worin nichts anders war als eine kleine Tonne, welcher der eine Boden ausgenommen war; innen und außen an der Tonne waren Stäbe angebracht, daß das Männchen nach Belieben auf alle Art aus- und hineinsteigen, und bey seinem Weibchen seyn konnte. Eine nöthige Vorsicht war, daß man nicht anders als mit Stiefeln in diese Kammer gieng, um die Beine für den Schna-

g) Vosmaer sagt: er kenne einen Papageyen in einer Familie, welcher seit hundert Jahren von dem Vater auf den Sohn geerbt sey. *Feuille imprimé* 1769. Aber Olina, welcher glaubwürdiger und mehr unterrichtet war, legt dem Papagey nur zwanzig Jahre als das gewöhnliche Alter bey. *Uccelleria* a. a. O.

Schnabelhieben des eifersüchtigen Männchen zu sichern, welches auf alles zuhackte, was es seinem Weibchen nahe kommen sah h). Der P. Labat erzählt auch von 2 Papageyen, welche verschiedenemal in Paris Junge ausbrachten i).

h) *Lettre datée de Marmande en Agénois, le 25 Août 1774, dans la Gazette de litterature, du Samedi 17 Septembre suivant.*

v.

i) *Nouveaux voyages aux îles de l'Amerique.* Paris, 1722, tome II, page 160.

v.

2. Der

2. Der grüne Papagey. k) 1)

Pl. enl. 514.

Edwards hat diesen Vogel 1) als einen, der aus China kommt, angegeben; indessen findet man ihn in dem größten Theil der Provinzen dieses ungе-

k) Psittacus major brevicaudus, viridis, lateralibus et rectricibus alarum inferioribus rubris; marginibus alarum caeruleis; rectricibus superne viridibus, subtus nigricantibus, apice subtus fusco flavicante. . . . Psittacus Sinensis *Briss. Ornithol.* Tom. IV. p. 291. (Ed. in 8. Tom. II. p. 120. n. 39.)

V.

1) Perroquet de la Chine. *Buff.* pl. enl. 514.

Perroquet vert. *Buff hist. nat. des Oiseaux.* VI. p. 116. Ed. in 12. XI. p. 161.

Grand perroquet vert de la nouvelle Guinée. *Sonnerat. Voy.* p. 174. tab 108.

Green and red Parrot from China. *Latham Synopf.* l. 1. p. 278. n. 85.

Psittacus (sinensis) viridis alarum tectricibus inferioribus rubris, majoribus nonnullis et margine

Der grüne Papagey.

S. 78.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 314.

geheuren Reichs nicht; man trifft ihn nur in den mitternächtlichsten an, als in Quanton und Quangsi, die sich dem Wendekreis nähern, der gewöhnlich an dem Klima der Papageyen gränzt. Dieses ist wahrscheinlich einer von denen, von welchen sich Reisende eingebildet haben, daß man sie in China und Amerika antreffe m); allein diese Einbildung ist der natürlichen Ordnung der Natur entgegen, und ist durch die Vergleichung jeder Gattung insbesondere wiederlegt worden: diese Gattung besonders ist keiner von den Papageyen der neuen Welt ähnlich. Dieser grüne Papagey ist von der Größe einer mittelmäßigen Henne. Der ganze Leib ist lebhaft glänzend grün; die großen Schwung- und Schulterfedern sind blau; die Seiten und das oberste unter den Flügeln ist schimmernd roth; die Schwung- und Ruderfedern sind unten braun. Der Vogel ist funfzehn Zoll lang. Edwards nennt ihn einen der seltesten: man findet ihn auf den

gine caeruleis, cauda subtus fusca. *Linné Syst. Nat.* XIII. 1. p. 337. n. 109.

O.

l) Green and red Parrot from China. *Edw. Glean.* tab. 231.

m) Die mittäglichen Provinzen, als Kanton und vorzüglich Quangsi enthalten alle Arten von Papageyen, welche in keinem Stücke von denen in Amerika verschieden sind; ihr Gefieder ist eben so, und sie besitzen nicht weniger die Geschicklichkeit sprechen zu lernen. *Hist. gener. des Voyages.* Tom. VI. p. 488.

V.

den molukkischen Inseln und in Neuguinea, von da er uns geschickt ist 2).

2) Edwards und Brissons Beschreibung weichen etwas von der obigen ab, und ich will deßfalls die letzte anführen. Er sagt: Er ist so dick als eine Henne, seine Länge beträgt funfzehn Zoll; der Schnabel ist $15\frac{1}{2}$ Linie dick, und funfzehn Linien lang; der Schwanz fünf und einen halben Zoll lang. — Die Flügelausbreitung beträgt drittehalb Fuß; die Spitzen der anliegenden Flügel reichen ohngefähr bis auf zwey Drittel des Schwanzes. Die Kopffedern gehen bis zur Schnabelwurzel und bis an die Augen, aber den Schnabel und die Augen umgiebt keine nackete Haut, wie bey den übrigen meisten Arten geschieht. Die Regenbogenhaut der Augen ist grünlich pomeranzenfarbig. Der Oberkiefer ist am Anfange roth, nach der Spitze zu fällt er ins Gelbe, und der Unterkiefer ist schwarz. Die Füße und Nägel sind ebenfalls schwarz. Er wohnt in China und Amboina. Briss. a. a. O.

---

1) Green and red Parrot from China. Edw. Glean. tab. 231.

m) Die mittlern Federkiele, als Kanten und deutlich Durchsichtig, alle Arten von Papageyen. welche in kleinen Gesellschaften von sieben bis acht Stücken fliegen, und sich auf den Gipfeln der Bäume aufhalten. Linn. Syst. Nat. Tom. VI. p. 482.

3. Der

Der bunte Papagey.

S. 87.

Krüger jun. del.

Büff. Vögel XIX. Th. Edw. T. 163.

3. Der bunte Papagey. n)

b) *Edw.* t. 165. (nach Seligm. *VI. tab.* 60.)

Dieser Papagey ist eben der, den Clusius o) Psittacus elegans, und Edwards den Papagey mit dem Falkenkopf nennt p). Er ist von der

n) Psittacus major brevicaudus, superne viridis, inferne pennis purpureis caeruleo marginatis vestitus; capite fusco, pennis in medio dilutioribus; collo pectori concolore, rectricibus subtus nigrocaerulescentibus superne viridibus, lateralibus apice saturate caeruleis . . . Psittacus varius. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 300. (Ed. in 8. tom. II. p. 123. n. 43.) — Psittacus brachyurus viridis, capite griseo, collo pectoreque subolivaceo vario; remigibus, rectricibusque caeruleis. . . . Psittacus accipitrinus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Spec. 32. (Ed. XIII. 1. p. 345. n. 38.)

v.

o) *Clusius*; exotic. auctuar. page 365. — *Nieremberg*, page 226 mit *Clusius* Abbild. — *Ray Synopf. avi.* page 31. n. 11.

v.

p) Hawk-headed parrot. *Edwards, Hist. of Birds.* tome IV. pl. 165.

v.

Der

der Größe einer Taube; die Federn um den Hals, die er im Zorn sträubt, die aber in der Figur des Clusius übertrieben sind, sind purpurfarben und blau eingefaßt; der Kopf ist mit Federn, die mit braunen und weißen Streifen vermischt sind, bedeckt, wie das Gefieder eines Raubvogels, und daher kommts, daß ihn Edwards den Papagey mit dem Falkenkopf genennt hat. Er hat Blaues an den großen Schwungfedern und an der Spitze der Seitenfedern des Schwanzes, dessen zwey mittlere mit dem Mantel des Vogels einerley grün sind. Der auf unsern illuminirten Kupferplatten Nr. 526 [1]) vorgestellte Papagey scheint mir mit dem bunten Papagey einerley Vogel zu seyn, von welchem wir die Beschreibung gegeben haben, und ich vermuthe, daß die sehr kleine Anzahl dieser Vögel, die aus Amerika nach Frankreich gekommen, zuvor aus dem großen Indien nach Amerika gebracht worden ist, und daß, wenn man welche in dem Innern der Länder von Guyana findet, es daher kommt, daß sie daselbst einheimisch geworden sind, wie die Canarienvögel, das indianische Schwein, und

Der Papagey mit dem Geyerkopf. Psittacus orientalis capite accipitrino. Seligm. Vögel VI. tab. 60. (nach Edw.) *Lath. Synopf.* I. 1. p. 266. n. 74.

1) Papagai maille. *Buffon Oif.* 6. p. 239. tab. 12. Ed. in 12. XI. p. 164. Pl. enl. 526.

Psittacus (accipitrinus) capitis pennis albis longis anguſtis nigro ſtriatis. *Linné Syſt. Nat.* XII. I. p. 345. n. 38. β.

U.

und einige andere Vögel und Thiere, die aus den mittäglichen ländern der alten Welt durch Schiffer in die neue gebracht worden sind; und was zu beweisen scheint, daß diese Gattung Amerika nicht natürlich sey, ist: daß keiner von denen, die diesen Welttheil bereist, und ihre Reise beschrieben haben, ihrer erwähnt, ob er gleich unsern Vogelhändlern unter dem Namen Perroquet maille bekannt ist, welches Beywort die Mannigfaltigkeit seines Gefieders anzeigt; überdem ist seine Stimme von allen amerikanischen Papageyen ihrer sehr unterschieden; sein Geschrey ist hoch und durchdringend, alles scheint zu beweisen, daß diese Gattung, davon einige Stücke aus Amerika gekommen sind, diesem Welttheil nicht eigen sind, und erst aus Indien dahin gebracht worden.

4. Der Vaza oder der schwarze Papagey. q) 1)

Buff. Planch. enl. 500.

Die vierte Art der eigentlich genannten Papageyen ist der Vaza, ein Name den dieser Vogel nach Flaccourt auf Madagaskar hat r), welcher hinzu-

q) Psittacus major brevicaudus, nigro-caerulescens, oculorum ambitu candicante, remigibus cinereo fuscis, exterius ad viride vergentibus; rectricibus superne nigro-caerulescentibus, subtus penitus nigris. . . . Psittacus Madagascarienſis niger. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 317. Psittacus ex nigro caeruleus roſtro breviſſimo. *Klein, Avi.* p. 25. n. 23. — *Edwards.* tom. I. pl. 5. — Psittacus brachyurus niger. *Linn. Syſt. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 17.

V.

1) *Briſſon Ornith.* ed. in 8. tom. II. p. 129. n. 53.

Der schwärzlich himmelblaue Papagey mit dem kürzesten Schnabel. Klein Vorb. S. 48. n. 23.

Schwarzer Papagey. Klein Hist. p. 26. n. 27. Halle 2. 117. n. 35.

Schwarzer Papagey von Madagaskar. Seligmann Vögel. I. tab. 9. (nach Edw.)

Le

Der Vaza od. der Schwartze Papagey.

S. 84.

Büff Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 300.

hinzusetzt, er ahme die Stimme des Menschen nach, Rennefort hat seiner auch erwähnet s); und es ist eben der, den France Cauche Vouresmeints nennt t), welches einen schwarzen Vogel bedeutet, indem der Name Vourou in der madagaskarischen Sprache einen Vogel bedeutet. Aldrovande setzt auch schwarze Papageyen nach Aethiopien u). Der Vaza ist von der Größe des aschfarbenen guineischen Papageyen: sein ganzes Gefieder ist durchaus schwarz; allein nicht völlig und tief schwarz, sondern braun, und hat gleichsam eine violette

Le Vaza ou Perroquet noir. *Buffon Oiſ.* p. 119. tab. 4. Ed. in 12 Tom. XI. p. 166. n. 4. tab. 4.

Parroquet noir de Madagaſcar. *Buff. Pl. enl.* n. 500.

Black Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 264. n. 71. Pſittacus (niger) cauda elongata aequali, corpore caeruleſcente nigro, roſtro orbitisque albidis. *Linn. Syſt. Nat.* XIII. I. p. 336. n. 29.

r) Vaza ist der Papagey, welcher schwarz in diesem Lande ist. Es giebt Junge darunter, welche rothbraun sind, aber es hält schwer, sie zu bekommen. *Voyage à Madagaſcar, par Flaccourt.* Paris 1661.

s) Auf Madagaskar sind die großen Papageyen schwarz. *Relation de Rennefort. Hiſtoire générale des Voyages*, tome VIII, page 606.

t) *Voyage à Madagaſcar, par Fr. Cauche.* Paris 1651.

u) *Ornithol.* tome I, page 636.

Tinte x). Die Kleinheit seines Schnabels ist merkwürdig; hingegen ist sein Schwanz ziemlich lang. Edwards, der ihn lebendig gesehen hat, sagt: es sey ein sehr vertraulicher und liebenswürdiger Vogel.

x) Brisson nennt diese Tinte bläulich.

V.

Brisson fügt der obigen kurzen Beschreibung noch folgendes bey: Er ist so groß als der graubraune Papagey 13½ Zoll lang; sein Schnabel 11½ Linien dick, und 10 Linien lang; der Schwanz 5½ Zoll lang. — Die Federn der ausgebreiteten Flügel stehen 2⅙ Fuß und sechs Linien auseinander, und angelegt erreichen sie nicht zwey Drittel des Schwanzes. In dem von Edwards beschriebenen Vogel waren in iedem Flügel drey bis vier Schwungfedern weiß. Die Augen umgiebt eine nackte, weißliche Haut; die Sehe ist schwarz, und der Regenbogen graubraun im Auge. Die Schnabelwurzel wird von ähnlicher, nackter, weißröthlicher Haut umgeben, worin die Nasenlöcher liegen. Der Schnabel fällt auch ein wenig von dem Weißen in das Fleischfarbene. Die Füße sind dunkel fleischfarbig, die Nägel aber schwarz. Briss. a. a. O.

O.

5. Der

Der Maskarin.

S. 87.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 35.

5. Der Maskarin. y) 1)

Pl. enl. 35.

Dieser Papagey hat seinen Namen daher, weil er um den Schnabel eine Art von schwarzer Maske hat, die die Stirne, die Kehle und sein

y) Psittacus major brevicaudus saturate cinereus; capite et collo superioribus dilute cinereis, taenia circa bazim rostri nigra, oculorum ambitu nudo coccineo; rectricibus saturate cinereis, lateralibus in exortu candidis. Psittacus mascarinus. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 325. (Ed. in 8. tom. II. p. 128. n. 52.) — Psittacus macrourus niger genis nudis, vertice cinereo nigricante vario, cauda cinerea. Psittacus obscurus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 3. (Ed. XIII. 1. p. 314. n. 4.)

1) Mascarin. *Buff. Oiseaux.* VI. p. 120. tab. 5. Ed. in 12. tom. XI. p. 168. pl. 5. Pl. enl. 35.

Mascarine Parrot. *Lath. Synops.* I. 1. p. 265. n. 72.

Psittacus (Mascarinus) cinereus capistro subtus nigro, orbitis nudis rubicundis, rectricibus lateralibus basi albicantibus. *Linné Mantiss.* 1771. p. 524. *Syst. Nat.* XIII. 1. p. 333. n. 49.

Gesicht bedeckt. Sein Schnabel ist roth; eine graue Mütze bedeckt den Hintertheil des Kopfs und Halses. Der ganze Körper ist braun; die Schwanzfedern, an denen zwey Drittheile von ihrer Länge braun sind, sind an ihrem Anfange weiß. Die ganze Länge dieses Papageyen beträgt dreyzehn Zoll. Querhoent versichert, man finde ihn auf der Insel Bourbon, wohin er vermuthlich von Madagaskar gebracht worden ist. In dem Kabinet des Königs ist ein Vogel von eben dieser Größe und Farbe, außer daß er keine schwarze Maske hat, kein Weißes am Schwanze, und daß der ganze Körper gleich braun ist; sein Schnabel ist auch kleiner, und vermittelst dieses Abzeichens nähert er sich dem Vaza, von welchem er eine Spielart zu seyn scheint, wenn er nicht eine Mittelgattung zwischen diesem und dem Maskarin ausmacht. Zu dieser Gattung oder Spielart rechne ich Brissons braunen Papagey z)

Der Maskarin. Müller Natursyst. Suppl. p. 76. n. 49.

O.

z) Psittacus major brevicaudus, in toto corpore cinereo fuscus. . . . Psittacus fuscus. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 314. (Ed. in 8. tom. II. p. 128. n. 51.)

V.

Psittacus (fuscus) totus ex cinereo fuscus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 333. n. 99.
Brown Parrot. *Lath. Synops.* I. 1. p. 266. n. 73.

O.

An-

Anhang.

Der Verfasser nimmt hier drey Vögel zusammen, welche nach den Systemen von Brisson und Linné getrennt sind. Die Beschreibungen sollen hier deßfals zur Vergleichung stehen. Der Verfasser rechnet Linnes braunen Papagey zu seinem Maskarin; Linné hatte auch Brissons Maskarin für einerley mit jenem gehalten, zählt aber nachher doch Brissons Maskarin als eine besondere Art nach der Abbildung an, und citirt dabey nun auch den vorher bey dem braunen Papagey angeführten Maskarin des Brisson.

Linnés brauner Papagey (Psitt. obscurus) ist ihm aus der Hasselquistischen Beschreibung bekannt geworden. Darnach ist der Kopf länglich, an den Seiten zusammengedrückt, oben niedergedrückt, und nach Verhältniß des Leibes ziemlich groß. Der Schnabel ganz breit, dick, stumpf, gebogen, dreymal kleiner als der Kopf. Der Oberkiefer etwas gewölbt, unten breiter, nach dem Rücken zu schmäler und beweglich. An der Wurzel des Oberkiefers ist innerhalb den Nasenlöchern eine Furche, als wenn der Kiefer geschuppt wäre, von da eine länglichte Furche bis zur Spitze fortläuft. Die Spitze des Oberkiefers ist über halb des unte-

ren gebogen, bis auf ein Viertel Grad, am Ende etwas stumpf. An beyden Seiten an der Wurzel der Spitze liegt ein Lappen wenn der Schnabel geschlossen wird auf den Unterkiefer. Dieser ist dicker als der obere, mehr gewölbt, kürzer; die Spitze ist stumpf, und beynahe ausgekantet. An der Wurzel der Spitze ist eine halbzirkelrunde Vertiefung. Die Nasenlöcher liegen nahe über den Schnabel, sind völlig zirkelrund, und so groß als eine Hühnerfeder.

Die Augen liegen näher an dem Scheitel als der Kehle, und näher an den Nasenlöchern als an dem Anfange des Kopfs; die Regenbogenhaut ist gelb, die Sehe darin schwarz. Die Stelle um den Augen ist von dem Ende des Oberkiefers, bis zum Anfange des Schnabels der Breite nach, und von den Nasenlöchern an, fast bis zum Anfange des Scheitels der länge nach nackt, runzlich, und mit kaum sichtbaren Haaren besetzt.

Die Ohrenöffnung ist länglich, schreg, eben so weit von den Augen als diese von den Nasenlöchern, viel näher an dem Anfange des Kopfs als an dem Scheitel, mit feinen Federchen und beweglicher Haut bedeckt.

Von den etwa zwanzig Schwungfedern sind die beyden ersten länger als die übrigen, die dritte, vierte und fünfte kürzer und gleich lang; die sechste, siebente und achte werden allgemach kürzer; die übrigen sind gleich lang untereinander und kürzer.

Der Schwanz ist keilförmig, und von ohngefähr zehn Ruderfedern sind die äußeren kürzer, die inne-

inneren länger. An den Füßen sind die Schenkel befiedert bis zur Ferſenbiegung.

Von den vier Zehen stehen zwey nach vorn und zwey nach hinten; von den vordern ist der innere ein Drittel kürzer als der äußere, und von den hintersten ist der innere um die Hälfte kürzer als der äußere. Alle Zehe haben Schuppen, die wie Dachziegel über einander auf den beyden untersten Gliedern liegen; der übrige Theil des Fußes ist höckerig, mit glatten, runden, wenig erhabenen Höckern.

Die Zunge ist dick, an der Spitze sehr stumpf, und beynahe halb zirkelförmig, an den Seiten geründelt mit in die Höhe gebogenen Rändern, daher die Zunge rinnenförmig wird. Die Nägel sind gebogen und stumpf. (Vorhergehendes paßt mehrentheils auf alle Papageyenarten).

Der Schnabel ist schwarz; die Stelle um den Augen weiß, der Scheitel ist aschgrau und schwärzlich bunt. Der Hals und oben die Flügel sind schwarz; der Bauch und die Schenkel aschgrau mit weißgrauen Queerstreifen; die Höcker an den Füßen, und die Nägel schwarz. Der ganze Schwanz ist aschgrau. Der Vogel ist so groß als eine Dohle. Hasselquist Reise nach Palästina. S. 293. n. 18.

Brissons baumgraue Papagey war über den ganzen Leib aschgraubraun, nicht völlig so dick als der guineische aschgraue Papagey; dreyzehn und einen halben Zoll lang; der Schnabel eilf Linien dick, und zehn Linien lang; der Schwanz fünf und

einen

einen halben Zoll lang; die Flügelausbreitung betrug 2½ Fuß und 6 Linien. Die Spitzen der anliegenden Flügel erreichen nicht zwey Drittel des Schwanzes. Um den Augen war eine nackte graubraune Haut. Die Regenbogenhaut um den Augen war grau. Die Wurzel des Oberkiefers umgeb ebenfalls eine nackte graubraune Haut, darin die Nasenlöcher lagen. Der Schnabel, die Füße und Nägel waren graubraun. Psittacus fulcus. Briſſon a. a. O.

O.

6. Der

Der Papagey mit dem Blutfarbigen Schnabel.

S. 93.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 715.

6. Der Papagey mit dem blutfärbigen Schnabel. [1])

Pl. enl. 713.

Diesen Papagey findet man in Neu-Guinea; er ist merkwürdig wegen seiner Größe; noch mehr ist ers wegen seines blutfarbenen Schnabels, der verhältnißmäßig dicker und breiter ist, als der Schnabel aller andern Papageyen, sogar der amerikanischen Aras. Sein Kopf und Hals sind glänzend grün, mit vergoldetem Wiederscheine, die Vorderseite des Körpers ist gelb, mit grünen Schatten; der Schwanz ist oberhalb grün, unterhalb gelb; der Rücken ist aquamarinblau; der Flügel scheint mit einer Mischung von Himmelblau und Grün be-

1) Le Perroquet a bec couleur de Sang. *Buff. Oif.* VI. p. 122. (Ed in 12. tom. XI. p. 169. n. 6.) Perroquet de la nouvelle Guinee. *Buff. Pl. enl.* 713. Great billed Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 338. n. 110.

Pſittacus (macrorynchos) viridis ſubtus in flavum vergens, alis ex cyaneo et viridi miſtis, tectricibus nigris. *Linn. Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 338. n. 110.

bemahlt zu seyn, je nachdem man ihn aus einem verschiedenen Gesichtspunkt betrachtet; die Deckfedern sind schwarz, und haben vergoldet gelbe Einfassungen und Verzierungen. Dieser Papagey ist vierzehn Zoll lang.

---

7. Der

Der grosse grüne Papagey mit dem blauen Kopfe.

S. 95.

7. Der große grüne Papagey mit dem blauen Kopfe. 1)

Pl. enl. 862.

Dieser Papagey, welchen man in Amboina findet, ist einer der größesten; er ist bey sechszehn Zoll lang, obgleich sein Schwanz ziemlich kurz ist. Die Stirn, und der obere Theil des Kopfs ist blau; der ganze Mantel ist grasgrün, welches auf den großen Schwungfedern mit blau gesättigt und vermengt ist; die ganze Unterseite des Körpers ist olivengrün; der Schwanz ist oberhalb grün, unterhalb verwaschen gelb.

1) Grand Perroquet vert a tête bleue. *Buff. Oif.* VI. p. 122. (Ed. in 12. tom. XI p. 170. n 7.) Perroquet de Amboine. *Buff. Pl. enl.* 862. Amboina Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 279. n. 87.

Pſittacus (viridis) ſubtus olivaceus, fronte et vertice cæruleis cauda ſubtus flava. *Linn. Syſt. Nat,* XIII. 1. p. 338. n. 111.

8. Der

8. Der Papagey mit dem grauen Kopfe. a)

Briff. Pl. enl. 288.

Auf den illuminirten Platten heißt dieser Vogel petite Perruche du Sénégal; allein es ist kein eigentlich sogenannter Sittich, weil er keinen langen,

a) Psittacus minor brevicaudus, superne viridis, inferne aurantius ad latera luteus; capite et gutture cinereis; collo viridi, rectricibus superne saturate cinereis, ad viride vergentibus viridi marginatis. . . . Psittacula Senegalensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 400. n. 92. tab. 24. f. 2.

Perroquet a tête grise. *Buffon Ois.* VI. p. 123. in 12. XI. p. 171, n. 7. *Pl. enl.* 288.

La petite Perruche du Senegal. *Briss. orn.* ed. in 8. tom. II. p. 153. n. 92.

Senegal Parrot. *Latham Synops.* I. 1. p. 307. n. 114.

Psittacus (senegalus) viridis subtus luteus, capite cinereo, orbitis nigris nudis. *Linn. Syst. Nat.* XII. 1. p. 149. n. 43. XIII. 1. p. 347. n. 43.

Der senegalische Papagey. Müller Natursyst. 2. S. 149.

Der Papagey mit dem grauen Kopfe.

gen, sondern im Gegentheil einen sehr kurzen Schwanz hat; eben so wenig ist es ein guineischer Sperling oder kleiner Sittich mit kurzem Schwanze, indem er zwey oder dreymal größer ist als dieser Vogel: er muß also unter die Papageyen gesetzt werden, von denen er in der That eine Gattung ausmacht, ob er gleich nur sieben und einen halben Zoll lang ist; allein sein Körper ist ziemlich dick und untersetzt.

Sein Kopf und Gesicht sind schimmernd grau in das Bläuliche fallend; der Bauch und ganze Untertheil des Leibes ist dunkelgelb, wie die Ringelblumen, bisweilen mit morgenrother Farbe gemischt; die Brust und der ganze Mantel sind grün, ausgenommen die Schwungfedern, welche allein mit dieser Farbe eingefaßt sind, übrigens aber einen graubraunen Grund haben.

Diese Papageyen sind in Senegal sehr gemein; sie fliegen daselbst in kleinen Schaaren von fünf bis sechsen. Sie setzen sich auf den Gipfeln sparsamer Bäume in den sandigen, heißen Ebenen dieses Landes, und lassen daselbst ihr durchdringendes, unangenehmes Geschrey hören. Sie schließen sich dicht an einander, so daß man mehrere auf einmal schießen kann; es begiebt sich auch ziemlich oft, daß man die ganze kleine Familie mit einem Schusse erlegt.

Lemaire b) versichert, daß sie nicht sprechen, allein diese wenig bekannte Art hat vielleicht

b) Die Papageyen sind daselbst (in Senegal) von zweyerley Art; die eine ist klein und ganz grün, die andern

Bayerische Staatsbibliothek München

leicht noch keine Sorgfalt noch Erziehung bekommen.

andere gröſſer, und hat einen grauen Kopf, gelben Bauch, grüne Flügel, und einen grau und gelb gemischten Rücken; diese sprechen niemals; aber die kleinen haben eine sanfte und helle Stimme, und sprechen alles, was man sie lehrt. *Voyage de Lamaire.* Paris 1695. p. 107.

V.

Die

Die Lorys.

Man hat in Ostindien einer Familie von Papagayen diesen Namen gegeben, deren Geschrey das Wort lori ziemlich gut ausdrückt. Sie unterscheiden sich von den andern Vögeln dieses Geschlechts nicht mehr als durch ihre Gefieder, dessen herrschende Farbe ein mehr oder minder dunkles Roth ist. Außer diesem Hauptunterschied kann man noch anmerken, daß die Loris überhaupt einen kleinern, weniger gebogenen und spitzigern Schnabel haben, als die übrigen Papageyen. Ihr Blick ist lebhaft, ihre Stimme durchdringend, und ihre Bewegungen hurtig; sie sind, sagt Edwards, die behendesten unter allen Papageyen, und sie allein hüpfen auf ihr Stängchen wohl einen Fuß hoch. Diese genugsam bestätigten Eigenschaften widerlegen die stillschweigende Traurigkeit, die ihnen ein Reisender andichtet *). Sie lernen sehr leicht pfeifen und Worte aussprechen; man macht sie auch sehr leicht zahm, und was sehr selten bey den Thieren ist, so behalten sie auch ihre Munterkeit in der Gefangenschaft; aber sie sind überhaupt sehr zärtlich, schwer überzubringen, und in unsern gemäßig-

*) Histoire générale des Voyages, tome X. pag. 459.

ten Klimaten zu ernähren, wo sie nicht lange leben können. Selbst in ihrem Vaterlande sind sie epileptischen Anfällen, wie die Aras und andere Papageyen, ausgesetzt; doch ist es wahrscheinlich, daß einige und andere diese Krankheit bloß in der Gefangenschaft bekommen. „Es ist uneigentlich geredet, sagt Sonnerat *), wenn Ornithologen die Loris unter dem Namen der Philippinischen, Ostindischen, Chinesischen u. s. w. bezeichnet haben. Die Vögel von dieser Gattung sind nirgends als auf den molukkischen Inseln, und in Neu-Guinea anzutreffen; die, welche man anderswo findet, sind alle dahin gebracht worden. Allein es ist noch uneigentlicher, oder, besser zu sagen, sehr falsch, wenn eben diese Namensammler der Vögel, einige Gattungen von Loris als ursprüngliche Amerikaner angegeben haben, weil nicht eine einzige in Amerika ist, und wenn ja einige Reisende welche daselbst gesehen haben, so können es bloß einzelne Vögel seyn, welche aus östlichen Inseln von Asien dahin gebracht worden sind.

Sonnerat sagt, er habe beständig unterschiedene Gattungen von Loris von einer Insel zur andern gefunden, ob sie gleich nicht weit von einander liegen; man hat eine gänzlich ähnliche Beobachtung auf unsern Inseln in Amerika gemacht; jede dieser Inseln ernährt gemeiniglich Gattungen von Papageyen, die von einander unterschieden sind.

*) Voyage a la nouvelle Guinée, pag. 173.

Der

Der Lori Noira.

I. Der Lori-Noira. c) 1)

Pl. enl. 216.

Dieser Lori ist auf den illuminirten Kupferplatten unter dem Namen des moluckischen Lori vorgestellt; allein diese Benennung ist zu unbe-

 stimmt,

c) Noyra. *Clusius*, exotic. p. 364. — *Nieremberg*, p. 229. — *Jonston*, *Avi.* p. 155. — Idem p. 157. — *Lorry*, *Ray Synopf.* p. 151. n. 9. — Psittacus purpureus. *Charleton*, *Exercit.* p. 75. n. 16. — Idem *Onomat.* p. 67. n. 16. — Psittacus coccineus alis ex viridi et nigro variis. *Willughby*, *Ornithol.* p. 78. — *Ray Synopf.* p. 31. n. 9. — Psittacus rufus, femoribus alisque viridibus. *Frisch.* tab. 45. — *Klein Avi.* p. 25. n. 8. Scaries lori. *Edwards*, tom. IV. pl. 172. — Psittacus major, brevicaudus, coccineus, macula in dorso supremo et tectricibus alarum superioribus minimis luteis; remigibus majoribus exterius superne viridibus, inferne pallide roseis, interius coccineis apice nigro; rectricibus lateralibus superne prima medietate coccineis, altera saturate viridibus, binis utrimque extimis ultima medietate exterius saturate violaceo mixtis. . . . Lorius Moluccensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 219. (Ed. in 8. tom. II. p. 103. n. 14.)

1) Lori-Noira. *Buffon Oiseaux.* VI. p. 127. (Ed. in 12. tom. XI. p. 176. n. 1.)

Lori

stimmt, weil, wie wir erst gesehen haben, fast alle Lorigattungen aus diesen Inseln kommen. Diesen findet man in Ternate d), Ceram und Java; der Name Noira ist derjenige, den ihm die Holländer geben, und unter welchem er auf diesen Inseln bekannt ist. Diese Gattung wird in dem Indien so gesucht, daß man gern zehn Stücke von Achten für einen Noira giebt. Man liest in den ersten Reisen der Holländer nach Java, daß man es lange vergebens versucht habe, einige von diesen schönen Vögeln nach Europa herüber zu bringen, und daß alle auf der Reise umgekommen seyn e); doch brachten die Holländer bey der zweyten Reise einen nach Amsterdam f). Man hat sie hernach häufiger

Lori des Moluques. *Buff. pl. enl.* 216.

Scarlet Lori. *Edw. birds* 4. t. 172. Seligm. VI. t. 67. *Lath. Synopf.* I. 1. p 270. n. 76. B.

Psittacus (Garrulus moluccensis) ruber — humeris luteo-maculatis. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p 334. 25. γ.

Klein, in 8. p 47. n. 8. Halle 2. p. 118. n. 37. O.

d) Es giebt viele schöne Papagenen auf der Insel Ternate, welche roth auf dem Rücken, mit kleinen Federn vorn auf den Flügeln. Sie sind ein wenig kleiner als die aus Ostindien, allein sie lernen viel besser sprechen. *Argensola* Conquetes des Moluques. Paris 1766. III. p. 21.

e) *Linscot.* Clus. Auct. p. 364.

f) *Recueil des Voy. etc.* Amst. 1702. I. p. 529 530.

ger gesehen. Der Noira bezeigt gegen seinen Herrn Anhänglichkeit und sogar Zärtlichkeit; er liebkoset ihm mit seinem Schnabel, und zieht ihm die Haare, eins nach dem andern, sanft und vertraulich durch; zur selbigen Zeit kann er die Fremden nicht leiden, und beißt mit einer Art von Muth nach ihnen. Die Indianer auf Java halten eine Menge von diesen Vögeln g); überhaupt scheint die Gewohnheit, Papageyen zu halten, und sie zu Hausthieren zu erziehen, bey den Indianern sehr alt zu seyn, weil Aelian ihrer bereits erwähnet.

g) Die Holländer giengen in das Zimmer der Papageyen, welche ihnen viel schöner schienen, als die, welche sie an andern Orten gesehen hatten, aber von mittlerer Größe. Die Portugiesen gaben ihnen den Namen Toyras. Sie haben ein lebhaft und glänzendes Roth auf der Kehle und unter dem Bauche, und einen schönen, goldfarbigen Flecken auf dem Rücken. *Hist. Gener. des Voy.* tom. VIII. p. 136.

Spielarten des Noira.

Frisch. tab. 45.

I. Wahrscheinlich geht das auf den Noira, was Aldrovand von dem Papagey aus Java sagt, den die Insulaner Nor, das ist, glänzend nennen. Die ganze Oberseite des Körpers ist dunkelroth; der Flügel und der Schwanz sind dunkelgrün; auf dem Rücken ist ein gelber Flecken, und ein kleiner Rand von eben dieser Farbe an den Schultern. Unter den Federn des Flügels, welcher, wenn er zusammengelegt ist, ganz grün erscheint, sind nur die Deckfedern und kleinen Schwungfedern von dieser gelben Farbe, und die großen sind braun [2]).

II.

2) Noira varieté 1. *Buffon Oiseaux* VI. p. 129. n. 1. Ed. in 12. tom. XI. p. 179. 1.

Psittacus aurorae brachyurus coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis medietate postica virescentibus. *Linné Syst. Nat.* X. n. 22. Psittacus Garrulus var. Aurorae. *Linné Syst. Nat.* XII. p. 144. n. 25. β. XIII. 1. p. 333. 25. β.

O.

Spielart des Noire.



Krüger jun. del.

Büff Vögel XIX. Th. Frisch Vögl. t. 45.

II. Der lori, welchen Brisson unter dem Namen des **Lori von Ceram** h) beschreibt, und dem er alles zueignet, was ich von dem Noira sage, ist nichts als eine Spielart von demselben, und unterscheidet sich in nichts von unserm Noira, als daß seine Schenkel mit grünen Federn bedeckt sind, statt daß sie bey dem Noira die rothe Farbe haben, die der Körper hat.

h) Psittacus major brevicaudus coccineus rectricibus alarum superioribus minimis luteis; remigibus majoribus exterius superne viridibus, inferne cinereo albis, interius coccineis, apice saturate cinereo; rectricibus quatuor utrimque extimis superne primum coccineis, dein saturate violaceis, apice saturate viridibus. . . . Lorius Ceramensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 215. n. 13. Psittacus brachyurus ruber, genibus alisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis. . . . Psittacus garrulus. *Linn. Syst Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 21. XII. 1. p. 144. n. 25. *a.* XIII. 1. p. 333. n. 25.

Lory de Ceram. *Buffon Oif.* VI. p. 129. var. 2. Ed. in 12. XI. p. 180. var. 2. Ceram Lory. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 269. n. 76.

Psittacus garrulus. Limié Westgoth. Reise. p. (137.) 159. *Mif. Ad. Frid.* 2. p. 14.

Anhang.

Der geschwätzige Papagey in der königl. Sammlung, bey welchen er die Abbildung von Frisch und Edwards anführt, und den er auch in Gothenburg sahe, war am ganzen Leibe dunkelroth, auf den Schultern ein wenig gelb; der Schnabel gelblich; die Flügel grün, die Spitzen der Schwungfedern schwarz. Die Rückenfedern im Schwanze halb roth, nach der Spitze zu schwarz; die Füße schwarz. Dieser Vogel war ohngefähr so groß als eine Taube, und sehr geschwätzig. *Mus. Ad. Fr.* a. a. O. Er hatte also nicht das gelbe Schild auf dem Rücken und das Ende des Schwanzes war nicht, wie bey dem Büffonschen, grün.

2. Der Lori mit dem Halsband S: 107.

Büff: Vögel. 19 B: Büff: Fol: Pl: 84.

1. Der Lori, mit dem Halsband. S. 107.

Büff. Vögel. 19 Th. Büff. Fol. Pl. 119.

2. Der Lori mit dem Halsbande. 1)

Pl. enl. 119.
— — 84.

Diese zweyte Gattung des Lori ist auf den illuminirten Kupferplatten, unter dem Namen des männlichen Lori aus Ostindien vorgestellt; allein ich nehme diese Benennung nicht an, weil sie zu unbestimmt ist, und außerdem die Loris sich nicht wirklich durch das ganze Indien verbreiten; sondern vielmehr auf Neu-Guinea und die moluckischen Inseln eingeschränkt sind. Bey diesem ist der ganze Körper nebst dem Schwanz dunkel blutroth, welches die eigentliche Tracht der Loris ist; der obere Theil des Kopfs ist schwarz, und diese Farbe verwandelt sich auf dem Nacken in violet; die Schenkel und die Biegung des Flügels sind schön blau; am untern Theil des Halses erscheint eine gelbe halbe Halsbinde, und dies letzte ist das Kennzeichen,

1) Le Lori a collier. *Buffon Oif.* VI. p. 131. Ed. in 12 XI. p 180. Lory male des Indes orientales. *Buff. Planch. enl.* 119.

Pfittacus (Domicella) pileo caeruleo. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 334. n. 26. β.

zeichen, mit welchem ich diese Gattung unterscheiden zu müssen glaubte.

Der auf der illuminirten Kupferplatte, Nr. 84. unter der Benennung des ostindischen Lori vorgestellte Vogel, den Brisson unter eben diesen Namen i) mittheilet, scheint das Weibchen dieses zu seyn, von welchem hier die Rede ist, denn er unterscheidet sich in nichts als in der gelben Halsbinde, die er nicht hat, und in dem Blauen auf den Schultern, das sich nicht so weit verbreitet; er ist auch etwas kleiner als der vorige; vermuthlich trägt das Männchen in dieser Gattung das Halsband allein. Dieser Lori ist wie alle andere sehr zahm und vertraulich, aber er ist auch sehr zärtlich und sehr schwer aufzuziehen. Es giebt keinen, welcher leichter reden lernt, und welcher auch deutlicher aus-

i) Psittacus major brevicaudus, coccineis syncipite nigro violaceo; vertice dilute violaceo, marginibus alarum viridi et caeruleo variis, remigibus majoribus exterius superne et viridibus, inferne nigricantibus, interius luteis apice nigricante, rectricibus coccineis, apice viridi marginatis. . . . Lorius orientalis Indicus. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 22. (15.) Psittacus brachyurus ruber, pileo fusco, alis viridibus, humeris genibusque caeruleis. . . . Domicella. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. G. 44. Sp. 23. XIII. 1. p 334. n. 26. α.

Second black - cap Lory. *Edw.* 4. tab. 171. Seligm. VI. tab 66. Bor. 2. 92. 8.

Lori des indes orientales. *BuffonOis.* VI. p. 130. Ed. in 12. XI. p. 181. *Pl. enl.* 84.

Purple capped Lory. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 271. n. 77.

Die Jungfer. Müll. Naturfyst. 2 p. 142.

ausspricht; ich habe einen gesehen, sagt Herr Aublet, welcher alles, was er sagen hörte, aufs erstemal nachsagte k). So erstaunenswürdig auch diese Leichtigkeit scheinen mag, so darf man doch nicht daran zweifeln; sie scheint sogar ein Eigenthum des Loris zu seyn l). Besonders wird dieser Lori hoch geschätzt; Albin sagt: er habe einen für zwanzig Guineen verkaufen sehen. Uebrigens muß man dem Lori, der von Brisson unter dem Namen des ostindischen Lori mit dem Halsbande mitgetheilt worden ist, als eine Spielart von diesem ansehen m).

k) Er war aus Indien aus Isle de France gekommen, und mir von dem Grafen d'Estaing geschenkt. Anmerk. v. Herr Aublet.

v.

l) Die Holländer hatten einen, welcher sogleich alles Geschrey anderer Thiere, die er hörete, nachmachte. *Hist. gener. des Voy.* tom. VIII. p. 377. Alle Reisende sprechen mit Bewunderung von der Leichtigkeit, mit welcher die molukkischen Papageyen alles wiederholen, was sie hören. Ihre Farben sind mannigfaltig, und machen eine angenehme Mischung. Sie schreyen viel und stark. Eb

m) Psittacus major brevicaudus, coccineus, uropygio et imo ventre ex albo roseo variegatis; capite superiore et remigibus majoribus cyaneis; torque luteo, rectricibus purpureis, fusco rubescente adumbratis. . . . Lorius torquatus Indicus. *Briss. Ornithol.* tom IV. p. 230. n. 15. tab. 24. f. Psittacus capite cyaneo collari luteo. *Klein*, *Avi.* p. 25. n. 17. — Laurey from the brasile. *Albin*, tom. I. planche 13. Psittacus Domicella. *Linne* XIII. 1. p. 334. β.

Der brasilische Papagey. Halle 2. p. 112. n. 25.

Der

3. Der dreyfarbige Lori. n) r)

Pl. enl. 168.

Das schöne Rothe, Himmelblaue und Grüne fällt auf dem Gefieder dieses Lori sehr in die Augen, und da diese Farben in großen Maßen aus-

ge-

n) First black-capped Lory. *Edwards*, tom. IV. pl. 170. — Psittacus major brevicaudus, coccineus, colli superiore dorso supremo, medio pectore, medio ventre, rectricibusque caudae inferioribus caeruleo-violaceis; capite superius nigro; remigibus majoribus exterius superne prima medietate coccineis, altera saturate viridibus, exterius saturate violaceo marginatis. . . . Lorius Philippensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 226 n. 16. tab. 1. f. 2. Psittacus brachyurus purpureus, pileo nigro, alis viridibus, pectore, genibus, caudaque caeruleis. Lory. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 24. (XIII. 1. p. 335. n. 27.)

V.

r) Psittacus (Lory) purpureus, pileo violaceo, alis viridibus, pectore genibus caudaque caeruleis, orbitis subincarnatis. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 335. n. 27. XII. 1. p. 145.

Der erste Lory mit schwarzer Kappe. Psittacus coccineus orientalis vertice nigro. Seligmann Vögel VI. tab. 65.

Lori

Der dreifarbige Lori S.110.



Büff: Vögel. 19 B. Büff: Fol: Pl: 168.

getheilt, so hat uns solches bewogen, denselben den dreyfarbigen lori zu nennen. Der Hals vorn und an den Seiten, die Seiten mit dem untersten Theil des Rückens sind roth. Das unterste am Leibe, die Lenden, und der obere Theil des Rückens sind blau. Der Flügel ist grün, und die Spitze des Schwanzes blau. Eine schwarze Kappe bedeckt den Scheitel des Kopfs. Die Länge dieses Vogels beträgt beynahe zehn Zoll. Es giebt wenige lori von der Schönheit, Glanze, der Niedlichkeit, und dem Schimmer der abstechenden Farben. Seine Artigkeit stimmt völlig mit seiner Schönheit überein. Edwards, welcher ihn lebendig sahe, und den kleinen lori nannte, sagt: daß er artig pfeife, verschiedene Worte deutlich ausspreche; fröhlich auf seinen Stangen oder auf dem Finger springe, und dann mit sanfter und heller Stimme Lori Lori rufe. Er spielt mit der hingehaltenen Hand; läuft bey dem Menschen her, indem er wie ein Sperling hüpft: dieser artige Vogel lebte nur wenige Monate in England. Er ist auf unsrer ausgemahlten Kupferplatte abgebildet, unter dem Namen des philippinischen lori. Herr Sonnerat fand ihn auf der Insel Yolo, von welcher die Spanier behaupten, daß sie zu den Philippinischen, die Holländer aber, daß sie zu den Moluckischen gehöre.

V.

Lori tricolor. *Buffon Oiseaux* VI. 1. p. 132. Ed. in 12. XI. p 183. 3.

Lory des philippines. *Buffon Pl. enl.* 168.

black-capped Lory. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 335. n. 78.

Φ.

An=

Anhang.

Die ausgemahlte Abbildung weicht in den Farben etwas von der angegebenen Beschreibung ab. Denn es ist nicht bloß der untere Theil des Rückens mit dem Bürzel, sondern auch der größte Theil des Schwanzes roth, die Spitze desselben aber nicht blau, sondern grün vorgestellet, und in den grünen Flügeln ist eine gelbe Feder. Der Schnabel und die Füße erscheinen roth, die Einfassung des Schnabels, und die Regenbogenhaut im Auge aber gelb. O.

4. Der

Der karmosinfarbne Lori. S. 113.

Büff. Vögel. 10 B. Büff. Fol. T. 58.

4. Der karmoſinfarbne Lori. o) 1)

Pl. enl. 518.

Dieſer Lori iſt beynahe eilf Zoll lang; ich nenne ihn deshalb den carmoſinfarbnen Lori, weil ſein Rothes, das Angeſicht ausgenommen, bey weiten nicht ſo prächtig iſt als das Rothe der übri-

o) Pſittacus major brevicaudus, ſuperne ſaturate coccineus, inferne obſcure violaceus; rectricibus ſaturate coccineis, apice ſordide pallide rubris. Lorius Amboinenſis. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 231. n. 19. (Ed in 8. tom. II. p. 107.)

V.

1) Lory d'Amboine. *Buffon Pl. enl.* 518. Lory Cramoiſi. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 133. Ed. in 12. XI. p. 185. n. 4.

Blue-breaſted Parrot. *Brown illuſtr.* p. 12. t. 6. Crimſon Lory. *Latham Synopſ.* I. 1. p. 273. n. 79.

Pſittacus (puniceus) ſaturate coccineus, ſubtus violaceus, tectricibus alarum minoribus et interioribus, remigibus intus et ſubtus ex nigricante fuſcis. *Linne Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 335. n. 100.

O.

übrigen Loris, und auf den Flügeln abgeschossen, und gleichsam braun angelaufen scheint. Das Blaue an der obern Seite des Halses und auf dem Bauche ist schwach, und fällt ins Violette, aber an der Biegung des Flügels ist es lebhaft und lasurfarben, und am Rande der großen Schwungfedern verliert es sich in ihren schwärzlichen Grund; der Schwanz ist unterhalb verräuchert roth, oberhalb aber ziegelroth, wie auf dem Rücken.' Diese Gattung ist nicht die einzige in Amboina, und nach dem Zeugniß des **Gemelli Carreri** findet man die folgende ebenfalls daselbst p).

p) Auf Amboina giebt es mehrere Arten Papageyen, und unter andern eine, an welcher alle Federn fleischfarbig sind. *Voyage autour du monde par Gemelli Carreri.* tom. V. p. 236.

Anhang.

Brown beschreibt diesen Vogel auf folgende Weise: Der blaubrüstige Papagey ist ohngefähr eilf und einen halben Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz wie Ebenholz. Der Kopf, Hals und Rücken sind schön scharlachfarben; die Brust, Schultern sind prächtig dunkelblau. Die Schwungfedern scharlachroth; die vordersten aber blau. Die Dickbeine sind scharlachroth mit wenigen untergemischten blauen Federn. Der Schwanz ist sehr lang, am Ende gleich und scharlachfarbig, mit orangegelben Ende. Der Herr Robert Child in London besaß diesen Vogel. Brown a. a. O.

5. Der rothe Lori. 1)

Buff. Pl. enl. 519.

Obgleich das Rothe bey allen Loris die herrschende Farbe ausmacht, so verdient doch dieser vor allen andern den Namen, den ich ihm gebe: er ist ganz roth, die Spitze des Flügels ausgenommen, die schwärzlich ist; zwey blaue Flecken auf dem Rücken, und einer von eben der Farbe auf den Deckfedern unter dem Schwanze 2). Er ist zehn Zoll lang. Dies ist eine Gattung, die neu zu seyn scheint. Ich verbessere die Benennung: der chinesische lori, welche ihm auf der illuminirten Platte gegeben ist, weil

1) Lori de Gilolo. *Sonnerat Voy.* p. 177. tab. 112. Lori rouge. *Buff. Ois.* VI. p. 134. Ed. in 12. XI. p. 186. n 5. Lori de la Chine. *Buff. pl. enl.* 519. Molucca Lory. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 274. n. 80. Psittacus ruber, area oculorum remigibusque nigris, alarum macula et tectricibus caudae inferioribus cyaneis, caudae apice bifido. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 335. n. 101.

2) In der Abbildung, welche mit der folgenden viele Aehnlichkeit hat, sind umgekehrt 2 blaue Flecken auf den Deckfedern unter dem Schwanze, und ein kleiner, blauer Flecken auf dem Rücken.

O.

Der rothe Lori. Tab.



Büff. Vögel. 19 B. Büff. Fol. Pl. 519.

weil es nach dem Bericht der Reisenden nicht scheint, daß man Loris in China antreffe, und weil einer von den besten Beobachtern, Herr Sonnerat versichert, daß sie alle Einwohner von den molucksischen Inseln, und von Neu-Guinea seyn; und in der That scheint unser gegenwärtiger Vogel dieses Beobachters Lori von Gilolo zu seyn q).

q) *Voyage a la nouvelle Guinée.* p. 177.

V.

6. Der rothe und violette Lori. [1])

Buff. pl. enl. 684.

Dieser Lori ist bis jetzt noch nirgends als in Gueby gefunden worden, und deshalb heißt er auf den illuminirten Platten der Lori von Guebey. Der ganze Körper ist glänzend roth, von dem Hinterkopf an, über die Seiten des Halses bis auf den Bauch regelmäßig violetbraun geschuppt; der Flügel theilt sich in roth und schwarz, so daß diese letztere Farbe alle Spitzen der Federn endigt, und einen Theil ihrer Fahnen einnimmt; die kleinen Schwungfedern und die Deckfedern auf demselben, die am nächsten am Körper stehen, sind braun violet; der Schwanz ist kupferroth; die ganze Länge dieses Lori beträgt acht Zoll [2]).

1) Le Lori rouge violet. *Buff. Oiſ.* VI. p. 135. ed. in 12. XI. p. 188. b. Lori de Gueby. *Buff. pl. enl.* 684. Petit Lory de Guebi. *Sonnerat Voy.* p. 174. tab. 109. Gueby Lory. *Lath. Synopſ.* I. 1 p. 219. n. 21. Pſittacus (guebienſis) ſplendide ruber, remigibus nigris transverſim faſciatis, cauda ex rubro fuſca. *Linne Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 318. n. 60.

2) Nach der Abbildung ſollte man ihn beynahe für eine Abänderung des vorigen halten.

O.

Der rothe und violette Lori. S. 118.

Büff: Vögel. 19 B. Büff: Fol: Pl: 684.

7. Der große Lori. [1])

Buff. pl. enl. 683.

Dieser ist der größte unter allen Loris, und dreyzehn Zoll lang. Der Kopf und der Hals sind schön roth: der untere Theil des Halses, der an den Rücken stößt, ist violet blau. Die Brust ist versehen mit rothe, blaue, violette und grüne Wolken; das Gemenge von Grün und schön Roth dauert noch auf dem Bauch fort; die großen Schwungfedern, und der Rand des Flügels von der Schulter an, sind lasurblau; das übrige von dem Mantel ist bräunlich roth. Die Hälfte des Schwanzes ist roth, seine Spitze ist gelb.

Es scheint dieses die Gattung zu seyn, die Vosmaer unter dem Namen des Ceylonischen lori beschrieben hat: sie war wahrscheinlich weiterher nach dieser Insel, und von dieser Insel nach Holland gebracht

1) Lori de nouvelle Guinée. *Buffon Oif.* VI. p 135. ed. in 12. XI. p. 189. *Pl. enl.* 683. Lory rouge pourpre de Ceylan. *Vosmaer* 1769. p. 10. t. 7. *Latham Synopf.* I. 1. p. 275. n. 81. Pfittacus grandis. *Linne Syft. Nat.* XIII. 1. p. 335. n. 102.

bracht worden; allein der Vogel lebte daselbst nicht lange, und starb am Ende von einigen Monaten r).

r) *Vosmaer* 1769. tab 7.

V.

Ich will die Beschreibung von Vosmaer folgen lassen, und man wird sehen, daß sie ganz auf diesen Vogel paßt.

O.

Na-

Der grosse purpurrothe Lory v. Ceylon S. 121.



Naturgeschichte des großen purpurro-then Lory von Ceylan. [1])

Herr Vosmaer beschreibt diesen Vogel und sagt: An Größe übertrifft dieser Vogel ein wenig den bleyfarbigen Papagey mit rothem Steiße (Pl. erithacus L.) und wird darin seiner Seits von dem doppelten Amazonpapagey (Pl. aestivus L.) übertroffen.

Der ganze Kopf, der Hals, ein Theil der Brust sind schön dunckel scharlachfarbig; solche Farbe haben auch der Rücken, der größte Theil der Flügel, die Federn der Beine, und die unteren Theile nahe am Schwanze. Daher man wegen der herrschenden Farbe diesen Vogel den purpurrothen Lory nennt. Bloß die Brust ist mit einem verloschenen Blau geschmückt, wie man an den blauen Pflaumen siehet, davon der Thau noch nicht abgewischt ist,

1) Grand Lory rouge-pourpré de Ceylan. *Vosmaer.* Amsterd 1769. 4. p. 1-10. tab. VII.

Psittacus grandis. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 335. n. 102.

und wodurch die Farbe vom Purpurrothen durchscheint. Eben dieses Blaue der Brust, welches bis zu den Beinen herabsteigt, erhebt sich an beyden Seiten vor der Falze der Flügel, und macht einen Kreis unten am Halse, da es sich bis zum Rücken erstreckt. Die vordern Ränder der Flügel sind mit kleinen Federn von sehr schönem Blau eingefaßt; das Ende der Schwingfedern, und sogar die äußere Hälfte der vordersten oder größesten Schwingfedern sind von schöner dunkelblauer Farbe. Die Schwanzfedern sind oben roth, und am Ende schön hellgelb. Unten sind diese Federn eigentlich ganz gelb, haben aber in der Mitte einen hell rothgelben Anstrich.

Der Schnabel dieses Vogels ist schwarz; die Nasenlöcher sind klein, oval, und ragen nur sehr wenig vor den Stirnfedern hervor. Die Augen sind schwarz mit einem gelben Kreise.

Die Beine sind schwarzgrau, wie die Füße, die zwey Zehe nach vorn, und zwey nach hinten gerichtet haben, von welchen der innere der kürzeste ist. Die Nägel sind groß, gebogen, schwarz und spitzig. **Vosm.**

Die

Die Sittich-Loris.

Die Gattungen, welche jetzt folgen, sind Vögel, die fast ganz roth sind, wie die Loris, aber ihr Schwanz ist länger, doch ist er kürzer als der Schwanz der Sittiche, und man muß sie als die Schattierung zwischen den Loris und den Sittichen der alten Welt ansehen. Ich nenne sie aus dieser Ursach **Sittich-Loris** (Loris perruches).

I. Der rothe Sittich-Lori. a) 1)

Edw. 4 tab. 173.
Seligmann VI. tab. 68.

Das Gefieder dieſes Vogels iſt beynahe gänzlich roth; ausgenommen einige Deckfedern und die Spitzen der Schwungfedern und der Ruderfedern,

a) Pſittacus minor longicaudus, coccineus; collo inferiore et pectore dilutius coccineis, marginibus pennarum luteis; remigibus apice viridibus, tribus corpori finitimis caeruleis; rectricibus ſordide rubris, ſuperne apice virideſcentibus, utrimque extima ſuperne virideſcente. . . . Pſittacus coccinea Bonarum fortunarum inſulae. *Briſſ. Ornithol.* tom IV. p. 373. n. 77. Pſittacus macrourus ruber remigibus, rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea. . . . Pſittacus bornaus. *Linné Syſt Nat.* ed. X. Gen 44. Sp 6. — Long-tailed ſcarlet Lory. *Edwards, Hiſtory of Birds,* tom. IV. pl. 143.

1) Lori-Perruche rouge. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 137. Ed. in 12. XI. p. 190. 1.
Long tailed Scarlet Lory. *Edw. birds.* tab. 173. *Latham Synopſ.* I. 1. p. 216. n. 18.
Der lang-geſchwänzte Scharlach-Lory. Seligmann Vögel VI. tab. 68.

Der

Der rothe Sittich Lori.

S. 124.

Krüger jün. del.

Büff. Vögel. XIX Th. Edw. 4. t. 173.

dern, von welchen einige grün, und die andern blau sind. Die Länge des ganzen Vogels beträgt acht und einen halben Zoll.

Edwards sagt: er sey sehr selten, und daß ein Reisender ihn an den Herrn Sloane gegeben, und gesagt, er käme von Borneo.

Der rothe Parkit. Müller Naturfyst. 2. p. 132.

Psittacus borneus. *Linne Syst. Nat.* XII. 1. p. 141. n. 11. XIII. 1. p. 318. n. 11.

2. Der

2. Der violet und rothe Sittich-Lori. b) 1)

Buff. pl. enl. 143.

Die herrschende Farbe dieses Vogels ist die rothe mit Violet gemischt. Seine ganze Länge beträgt zehn Zoll; der Schwanz macht den dritten Theil

b) Psittacus minor longicaudus, coccineus, superne saturatius, inferne dilutius, fusco et caeruleo violaceo variegatus; capite collo superioribus, pectore et taenia pone oculos caerulco-violaceis; remigibus majoribus dilute fusco, minoribus fusco-violaceo terminatis; rectricibus fusco-violaceis, lateralibus interius coccineis. . . . Psittaca Indica coccinea. *Briss. Ornithol.* tom. IV p. 376. tab. 25. f. 2. n. 78. (Ed. in 8. tom. II. p. 145.)

V.

1) Lori perruche violet et rouge. *Buffon Oiseaux* VI. p. 138. Ed. in 12. tom. XI p. 191. n. 2.

Perruche des Indes orientales. *Buff. pl. enl.* 143.

Indian Lory. *Latham Synopf.* I. 1. p. 217. n. 19.

Psittacus (indicus) coccineus, fusco et violaceo variegatus, capite et collo superioribus, pectore

Der Violet und rothe Sittich Lori. S. 126.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 143.

Theil dieser länge aus, und derselbe ist ganz dunkelblau, so wie auch die Seiten, der Bauch, der obere Theil des Rückens und des Kopfs [2]). Die Schwungfedern sind gelb, alles übrige des Gefieders ist schon roth, und hat auf den Flügeln schwarze Ausschweifungen [3]).

ctore et taenia pone oculos violaceis, rectricum majorum apice dilute fusco, minorum rectricibusque ex fusco violaceis. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 318. n. 58.

O.

2) Von den Augen geht an jeder Seite ein blauer Streif nach dem Blauen des Rückens, und verbindet dieses mit dem auf dem Scheitel.

3) Jede Deckfeder der Flügel hat nämlich an dem runden Ende einen schmalen, schwarzen Rand, welche mit den benachbarten schwarzen Enden der daran liegenden Deckfedern aus- und eingebogene schwarze Queerbinden machen.

O.

3. Der

3. Der dreyfarbige Sittich-Lori. c) 1)

Pl. enl. 240.

Man kann diesen Vogel mit Recht dreyfarbig nennen. Das Rothe, das Grüne und Türkisblaue nimmt in drey großen Maßen sein ganzes

c) Psittacus minor longicaudus, superne caeruleo-violaceus, inferne coccineus; capite et collo coccineis; remigibus exterius saturate viridibus, interius et subtus nigricantibus; rectricibus saturate violaceis, lateralibus interius et subtus nigricantibus; duabus utrimque extimis rubro marginatis. . . . Psittaca Amboinensis coccinea. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 378. (tab. 28. f. 2. Ed. in 8. tom. II. p. 146. n. 79.)

V.

1) Lori perruche tricolor. *Buffon Oiseaux* VI. p. 138. Ed. in 12. XI. p. 192. n. 3.

Perruche rouge d'Amboine. *Buff. planch. enl.* 240.

Amboina red Parrot. *Latham Synops.* I. 1. p. 210. n. 12.

Psittacus (amboinensis) coccineus, dorso caeruleo, alis macula viridi. *Linne Syst. Nat.* XII. 1. p. 141. n. 9. XIII. 1. p. 316. n. 9.

Der

Der dreyfarbige Sittich Lori.

S. 128.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 240.

ganzes Gefieder ein. Das Rothe bedeckt den Kopf und Hals, nebst dem ganzen untern Theil des Leibes. Der Flügel ist dunkelgrün; der Rücken und Schwanz sind dunkelblau, weich und sammetartig.

Der Schwanz ist sieben Zoll lang; der ganze Vogel funfzehn und einen halben Zoll, und hat die Größe einer Turteltaube.

Der Schwanz ist bey diesen drey letzten Arten zwar länger als er gewöhnlich an den Loris und eigentlichen Papageyen ist, aber doch nicht so stufenförmig als an den Sittichen mit langen Schwänzen, sondern besteht aus gleich langen, und fast viereckig abgestutzten Ruderfedern [2]).

Der amboinische Papagey. Müller Natursyst. 2. p. 131.

♂.

2) In den Abbildungen sind die Schwänze doch stark abgerundet.

♀.

Die Sittiche aus der alten Welt.

Die Sittiche mit langem und gleichgestuftem Schwanze. 1)

Ich theile die Sittiche mit langen Schwänzen in zwey Familien, die erste bestehet aus denen, deren Schwanz gleich gestuft ist, und die zweyte aus denen, die einen ungleichen, oder vielmehr ungleich gestuften Schwanz haben, das ist, deren zwey mittlere Schwanzfedern viel länger als die übrigen sind, und die über dieses von einander abgesondert zu seyn scheinen. Alle diese Sittiche sind größer als die mit kurzem Schwanze, von welchen wir hernach die Beschreibung geben werden, und dieser lange Schwanz unterscheidet sie auch von allen kurzgeschwänzten Papageyen.

1) Perruches a queue longue et egalement étagée. *Buff. Oiſ.* in 12. Tom. XI. p. 294.

Der grosse Sittich mit dem Lebhaft rothen Halsbande.

S. 131.

Der große Sittich mit dem lebhaft rothem Halsbande. a) 1)

Pl. enl. 642.

Erste Gattung mit lang und gleich gestuftem Schwanze.

Plinius und Solin haben beyde den Papagey mit dem grünen Halsbande beschrieben, welcher der einzige war, den man zu ihrer Zeit kannte,

a) Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldrovande, Avi.* tom. I. p. 678. mit einer ziemlich kenntlichen Abbildung. p. 679. *Willughby ornith.* p. 77. mit einer wenig genauen Figur. tab. XVI. weil er sie nach dem Olina genommen, der diesen Sittich nicht abgebildet hat.

Ray Synopf. avium. p. 33. n. 1.

Psittacus torquatus. *Jonston av.* p. 23. mit einer ebenfalls schlechten Abbildung.

Charleton Exercit. p. 74. n. 10. *Onomaft.* p. 67. n. 10.

Psittacus macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra. Psittacus Alexandri. *Linné Syst. Nat.* X. G. 44. Sp. 9.

und der aus Indien kam b); Apulejus schildert ihn auf die ihm gewöhnliche Art c), und sagt: sein Ge-

Le Perrochetto d'Olina. p. 27. Ist nicht der maldivische Sittich, der Papagey der Alten, sondern vielmehr unser Sittich mit dem Halsbande. *Pl. enl.* 551. denn er legt ihm den Namen Scincialo bey, sagt, er käme aus der Insel Spanien, und seine Figur hat ein Halsband.

Ring Parraket. *Edwards Glean.* p. 175. pl. 292. die oberste Figur.

Brisson, welcher in seinen Supplementen p. 127. diesen Sittich des Edwards zu seinem Sittich mit dem Halsbande (n. 55.) rechnet, kann nicht umhin, zu bemerken, daß, außer dem Unterschiede der Größe, derselbe auf jedem Flügel Rothes habe. Und Edwards unterscheidet genau selbst an dieser Stelle diesen großen Sittich von der Größe einer Taube von dem kleinen Sittich mit dem Halsbande, so groß als eine Amsel, den man sonst viel häufiger sieht.

v.

1) Psittacus (Alexandri) viridis, collari pectoreque rubris, gula nigra. *Linne Amoen. acad.* 4. p. 236. *Mus. Adolph. Frid.* 2. p. 14. *Syst. Nat.* XII. 1. p. 141. n. 14. XIII. 1. p. 321. n. 14. *Scop. Ann.* I. p. 29. n. 26.

Der grüne Papagey mit rothem Halse und Brust. Scop. Günther. S. 23. n. 26.

Psittacus (cubicularis) cauda cuneiformi, digito inferiore postico mutico. Hasselquist Reis. 235. teutsch. S. 292.

Grande Perruche a collier d'un rouge vif. *Buffon Ois.* VI. p. 141. Ed. in 12. XI. p. 195. n. 1. Per-

Gefieder sey niedlich und glänzend grün. Plinius sagt: er sey am ganzen Leibe grün, bis auf einen hellrothen Ring im Nacken d).

Aldrovand, welcher alle Züge von diesen Beschreibungen gesammlet hat, läßt uns nicht zweifeln, daß dieser Papagey der Alten mit der Halsbinde und dem langen Schwanze nicht unser großer Sittich mit dem rothen Halsbande seyn sollte. Um dieses zu beweisen, wird es genug seyn, zwey Züge aus Aldrovands Beschreibung anzuführen; der erste ist die Breite des Halsbandes, welches, wie er sagt, in der Mitte eines kleinen Fingers breit ist. Der andere ist der rothe Flecken, der das obere des Flügels zeichnet e). Nun

Perruche a collier des iles Maldives. *Buffon* pl. enl. 642. Bor. 2. 94. 14. Osbeks Reis. I. p. 156.

Alexandrine Parrakeet. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 234. n. 37.

Kragenpapagey. Müller Naturfyst. 2. p. 133.

Papagey mit einem Halsstreif. Seligm. Vögel. VIII. tab. 82. 1.

O.

b) *Plin.* Lib. X. c. 42. *Solin.* cap. 52.

V.

c) *Florid.* Lib. II.

d) Viridem toto corpore, torque tantum, miniato in cervice distinctam. *Plin.* Lib. X. cap. 41.

e) Alarum pennae . . . circa medium, in superiore parte rubra nota distinguuntur. *Aldrovande.* tom. I. p. 678.

ist dieser von allen Sittichen, die dem Papagey der Alten ähnlich seyn könnten, der einzige, der diese zwey Abzeichen hat; die andern haben kein Rothes auf der Schulter; und ihre Halsbinde ist nur eine Schnur, die keine beträchtliche Breite hat. Uebrigens kommen in diesem Sittich alle Züge von Schönheit der Vögel seines Geschlechts zusammen; auf dem Kopf hat er ein heiteres und helles Grün, auf den Flügeln und dem Rücken ist es dunkeler; eine halbe rosenfarbne Halsbinde, die, indem sie den Hintertheil des Halses umgiebt, an den Seiten auf eine schwarze Binde, die die Kehle verhüllt, stößt; der Schnabel ist rosenroth, und oben an dem Flügel ist ein purpurner Flecken. Hierzu kommt ein schöner Schwanz, der länger als der Körper ist, auf dessen Oberfläche sich Grün und Aquamarinblau vermengen, und der unten zart gelb gefuttert ist. Dieses ist sowohl die einfache als geschmückte Figur dieses großen schönen Sittichs, welches der erste bekannte Papagey der Alten war. Er findet sich nicht allein auf dem festen Lande des mittäglichen Asiens, sondern auch auf den benachbarten Inseln und auf Zeilan; denn es scheinet, daß von diesen letzten Inseln die Schifffahrer von Alexanders Armee ihn nach Griechenland gebracht haben, wo man noch keine Art der Papageyen kannte f).

f) Man sehe das Ende der vorhergehenden Abhandlung von den Papageyen überhaupt.

Anhang zu dem großen Sittich mit dem hellrothen Halsbande.

Scopolis Beschreibung paßt am besten auf die Büffonsche Abbildung. Die Hasselquistische und Linneische bezeichnen schon Spielarten in der Farbe. Hasselquist sagt: der Kopf, Leib und Schnabel sey, wie bey andern Arten, der innerste Hinterzehe habe keinen Nagel gehabt, sondern sey abgestutzt gewesen. Die Regenbogenhaut habe aus einem inneren wasserfarbigen, und einem äußeren weißlichen Ringe bestanden. Die Augenbraunen waren höckerig, unten gelb, oben weißlich. Die Flügel länger als der Leib, an dem Ende spitz; der Schwanz keilförmig, sehr verdünnt, so lang als der Leib. Von den zwölf Ruderfedern waren die beyden mittelsten länger. Die Farbe war am Oberkiefer fast gänzlich blutroth, ausgenommen am Rande, an der Spitze und unterem Theile des Rückens war er schwärzlich; der Unterkiefer war ganz schwarz; von den Augen zu den Nasenlöchern lief ein grader, schmaler, schwärzlicher Strich; die Kehle war schwarz, und an beyden Seiten erstreckte sich von der Kehle bis mitten auf den Hals ein schwarzer Ring, welcher da, wo die schwarze Farbe aufhöret, gelbroth wird, und den Hals oben umfaßt, unten breiter, oben schmäler ist;

der Kopf, Leib und Bauch waren hellgrün; die Schultern etwas dunkler grün, (also ohne rothen Flecken wie bey Büffon und Scopoli). Die Schwungfedern dunkelgrün, am untersten Rande auswärts heller; die äußersten Ruderfedern waren hellgrün, mit einer schwarzen, schmalen Ribbe in der Mitte, die längste grünblaulich, mit einer ebenfalls schwarzen Ribbe; die Zehe weißlich, die Nägel graubraun. Er war so groß als eine Turteltaube; der Leib eine Spanne, der Hals einen Zoll, der Kopf über den Scheitel einen halben Zoll, der Unterkiefer einen halben Zoll, und der Schwanz eine Spanne und 2 Zoll lang.

Er ist aus Afrika, und wird des Gewinnstes halber nach Cairo gebracht; sein ganzes äußeres Ansehen ist sehr schön; er giebt einen klingenden ekelhaften Ton, lernt aber leicht, ihn gewissermaßen zu artikuliren. Er frißt vorzüglich den Saamen des Saflors. Hasselq. a. a. O.

Dieser Vogel war auch in der Königl. Adolph Frieder. Sammlung; in dieser beschrieb ihn Linné unter dem Namen Alexanderspapagey folgendermaßen. Er ist so groß als eine Turteltaube; der Leib ist grün, der Schnabel oben fleischfarbig, die Wachshaut weiß; der Kopf aschgrau, mit einem graubraunen Strich zwischem den Augen und dem Schnabel; die Augen sind schwarz, das sehr schmale Halsband ist roth; die Kehle ist von einem breiten, schwarzen, hinten gespaltenen Flecken schwarz; die Brust verloschen fleischfarbig, (dieses fehlt der Büffonschen Abbildung auch). Die Schwungfedern sind größtentheils graubraun, am Rande grün; die

der zweyten Ordnung sind weniger graubraun. Der Schwanz ist keilförmig, sehr lang, grün, unten grünlich, (in der Büffonschen Abbildung grüngelb;) die beyden mittelsten Ruderfedern sind blaugrünlich, und die Füße blaß. *Mus. Ad. Fr.* Hier waren also die Schultern auch nicht roth, wie bey Büffon.

Linné sahe den folgenden borbonischen Ringelpapagey des Brisson, so wie dessen indianischen blauköpfigen Papageyen (n. 96); und dessen indianischen Ringelpapagey n. 56. als Abarten seines Alexanderspapageyen an.

Osbeck brachte noch einen Papagey dieser Art mit, welcher übrigens wie der eben beschriebene beschaffen, aber unter dem Halse und auf der Brust roth war, und Flügeldecken, welche in der Mitte gelb waren, hatte. Am. ac. a. a. O.

O.

Der Sittich mit dem doppelten Halsbande. g) 1)

Zweyte Gattung mit dem langen und gleichen Schwanze.

Buff. Pl. enl. 215.

Zwey kleine Halsbände, ein rosenrother und ein blauer, umgeben den ganzen Hals dieses Sittichs, welcher so groß ist als eine Turteltaube; übrigens

g) Psittacus minor, longicaudus, viridi, inferne ad flavum inclinans; torque roseo, taenia transversa sub gutture lutea, ad colli latera nigra; rectricibus superne viridibus subtus cinereo flavis. . . . Psittaca Borbonica torquata. *Briss. Ornith.* tom. IV. p. 328. (n. 57. tab. 27. f. 1. (Ed. in 8. tom. II. p. 132. n. 57.)

V.

1) La perruche a double collier. *Buffon Oiseaux* VI. p. 143. (Ed. in 12. XI. p. 199. n. 2.)

Perruche a collier de l'isle de Bourbon. *Buff. Pl. enl.* 215.

Psittacus (Alexandri) torque duplici. *Linne Syst. Nat.* XII. 1. p. 142. 14. γ. XIII. 1. p. 321. δ.

Φ.

Der Sittich mit dem doppelten Halsbande.

S. 138.

gens ist sein ganzes Gefieder grün, dunkler auf dem Rücken, und gelblicher grün unter dem Leibe, und an mehreren Stellen dunkler, mitten auf jeder Feder schattirt; die Mitte des Oberkiefers ist schön roth, der untere braun. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Sittich, der von der Insel Burbon kam, sich auch auf dem benachbarten festen lande, entweder in Afrika oder Indien finde.

Anhang.

Linné hielt diesen Vogel für eine Abart des vorigen; nach der bloßen Beschreibung scheint solches auch wahrscheinlich; indessen sind die beyden Büffonschen Abbildungen doch sehr verschieden. Dieser Sittich mit dem doppelten Halsbande ist nemlich gedrungener, sein Schwanz nach Verhältniß kürzer, die grüne Farbe viel dunkler, mit einem Schein des gelben gemischt; das Gelbe unter dem Schwanze mehr mit Braun gemischt; die vordersten Schwungfedern unten blaugrau; der Schnabel ganz dunkelroth, unter der Kehle kein solcher schwarzer großen Flecken, sondern unter dem Halse, gleich an dem schmalen rothen Ringe ein gelber Flecken.

O.

Der

Der Sittich mit dem rothen Kopfe.

S. 141.

Pnüff. Vögel XIX Th. v. Pnuff. fol. Pl. 264

Der Sittich mit dem rothen Kopfe. h) 1)

Dritte Gattung mit lang und gleich gestuftem Schwanze.

Buff. Pl. enl. 264.

Dieser Sittich ist eilf Zoll lang, sein Schwanz ist länger als der Körper, und oben gänzlich bräunlich grün, mit einem purpurrothen Flecken oben

h) Psittacus minor longicaudus, superne viridi flavicans, inferne luteo virideſcens; capite rubro, dilute caeruleo adumbrato; taenia nigra ab oris angulo ad oris angulum per occipitum ducta; gutture nigro; macula in alis obſcure rubra; rectricibus viridibus, lateralibus interius luteis. . . . Psittaca Ginginiana erythrocephalos. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 346. (n. 65. tab. 29. f. 2.) (Ed. in 8. tom. II. p. 136. n. 65.)

Y.

1) La Perruche a tete rouge. *Buff. Oiſeaux.* VI. p. 144. (Ed. in 12. XI. p. 200. n. 3.)

Perruche a tete rouge de Gingi. *Buff. Pl. enl.* 264.

Blosſom headed Parrakeet. *Lath. Synopſ.* I. I. p. 239. n. 39.

Psit-

oben auf dem Flügel; das Gesicht ist purpurroth, welches auf dem Kopfe ins Blaue fällt, und im Nacken mit einem langen, schwarzen Zug sich endigt, welcher die Kehle bedeckt; der untere Theil des Leibes ist erloschen gelb und dunkel; der Schnabel ist roth.

Psittacus (erythrocephalus) viridis, capite rubro, caeruleo admisto, gula nigra torque nigro et pallide viridi. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 325. n. 74.

Der purpurköpfige Papagey. Müller Naturs. syst. Suppl. p. 74.

Die nachher zu beschreibenden kleinen und großen Sittiche, mit rosenrothem Kopfe und den langen Schwanzspitzen, werden im Linneischen dreyzehnten Systeme als Abarten auch hieher gerechnet.

O.

Der

Der Sittich mit dem blauen Kopfe.

Der Sittich mit dem blauen Kopfe. i) 1)

Vierte Gattung mit lang und gleichem Schwanze.

Buff. Pl. enl. 192.

Dieser Sittich ist zehn Zoll lang, er hat einen weißen Schnabel, blauen Kopf, und grünen Körper; der vordere Theil des Halses ist gelb, und dies

i) Pſittacus minor longicaudus, ſuperne viridis, inferne viridi luteus; capite caeruleo violaceo, ſyncipite ad rubrum inclinante; gutture cinereo-violaceo; collo ad latera luteo; tectricibus ſubtus cinereo-luteis, ſuperne binis intermediis viridi caeruleis, utrimque proxima exterius viridi caerulea, interius luteo viridi, quatuor utrimque, extimis exterius viridibus, interius luteis, lateralibus apice pallide. . . . Pſittaca Cyanocephalos. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 359. (n. 70. tab. 19. f. 2.) (Ed. in 8. tom. II. p. 140. n. 70.)

1) Perruche a tete bleue. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 145. (Ed. in 12. tom. XI. p. 201. n. 4.)

dies Gelb ist unter dem Bauch und Schwanz mit Grün vermengt, dessen mittlere Federn oberhalb eine blaue Tinte haben; die Füße sind bläulich.

Perruche a tete bleue des indes orientales. *Buffon Pl. enl.* 192.

Blue headed Parrot. *Latham Synopf.* I. 1. p. 211. n. 13.

Pſittacus (cyanocephalus) viridis capite gulaque caeruleis. *Linn. Syſt Nat* XII. 1. p. 141. 10. XIII. 1 p. 316. n. 10. Der Blaukopf. Müller Naturſyſt. 2. p. 131.

Der Lori Sittich.

S. 145.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 552.

Der Lori-Sittich. k) l)

Fünfte Gattung mit lang und gleichem Schwanze.

Buff. pl. enl. 552.

Wir nehmen den Namen an, den Edwards dieser Gattung gegeben hat, wegen der schönen rothen Farbe, welche ihn den Loris zu nähern scheint;

k) Psittacus minor longicaudus, viridis marginibus pennarum in dorso et ad latera ventris luteis; capite superius et macula ad aures nigro caeruleis; occipite, genis, gutture, collo inferiore et pectore coccineis, marginibus pennarum in pectore viridi nigricantibus, taenia utrimque longitudinali in collo lutea; rectricibus superne viridibus, inferne rubris apice viridi flavicantibus. . . . Psittaca indica varia. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 366. n. 43. Psittacus macrourus luteo viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis. . . Psittacus ornatus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 14. — Lory parakeet. *Edwards Hist. of birds.* tom. IV. pl. 174.

l)

scheint; dieses Rothe, durch welches keine braune Wellen laufen, bemahlt die Kehle, die Vorderseite des Halses, und die Seiten des Angesichts, bis an den Hinterkopf, den es umgiebt; der oberste Theil des Kopfs ist purpurfarben, Edwards giebt ihn blau an; der Rücken, die obere Seite des Halses, der Flügel und der Bauch sind schmaragdgrün; und ein Orangegelb macht an den Seiten des Halses und den Flanken unregelmäßige Flecken; die größten Schwanzfedern sind schwärzlich, und haben am Ende gelbe Franzen; der Schwanz, welcher oberhalb grün ist, scheint an dem Ende roth und gelb gefuttert zu seyn, der Schnabel und die Füße sind weißgrau. Dieser Sittich ist von mittelmäßiger Größe, und ist nur sieben und einen halben Zoll lang; er ist wegen den Glanz und der Austheilung der Farben einer der schönsten; er ist nicht der Avis para-

1) Perruche-Lori. *Buffon Oiseaux* VI. p. 145. (Ed. in 12. Tom XI. p. 202. Perruche variée des Indes orientales. *Buff. Pl. enl.* 552.

Lory Parrakeet. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 221. n. 24. Bor. 2. 94. 16.

Der Loryparakeet. Psittacus minor e coccineo viridis orientalis. Le Lory perowche. Seligmann Vögel VI. tab. 69.

Psittacus (ornatus) macrourus luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis, orbitis cinereis. *Linn Syst. Nat.* XII. 1. p. 143. 19. XIII. 1. p. 324. n. 19. Der Paradiesparkit. Müller Naturfyst. 2. S. 137. tab. 27. fig. 4.

paradisiaca des Seba l), wie es Brisson glaubt, weil, ohne die übrigen Abweichungen zu rechnen, dieser Vogel des Seba, der übrigens sehr schwer unter seine wahre Gattung zu bringen ist, einen ungleich gestuften Schwanz hat.

l) Avis paradisiaca orientalis, vario colore elegantissima. *Seba* Vol. I. p. 95. tab. 60.

Der gelbe Sittich. m) 1)

Sechste Gattung mit lang und ungleichem Schwanze.

Frisch *tab.* 35.

Brisson, der diese Gattung unter dem Namen des angolischen Papagey angiebt, beschreibt ihn nach Frisch; sein ganzes Gefieder ist gelb, ausgenom-

m) Psittacus minor longicaudus, luteo aurantius, superne viridi lutescente varius; oculorum ambitu, lateribus, cruribusque rubris; rectricibus viridiluteſcentibus, tribus utrimque extimis exterius superne caeruleis. . . . Psittaca Angolensis lutea. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 371. 76. Psittacus luteus cauda longa. *Frisch.* tab. 53. — Psittacus croceus, cauda longa, oculis in circulo rubro, extremis remigibus et penna infima caudae caeruleis. *Klein, Av.* p. 25. n. 15. — Psittacus macrourus luteus, alarum tectricibus viridibus, cauda forficata. . . . Psittacus solstitialis. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 7.

1) Perruche jaune. *Buffon Oiseaux.* VI. p. 147. Ed. in 12. tom. XI. p. 204. n. 6.

Perro

Der gelbe Sittich.

S. 148.

Krüger-Jun. del.

Büff. Vögel XIX. Th. Frisch Vögl. t. 33.

nommen der Bauch und der Kreis um die Augen, welche roth sind, und die Schwungfedern nebst einem Theil der Rückenfedern, welche blau sind; die ersten haben in der Mitte eine gelbe Queerbinde; übrigens ist der Schwanz bey Frisch nicht deutlich vorgestellt. Albin, der diesen Sittich auch beschreibt, versichert, daß er sprechen lerne, und obgleich er ihn den Papageyen von Angola nennt, sagt er doch, daß er aus Ostindien komme n).

Perroquet from Angola. *Albin birds* 3. t. 13.

Psittacus aurantius. *Miller illustr.* t. 5. A.

Angola yellow Parot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 224. n. 27.

Der gelbe angolische Papagey. Müller Naturfyst. 2. S. 132. n. 12.

Psittacus (solstitialis) luteus, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, rectricibus lateralibus extus caeruleis. *Linné Syst. Nat.* XII. 1. p. 141. n. 12. XIII. 1. p. 320. n. 12.

Gelber lang = geschwänzter Papagey. Klein Vögel. in 4to. p 26. n. 18. Der safrangelbe. Klein in 8. S. 47. n. 15. Der gelbe langschwänzige Papagey. Halle Vögel. S. 120. n. 43.

n) *Albin* III. p. 6. tab. 13.

Der Sittich mit dem lasurblauen Kopfe. o) 1)

Siebente Gattung mit lang und gleichem Schwanze.

Seligmann *VIII. tab. 82. fig. 2.*

Diesem Sittich, der ohngefähr von der Größe einer Taube ist, ist der Kopf, das Gesicht und die Kehle schön Himmelblau, unter den Flügeln

o) Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatius, inferne dilutius; capite et gutture cyaneis, macula in alis lutea; rectricibus superne caeruleis, subtus obscure luteis. . . . Psittaca cyanocephalos indica. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 129. n. 96. (Ed. in 8. tom. II. p. 155.)

V.

1) Perruche a tete d'azur. *Buffon Ois.* VI. p. 148. Ed. in 12. XI. p. 205. n. 7.

Der blauköpfige Papagey. Psittacus minor capite caeruleo. Seligmann Vögel VIII. tab. 82. fig. 2.

Psittacus Alexandri capite cyaneo. *Linn. Syst. Nat.* XII. 1. p. 142. δ. XIII. 1. p. 321. ε.

Φ.

Der Sittich mit Saffurblauen Kopfe. ♣

S. 130.



Krüger jun. del.

Brüff. Vogel XIX. Th. Seeligm. VIII. t. 82. f. 2.

geln ist er ein wenig gelb; der Schwanz ist blau, gleich gestuft, und so lang als der Körper; das übrige des Gefieders ist grün: dieser Sittich kömmt aus Indien, wie Edwards versichert, der ihn uns bekannt gemacht hat.

V.

Anhang.

Linné rechnete diesen Vogel zu den Alexanderspapagey, oder den großen Sittich mit dem hellrothen Halsbande; er weicht doch in den Farben noch ziemlich davon ab, wenigstens fehlt das Halsband; nach Brisson ist er klein, langgeschwänzt, grün, oben dunkeler, unten heller, am Kopfe und der Kehle himmelblau; auf den Flügeln ist ein gelber Flecken; die Schwungfedern sind unten aschgrau, oben grün, die größern an den äußersten Rändern in das Blaue fallend; die Ruderfedern sind oben blau, unten dunkelgelb; die Augen umgiebt eine nackte, fleischfarbige Haut; die Regenbogenhaut im Auge ist schön pomeranzenfarbig; der Schnabel roth; die Füße und die Nägel sind aschgrau. Briß.

Der Maus Sittich.

S. 133.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 768.

Der Maus-Sittich. 1)

Achte Gattung. Der Mausſittich mit lang und gleich geſtuftem Schwanze.

Buff. pl. enl. 768.

Dieſe Gattung ſcheint neu zu ſeyn, und man kennt ihr Vaterland nicht; vielleicht kann man folgende Anzeige, die aus einer Reiſe nach Isle de France genommen iſt, auf ſie anwenden. „Der grüne Sittich mit der grauen Kapuze, von der Größe eines Sperlings, kann nicht zahm gemacht werden“ p): obgleich dieſer Sittich um ein beträchtliches größer iſt als ein Sperling; ich habe ihm den Namen Mausſittich gegeben, weil ihm ein

1) Perruche ſouris. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 148. Ed. in 12. tom. XI. p. 206.

Perruche a poitrine griſe. *Buff. pl. enl.* n. 768.

Pſittacus (murinus) olivaceus, facie, gula et pectore murinis, remigibus viridibus. *Linné Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 327. n. 80.

p) Voy. a l'ile de France 1772. p. 122.

großes Stück von Mäusegrau die Brust, die Kehle, die Stirne, und das ganze Gesicht bedeckt; das übrige vom Körper ist olivengrün, die großen Schwungfedern ausgenommen, welche stärker grün sind; der Schwanz ist fünf Zoll lang, und der Körper eben so viel; die Füße sind grau; der Schnabel ist weißgrau; das ganze matte und verschossene Gefied r dieses Sittichs giebt ihm ein trauriges Ansehen, und unter allen von seiner Familie ist er am wenigsten prächtig.

V.

Der Sittich mit Knebelbarte.

S. 155

Der Sittich mit Knebelbärten. 1)

Neunte Gattung mit lang und gleichem Schwanze.

Buffon Pl. enl. 517.

Auf der Stirn dieses Sittichs läuft ein schwarzer Streif von einem Auge zum andern, und zwey große Knebelbärte von eben der Farbe laufen von dem Unterschnabel aus, und werden auf den Seiten der Kehle breiter; das übrige des Gesichts ist

1) Perruche a moustaches. *Buffon Ois.* VI. p. 149. Ed. in 12. p. 207. n. 9.

Perruche de Pondichery. *Buffon Pl. enl.* 517.

Psittacus fasciatus. Der Weißkopf. Müller Natursyst. Suppl. S. 74. n. 6. f. (nach Büff.)

Moustacho Parrackeet. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 238. n. 38.

Psittacus (pondicerianus) viridis, fronte striaque a mandibula utrimque ad gulam nigris, facie alba et caeruleſcente, pectore ex purpuraſcente caeruleo, cauda ſubtus ſtraminea. *Linne Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 325. n. 73. α.

ist weiß und bläulich; der Schwanz ist oberhalb grün, und unterhalb blaßgelb; der Rücken ist dunkelgrün; die gelbe Farbe siehet man oben auf den Flügeln, von welchen die Schwungfedern dunkel wassergrün sind; der Bauch und die Brust sind blaßröthlich. Dieser Sittich hat gegen eilf Zoll in der Länge, und die Hälfte davon macht den Schwanz aus; diese Gattung ist noch neu, oder wenigstens noch durch keinen Naturforscher angezeigt worden.

---

1) Perruche à moustaches. Buffon Oi. VI. p. 149. Ed. in 12. p. 207. n. 7.

Perruche de Pondichery. Buffon Pl. enl. 517.

Psittacus (pondicerianus) viridis, fronte flavicante, alis et caeruleoscente, pectore ex purpurascente caeruleo, cauda lutea. Gmelin Syst. Nat. Edit. 1. p. 347. n. 349.

An-

Anhang.

Latham [2]) beschreibt eine Abänderung dieses bartigen Sittichs, an welchem der Kopf von der Schnabelwurzel an bis nach den Augen zu kastanienbraun war; ein graubrauner Strich ging von den Nasenlöchern bis nach den Augen, und er lief von der Kehle schwarz herunter; der Nacken war roth; die Schwungfedern hatten einen blauen Rand, der Schnabel war roth, der Scheitel grün, und die Füße dunkel.

2) Bearded Parrakeet. *Latham Synopf.* I. 1. p. 238. n. 38. A.

Psittacus pondicherianus barbatus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 325. n. 73. β.

Der

Der Sittich mit dem blauen Gesichte. q) 1)

Zehnte Gattung mit langem und gleich gestuftem Schwanze.

a) *Buff. pl. enl.* 61.
b) — — 743.

Der Mantel dieses schönen Sittichs ist grün, und der Kopf wird mit drey Farben bemahlt; an dem Gesicht und der Kehle ist er Indigofarben, am

q) Psittacus minor longicaudus, superne viridis; capite anterius saturate caeruleo; collo superiore torque luteo cincto; collo inferiore et pectore rubro aurantiis, marginibus pennarum saturate caeruleis; ventre supremo saturate viridi, imo ventre viridi luteo, saturate viridi maculato; rectricibus superne splendide, inferne sordide viridibus. . . . Psittaca Amboinensis varia. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 364. n. 72. (Ed. in 8. tom. II. p. 141. n. 72.)

V.

1) Perruche a face bleue. *Buffon Oiseaux* VI. p. 150. a tete bleue. Ed. in 12. XI. p. 208. n. 10.
Perruche d'Amboine. *Buff. Planch. enl.* 61.

Red

Der Sittich mit dem blauen Gesichte. S. 158.

Büff. N. G. d. Vögel XIX. B. v. Büff: fec. Pl. 61.

Der molukkische Sittig. S. 160

Büff. N. G. d. Vögel XIX B. v. Büff. fec. N: 743

am Hinterkopfe braungrün, und darunter gelb; der niedere Theil des Halses und die Brust sind roth mordore, mit braungrün gezeichnet; der Bauch ist grün; der untere Theil des Bauchs aus gelb und grün vermengt, und die Unterseite des Schwanzes ist gelb. Edwards hat bereits diesen Sittich r) mitgetheilt; allein die Abbildung scheint nach einen Vogel gemacht zu seyn, der in Weingeist aufbehalten worden, und dessen Farben verschossen sind; der von uns abgebildete war besser erhalten.

Man

Red breasted Parrukeet. *Edward Gleam.* tab. 232.

Der rothbrüstige Papagey. Psittacus minor indiae orientalis pectore rubro. Seligmann Vögel VII. tab. 17. (nach Edw.)

Psittacus (haematodus) macrourus viridis, pectore rubro, facie caerulea. *Linné Mantiss.* p. 524. Der Blutpapagey. Müller Naturſyst. Suppl. S. 73. 6. b.

Red breasted Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1. 212. n. 14.

Psittacus (haematodus) corpore supra viridi, jugulo et pectore aurantio, pennarum margine caeruleo, abdomine caudaque viridibus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 316. n. 50. α.

Vielleicht sind Büffons molukkische (pl. enl. 743.) und der neuholländische Sittich, Abarten dieses Vogels. Von dem letztern werde ich Browns Beschreibung hier anhängen.

O.

r) Red breasted parrakeet. *Edw. Glean.* p. 45. tab. 232.

O.

Man findet diesen Sittich in Amboina; ich zähle als eine bloße Spielart oder wenigstens als eine sehr nahe verwandte Gattung, den molukkischen Sittich p. 743. hieher, dessen Größe und Hauptfarben mit diesem seine einerley sind; nur daß der ganze Kopf Indigoblau ist, und daß er einen Flecken von dieser Farbe auf dem Bauch hat; das Aurorenrothe auf der Brust hat keine Wellen, sondern ist mit Gelb vermengt [2]); diese Abweichungen sind nicht wichtig genug, um verschiedene Gattungen aus ihnen zu machen; der Schwanz dieser Sittiche ist eben so lang als der Körper; die ganze Länge dieser Vögel beträgt zehn Zoll; ihr Schnabel ist röthlich weiß.

2) Perruche de Moluques. *Buffon Oiſ.* VI. p. 150. Ed. in 12. tom. XI. p. 209. *Buff. Pl. enl.* 743.

Pſittacus haematodus moluccanus. *Linne Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 316. 50. β.

Der Blaubäuchige Papageÿ. *S.161.*

Buff. Vög. XIX B. *With Voÿ.*

Der blaubäuchige Papagey. 3)

Er ist funfzehn Zoll lang; der Schnabel röthlich; der Kopf und Hals dunkelblau, mit schön untergemischten, kleinen, hellblauen Federn; der Augenkreiß ist schwarz; der Hals ist an der Kehle gelblich grün, und hinten grün; die Brust roth mit gelb gemischt; der Bauch schön blau; die Dickbeine grün und gelb; der Rücken und die Flügel grün, die ersten Schwungfedern dunkelbraun mit gelben Binden; der Schwanz ist keilförmig; die mittelsten längsten Ruderfedern sind grün, die übrigen grün, und an der äußern Seite gelb gesäumt; die Beine sind dunkelgraubraun; sein Aufenthalt ist in Südwales, in Neuholland, und häufig in der Botanybay. Joseph **Banks** hat ihn zuerst nach Europa gebracht. **Brown.**

With führt ihn unter den Vögeln von Südwales an, und in der neuen Ausgabe des Linnéischen

3) The blue-bellied Parrot. Psittacus novae hollandiae, Banks. *Brown illustr.* p. 14. tab. 7. With S. Wales. p. 140. t. 4.

schen Systems steht er als eine Abart unter dem Sittiche mit blauem Gesichte 4).

4) Plittacus haematotus novae hollandiae. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 316. n. 50. γ.

Der Sittich mit verbrämten Flügeln.

S. 163.

Büff Vögel XIX Th. v. Büff. fol. Pl. 287.

Der Sittich mit verbrämten Flügeln.

S. 163.

Brüff Vögel XIX Th. v. Brüff. fol. Pl. 287.

Der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde.

S. 165.



Der Sittich mit den verbrämten Flügeln. 1)

Eilfte Gattung mit lang und gleich gestuftem Schwanze.

Buff. Pl. enl. 287.

Der auf der illuminirten Platte, Nr. 287. unter dem Namen des luconischen Papageyes vorgestellte Vogel, sollte lieber Sittich heißen, weil er einen langen und gestuften Schwanz hat; seine Flügel sind blau, gelb, und orangenfarben; die erste Farbe nimmt die Mitte der Federn ein; die zwey andern machen ihre Einfassung aus; die großen Schwungfedern sind olivenbraun, diese Farbe ist die Farbe des ganzen Körpers, eine bläuliche Platte hinten am Kopf ausgenommen; dieser

1) Perruche aux ailes chamarées. *Buffon Oiſ.* VI. p. 151. (Ed. in 12. tom. XI. p. 210. n. 11. Perroquet de l'isle de Lucon. *Buff. Pl. enl.* 287. Lave winged Parrakeet. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 244. n. 42.

Pſittacus olivaceus occipitis macula caeruleſcente, alis ex caeruleo, viridi et aurantio variis, *Linn. Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 326. n. 76.

Sittich ist etwas mehr als eilf Zoll lang; der Schwanz macht mehr als das Drittheil dieser ganzen Länge aus, indessen ist auch der Flügel sehr lang, und bedeckt beynahe die Hälfte des Schwanzes, welches man bey den übrigen Sittichen nicht findet, welche überhaupt weit kürzere Flügel haben. Wir gehen jetzt zu der Erzählung der Sittiche der alten Welt über, welche ebenfalls einen langen oder ungleich gestuften Schwanz haben.

Sittiche mit langem und ungleichem Schwanze aus der alten Welt.

Der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde. a)

Erste Gattung mit langem und ungleichem Schwanze.

Buff. pl. enl. 551.

Weit entfernt, daß dieser Sittich der neuen Welt eigen zu seyn scheinen sollte, wie Brisson sagt, ist er vielmehr in derselben ganz fremde;

a) Psittacus minor longicaudus, dilute viridis, ad flavum inclinans, gutture nigro; torque roseo; rectricibus binis intermediis, viridi caeruleis; duabus utrimque proximis exterius et apice viridi caeruleis, interius viridi luteis, tribus utrimque extimis viridi luteis. . . . Psittaca torquata. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 323. Ed. in 8. tom. II. p. 321. n. 55.

man findet ihn in verschiedenen Theilen von Afrika. Man sieht ihn mit den ethiopischen Caravanen zu Cairo in großer Menge ankommen. Die Schiffe, welche von Senegal oder Guinea abgehen, wo dieser Sittich ebenfalls gemein ist, bringen nebst den Negern eine große Menge mit auf die amerikanischen Inseln; auf dem festen lande von Amerika, trifft man keinen von diesen Sittichen an, man siehet sie bloß auf St. Domingo, Martinique, Guadeloupe u. s. w., wo die Schiffe aus Afrika beständig anlanden, statt daß auf Cayenne, wo nur sehr selten Negerschiffe ankommen, man diese Sittiche nicht kennt b). Alle diese Thatsachen, welche

Psittacus Alexandri torque roseo. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 321. 14. *β.*

Perruche a collier couleur de rose. *Buffon Oiseaux* VI. p. 152. Ed. in 12. XI. p. 212. n. 1. *Pl. enl.* 551.

O.

b) Die große Aehnlichkeit mit dem Sittich auf der 550 ausgemalten Kupferplatte (dem Scincialo P. rufirostris) und diesem Vogel, würde uns geneigt gemacht haben, auf ihn eben die Gründe anzuwenden, und diese beyden Arten als nahe Nachbaren, oder gar als eine Art anzusehen; aber das Ansehen eines Naturkündigers als Marcgravs, erlaubt uns nicht zu glauben, daß er ihn als einheimisch in Brasilien angegeben hätte, wenn er nur dahin gebracht worden wäre. Wir halten uns daher genöthigt, ohngeachtet ihrer Aehnlichkeit, den Scincialo als verschieden von dem Sittich mit dem rosenrothen Halsbande und sie als getrennete Arten anzusehen.

V.

Diese

welche uns von einem vortreflichen Beobachter versichert worden sind, beweisen, daß dieser Sittich nicht aus Amerika ist, wie Brisson sagt.

Allein das sonderbarste ist, daß zu gleicher Zeit, da dieser Verfasser unsern Sittich nach Amerika versetzt, er ihn für den Papagey der Alten, den Psittacus torquatus macrourus antiquorum des Aldrovande ausgiebt; als wenn die alten Griechen und Römer ihre Papageyen in der neuen Welt gehohlt hätten; über dieses ist noch ein Irrthum; dieser Sittich mit dem Halsbande ist nicht der Papagey der Alten, den Aldrovand beschrieben hat; man muß denselben in dem großen Sittich mit dem Halsbande, der ersten Gattung mit langem, und gleich gestuften Schwanze suchen, wie wir in der Abtheilung, wo von demselben gehandelt ward, bewiesen haben.

Der Sittich mit der Halsbinde, welchen wir jetzt beschreiben, ist vierzehn Zoll lang, aber von

Dieser Vogel hat doch so viele Aehnlichkeit mit dem Papagey der Alten oder des Alexanders (pl. enl. 642), daß Brisson ihn wohl für eine bloße Abart desselben ansehen konnte, so wie solches auch von Herrn Gmelin in der dreyzehnten Ausgabe des Linneischen Systems geschehen ist. Beyde haben Schwarzes an der Kehle, einen rothen Schnabel, rothen Ring um den Hals. Hauptsächlich unterscheiden diesen Sittich mit rosenrothem Halsbande die beyden mittelsten langen Ruderfedern, welche aber wahrscheinlich bey vielen Vögeln von derselben Art nicht so lang seyn werden, wie man solches bey den Rackern, Coracius und andern Vögeln siehet.

dieser Länge macht der Schwanz, und seine zwey lange mittlere Federn beynahe zwey Drittheile aus; diese zwey mittlere Federn sind aquamarinblau; alles übrige, das ganze Gefieder ist hell und sanft grün, welches (Grün) auf den Schwungfedern etwas lebhafter wird, und auf den Schwanzfedern mit Gelb vermengt ist; ein kleines rosenfarbnes Halsband umgiebt den Hintertheil des Halses, und stößt an die schwarze Farbe der Kehle; eine bläuliche Tinte ist auf die Federn des Nackens hingeworfen, welche auf die Halsbinde herabfallen; der Schnabel ist braunroth c).

c) Brisson macht aus dem Sittich mit dem Halsbande aus Indien (Psittaca indica torquata n. 56. *Albin* 2. t. 18.) eine zweyte Art. Wahrscheinlich, weil er sich in dem Vaterlande des ersten geirret hat, und nach einer einzigen Figur des Albins, von der man glauben kann, daß das Unrichtige darin die einzigen Unterschiede ausmachen. Wir ordnen sie ohne Anstand zu der vorigen Art.

v.

Dieser Sittich mit dem Halsbande aus Indien des Brisson (IV. p. 326. n 56.) steht in dem Linneischen System auch bey dem Sittich mit rosenrothem Halsbande, aber beyde als Abarten des grossen Sittichs mit hellrothem Halsbande. *Psittacus Alexandri.*

v.

Der kleine Sittich mit dem rosenrothen.
Kopfe und den langen Schwanzfedern

Der kleine Sittich mit dem rosenrothen Kopfe und den langen Schwanzfedern. d) [1])

Zweyte Gattung mit langem ungleichem Schwanze.

Buff. pl. enl. 888.

Dieser kleine Sittich, dessen Körper nicht über vier Zoll lang ist, hat zwölf, wenn man ihn bis an das Ende der zwey langen Spitzen, mit welchen

d) Rose-headet ring parraket. *Edwards, Glan. pl.* 233.

Petit Perroquet de Bengale. *Albin* III. tab. 14. Psittacus sub mento niger, capite rnbro; cervice purpurea; inferiore mandibula nigra, superiore crocea; pedibus caeruleis. *Klein Avi.* p. 25. n. 25. teutsch p. 48. — Psittacus minor longicaudus viridis, inferne ad flavum inclinans; vertice roseo; occipitio caeruleo; gutture et torque nigris, macula in alis obscure rubra; rectricibus superne caeruleis, interne obscure flavicantibus. *Briss. Orithol.*

chen die zwey mittlere Schwanzfedern aufhören, mißt; die lange Federn sind blau, das übrige des Schwanzes, welches nur zwey und einen halben Zoll beträgt, ist olivengrün, und dieses ist auch die Farbe von der ganzen Unterseite des Körpers, und sogar von der obern, wo sie nur etwas stärker und satter ist; einige rothe Federchen stehen oben auf dem Flügel heraus, der Kopf ist rosenfarben, und mit Lilas

Ornithol. tom. IV. p. 348. (Ed. in 8. tom. II. p. 137. n. 66.

V.

1) Petite perruche a tete couleur de rose a longs brins. *Buffon Oiseaux.* VI. p. 154. Ed. in 12. XI. p. 215. n. 2. Perruche de Mahé. *Buffon pl. enl.* 888.

Perruche a tete rouge de l'isle de Luçon. *Sonnerat voy. Gu.* p. 79. tab. 42.

Rose headed ring Parrakeet. *Latham* Synopf. I. 1. p. 239. n. 39. A.

Psittacus (erythrocephalus bengalensis) vertice genisque roseis occipite rectricibusque duabus intermediis supra totis, reliquis margine caeruleis. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 325. n. 74. β.

Der rosenköpfige Ringpapagey. Psittacus minor torquatus capite roseo. Seligmann Vögel VII. t. 18.

Im Linneischen System ist es eine Abart von dem rothköpfigen Sittich. pl. enl. 264.

Das kleine Bengalerpapageychen. Halle p. 130. n. 68.

O.

lilas vermischt, und diese Farbe ist mit einem schwarzen Bande eingefaßt, welches an der Kehle anfängt, und um den Hals gehet. **Edwards**, welcher mit Bewunderung von der Schönheit dieses Sittichs redet e), sagt: die Indianer in Bengalen, wo er sich aufhält, nennen ihn Fridytarah. Mit Recht beschwert er sich über die Fehler in der Abbildung, die **Albin** mittheilet, zumal über den, daß er dem Vogel nur vier Schwungfedern giebt.

e) *Glean.* p. 47.

Der große Sittich mit den langen Schwanzspitzen. 1)

Dritte Gattung mit lang und ungleichem Schwanze.

Buff. pl. enl. 887.

Die Aehnlichkeiten in Absicht der Farben zwischen diesen und den vorhergehenden Sittich sind groß genug, daß man sie für einerley Gattung ansehen könnte, wenn der Unterschied der Größe nicht beträchtlich wäre; dieser hier ist 16 Zoll lang, die

1) Grand Perruche a longs brins. *Buffon Oiseaux* VI. p 155. Ed in 12. XI. p. 217. n. 3. Perruche de Malac. *Buffon pl. enl.* 887.

Malacca Parrakeet. *Latham Synopf.* I. 1. p. 241. n. 39 C.

Pfittacns (erythrocephalus malaccenfis) colore magis in flavum vergente, area oculorum et occipite rofeis. *Linne* Syft. XIII. 1. p. 325. n. 74. δ.

Er wird hier als eine Abart des vorigen angesehen.

Der grosse Sittich mit den langen Schwanzspitzen.

S. 172.



Büff Vögel XIX. Th. v. Büff fec. Pl 287

die zwey Schwanzfedern mitgemessen, und so sind auch seine übrige Ausmessungen verhältnißmäßig größer; die langen Schwanzfedern sind blau, wie bey der vorigen Gattung; der Schwanz ist ebenfalls olivengrün, aber dunkler, und hat mit den Flügeln einerley Tinte, mitten auf den Flügeln erscheinet ein wenig Blau; alles Grüne des Körpers fällt sehr ins Gelbliche, der ganze Kopf ist nicht rosenfarb, sondern nur die Gegend um die Augen und der Hinterkopf, das übrige ist grün, auch hat er kein schwarzes Band, welches die Mütze des Kopfes einfaßt.

Der große Sittich mit röthlichen Flügeln. f) 1)

Vierte Gattung mit langtm und ungleichem Schwanze.

Buff. Pl. enl. 239.

Dieser Sittich hat bis ans Ende der langen Schwanzspitzen zwanzig Zoll; die ganze Oberseite des Körpers ist dunkelolivengrün, und die

f) Pſittacur minor longicaudus, viridis, inferne ad flavum inclinans; pauco rubro obſcuro in dorſo mixto, gutture et collo inferiore non nihil ad cinereum vergentibus; rectricibus alarum ſuperioribus minoribus corpori finitimis obſcure rnbris; rectricibus ſubtus pallide luteis, ſuperne binis intermediis dilute viridibus, tribus utrimque proximis exterius dilute viridibus, interius viridi luteis, binis utrimque extimis viridi luteis . . . Pſittaca Ginginiana. *Briſſon Ornithol.* tom. IV. p. 343, t. 29. f. 1. Ed. in 8. tom. II. p. 136. n. 64.

V.

1) Grand Perruche à ailes rougeatres. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 156. Ed. in 12. XI. p. 218. n. 4.

Per-

Der grosse Sittich mit röthlichen Flügeln

S. 174.

Brüff Vögel XIX. Th. v. Brüff. fol. Pl. 239.

die Unterseite blaßgrün, mit gelblich vermengt; er hat auf jeder Schulter einen rosenrothen Flecken, und mitten auf den langen Ruderfedern im Schwanze ein schwaches Blau. Der Schnabel ist roth, wie auch die Füße und die Nägel; (letztere nennet **Brisson** aschgraulich).

Perruche de Gingi. *Buffon pl. enl.* 239.

Gingi Parrot. *Latham Synopſ.* I. 1. p. 209. n. 10.

Pſittacus (Eupatria) viridis genis nudis, humeris coccineis, roſtro purpuraſcente. *Linne Syſt. Nat.* XII. 1. p. 140. 7 XIII. 1. p. 315. n 7. Die Edeldame. Müller Naturſyſt. 2. S. 130.

Der Sittich mit der rothen Kehle. g) 1)

Fünfte Gattung mit langem und ungleichem Schwanze.

Edwards, welcher diesen Vogel beschrieben hat, sagt: er sey der kleinste Sittich mit langem Schwanze, den er gesehen habe; er ist wirklich nicht

g) Little-red-winged Parraket. *Edwards Glean.* p. 53. tab .236.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatius, inferne dilutius et ad flavum inclinans; gutture coccineo; rectricibus alarum superioribus; rectricibus saturate viridibus. . . . Psittaca indica. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 341. n. 63.

V.

1) Perruche a gorge rouge. *Buffon Oiseaux* VI. p. 157. Ed. in 12. XI. p. 219. n. 5.

Latham Synops. I. 1. p. 246. n. 46.

Der kleine Papagey mit rothen Flügeln. Psittacus minor cauda longissima viridis et ruber. Seligmann Vögel VII. t. 24.

Psittacus (incarnatus) viridis rostro pedibus et unguibus incarnatis, cera orbitisque albidis, gula tectricibusque alarum rubris. *Linne Syst.* Nat. XIII. 1. p. 327. n. 79.

O.

Der Sittich mit rother Kehle.

S. 176.

Krüger jun. del.

Büff. Vögel XIX. Th. Seeligm. VII. t. 24.

nicht größer als eine Meise, aber sein Schwanz ist länger als sein Körper; der Rücken und der Schwanz haben eine grobe grüne Farbe; die Deckfedern der Flügel und die Kehle sind roth; die Unterseite des Körpers ist gelblich grün; die Regenbogenhaut im Auge ist so dunkel, daß sie schwarz scheint, da die meisten Papageyen einen goldfarbenen Regenbogen haben. Man wollte **Edwards** versichern, daß er aus Indien komme.

Der große Sittich mit der schwarzen Kopfbinde. h) i)

Sechste Gattung mit lang und ungleichem Schwanze.

Seba I. p. 63. f. 4.

Der Vogel, den Brisson unter dem Namen des molukkischen Ara anführt, ist gewiß nichts weiter als ein Sittich; weil man weiß, daß es weder in Ostindien, noch in einem Theil der alten Welt Aras giebt. Seba nennt diesen Vogel ein lori z); allein er ist eben so wenig ein lori als ein Aras,

h) Psittacus major longicaudus, superne saturate cyaneus, inferne saturate viridi, rubro variegatus; capite superiore nigro, collo superiore torque viridi et rubro cincto; collo inferiore et pectore dilute rubris; rectricibus superne viridibus, subtus rubris, marginibus nigricantibus. . . . Ara Moluccensis varia. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 197. n. 5. (Ed. in 8. tom. II. p. 97. 5.)

V.

i) Grande perruche a bandeau noir. *Buffon Oiseaux* VI. p. 158. Ed. in 12. XI. p. 220. 6.

Der grosse Sittich mit schwarzer Kopfbinde.

S. 178.

Büff. Vögel. 19 B.

Seba. Thes. t. 38. f. 4.

Aras, und die langen Federn seines Schwanzes lassen keinen Zweifel übrig, daß man ihn nicht sollte unter die Sittiche zählen dürfen. Die ganze länge dieses Vogels beträgt ohngefähr 14 Zoll, wovon der Schwanz beynahe 7 ausmacht. Sein Kopf trägt eine schwarze Binde, und der Hals einen roth und grünen Kragen, die Brust ist schön hellroth; die Flügel und der Rücken sind reich türkisblau; der Bauch ist dunkelgrün, und mit rothen Federn besäet; der Schwanz, dessen mittlere Federn die größten sind, ist grün und roth gefärbt mit schwarzen Einfassungen. Dieser Vogel ist, wie Seba sagt, von den Papuinseln gekommen, ein Holländer in Amboina hat ihn von einem Indianer um fünfhundert Gulden gekauft. Dieser Preis, fährt er fort, war gegen die Schönheit und Artigkeit dieses Vogels nicht zu hoch; er sprach verschiedene Worte in verschiedenen Sprachen deutlich aus, bot einen guten Morgen, und sang ein Lied;

i) Psittacus orientalis, exquisitus, Loeri dictus. *Seba Thes.* Vol. I. p. 63. tab. 38. fig. 4. — Psittacus capite nigro, collari viridi, Loeri dictus. *Klein, Avi.* p. 25. n. 16. Papagey mit dem schwarzen Kopfe. Klein Ord. S. 47. n. 16. in 4to S. 26. n. 20.)

v.

Psittacus (atricapillus) supra caeruleus, gula, jugulo pectoreque rubris, abdomine crissoque viridibus, vertice nigro, torque viridi et rubro. *Linne Syst. Nat.* XIII. 1. p. 317. n. 55.

Der blaubunte orientalische Papagey. Halle Vögel 121. n. 45.

seine Zuneigung war gleich seiner Artigkeit, denn da er seinen Herrn verlohren hatte, starb er für Kummer k).

k) Der Uebersetzer des Seba legt ihm fünf Zehe bey, wovon im Text kein Wort steht, aber die Abbildung stellt die Füße auf eine andere Art unrichtig vor, da sie vorn drey und hinten einen Zee hat.

Der grün und rothe Sittich. 1) 1)

Siebente Gattung mit langen und ungleichem Schwanze.

Diese Gattung ist von Brisson unter der Benennung des japanischen Sittichs mitgetheilt worden; aber man trifft auf dieser Insel eben so we-

1) Psittacus erythrochlorus macrourus. *Aldrovande, Av.* tom. I. p. 678. — *Willughby, Ornithol.* p. 77. — *Ray, Synopf.* p. 34. n. 3. — *Charleton Exercit.* p. 74. n. 11. Idem *Onomaft.* p. 67. n. 11. — Psittacus minor longicaudus, fuperne viridis, inferne ruber; gutture ferrugineo ad fubrubrum vergente; macula utrimque ante et pone oculos caerulea; remigibus intenfe caeruleis; rectricibus intermediis viridibus, lateralibus rubris . . . Pfittaca laponenfis. *Briff. Ornithol.* tom. IV. p. 362. (n. 71).

V.

1) Perruche verte et rouge. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 159. (Ed. in 12. XI. p. 222. n. 7.
laponeſe Parrot. *Latham Synopf.* I. 1. p. 209. n. 11.

Pfittacus (japonicus) viridis, fubtus rectricibusque lateralibus ruber, remigibus caeruleis. *Linne Syft. Nat.* XII 1. p. 141. 8 XIII 1. p. 315. 8. Der japaniſche Papagey. Müller Naturſyſt. 2. p 131. n. 8.

nig als in den nordischen Provinzen von China andere Papageyen an, als solche, welche dahin gebracht worden sind m), und wahrscheinlicherweise kam dieser vorgebliche japanische Sittich, von welchem Aldrovand nur die Abbildung gesehen hat, aus einem andern mittäglichern Theil von Asien. Willughby merkt sogar an, daß diese Abbildung und die Beschreibung, die ihr beygefügt ist, verdächtig scheine: es mag nun damit seyn wie es will, so stellt Aldrovand das Gefieder dieses Sittichs als ein Gemische von Grün, Roth, und ein wenig Blau vor; die erste dieser Farben herrschet auf der Oberseite des Körpers, die zweyte bemahlet die Unterseite und den Schwanz, die zwey langen Federspitzen ausgenommen, welche grün sind; das Blaue färbt die Schultern und die Schwungfedern; auch findet man zwey Flecken von eben dieser Farbe an jeder Seite des Auges.

m) *Kaempf.* tom. I. p. 113.

Der

Der gehaubte Sittich. n)

Achte Gattung mit langen und ungleichem Schwanze.

Dieses ist der kleine Papagey des **Bontius** o); dessen Gefieder **Willughby** in Absicht auf Glanz und Mannigfaltigkeit der Farbe rühmt,

n) Psittacus minor longicaudus, cristatus, coccineus; gutture griseo; collo inferiore et pectore dilute roseis; remigibus viridibus, luteo et roseo colore variis, rectricibus binis intermediis coccineis lateralibus dilute roseis apice caeruleis, viridi mixtis. . . . Psittaca lavensis, cristata coccinea, *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 381. (n. 80).

V.

o) Psittacus parvus. *Bont. Ind. orient.* p. 63. — Psittacus parvus Bontii. *Willughby Ornithol.* p. 81. — *Ray Synops.* p. 25. n. 5.

V.

Perruche huppée. *Buff. Ois.* VI. p. 160. Ed. in 12. XI. p. 224.

Crested red Parrakeet. *Lath. Synops.* I. 1. p. 223. n. 25.

Psittacus (javanicus) coccineus orbitis nudis argenteis, capite cristato, gula grisea, jugulo et pectore

welche, wie er sagt, ein Pinsel schwerlich in ihrem Schimmer und ihrer Schönheit erreichen würde. Sie besteht aus lebhaft Roth, Rosenfarbe, gemischt mit Gelb und Grün auf den Flügeln; mit Gelb und Blau auf dem Schwanze; dieser ist sehr lang, zehn Zoll länger als die zusammengelegten Flügel, welches eine große Länge für einen Vogel ausmacht, der ohngefähr so groß als eine Lerche ist.

Dieser Sittich hebt sein Gefieder auf dem Kopfe, in Gestalt eines Zopfs in die Höhe, der sehr schön seyn muß, weil man ihn mit dem Federbusche des Pfauen in folgender Nachricht, die sich auf ihn zu beziehen scheint, verglichen hat. „Dieser Sittich ist nur so dick als ein Zeisig, auf dem Kopfe hat er einen Federbusch von drey bis vier kleinen Federn, beynahe wie der Federbusch eines Pfauen; dieser Vogel ist allerliebst artig“ p). Diese kleinen Sittiche finden sich auf Java, im Innern des Landes; sie fliegen schaarenweise, und machen dabey einen großen Lärm; sie sind scherzhaft, und wenn sie gezähmt sind, sprechen sie leicht nach, was man sie lehrt q).

pectore roseis, humeris et alis ex rubro et viridi mistis, rectricibus duabus intermediis coccineis, reliquis roseis viridi mixtis apice caeruleo. *Linné Syst. Nat.* XIII. a Gmel. I. p. 319. n. 64.

p) *Lettres edifiantes*, second recueil. p. 60.

q) *Willughby Ornithol.* p. 81.

Die Sittiche mit kurzem Schwanze aus der alten Welt.

Es giebt eine große Menge von diesen Sittichen in dem mittäglichen Asien und in Afrika; sie unterscheiden sich von den amerikanischen Sittichen; und wenn man einige davon in dieser neuen Welt findet, die denen aus der alten gleich sehen, so sind sie wahrscheinlich dahin übergebracht worden; um sie durch einen generischen Namen von einander zu scheiden, habe ich die aus der alten Welt perruches, und die aus der neuen perriches genannt. Uebrigens sind die Arten der Sittiche mit kurzem Schwanze in der alten Welt weit zahlreicher als in der neuen; auch sind einige ihrer natürlichen Gewohnheiten eben so unterschieden als ihr Klima; einige z. B. schlafen mit unter sich gekehrtem Kopf und über sich gekehrten Füßen, indem sie sich an einen kleinen Baum anklammern, welches die amerikanischen nicht thun. Ueberhaupt machen alle Papageyen der neuen Welt ihre Nester in hohle Bäume, und besonders in die Löcher, die von den Spechten, die man auf den Inseln Zimmermann

(Charpentiers) nennt a), verlassen worden sind. In der alten Welt hingegen, wie viele Reisebeschreiber versichern, hängen verschiedene Gattungen von Papageyen ihre Nester, die sie aus Binsen und Wurzeln verfertigen, an das Ende beweglicher Baumzweige auf b); diese verschiedene Art zu nisten, wenn sie einer großen Anzahl von Gattungen wirklich eigen ist, könnte von dem verschiedenen Eindruck des Klima angegeben seyn. In Amerika, wo die Hitze niemals ausnehmend ist, muß sie in einem kleinen Raum zusammengehalten werden; und unter der brennenden Zone von Afrika erhält das aufgehängte Nest, durch die Winde die es wiegen, eine Kühlung, die ihm vielleicht nothwendig ist.

a) Lory versichert ausdrücklich, daß die amerikanischen Papageyen ihr Nest nicht aufhängen, sondern in den Baumhöhlen machen. In *Clusii Auct.* p. 364.
V.

b) Cadamosto Hist. generale des Voyages. tom. II. p. 305. Voyage de Madagascar p. Fr. *Cauche.* Paris 1651.
V.

Der Sittich mit dem blauen Kopfe.

S. 187.

Büff. Vögel. 19 B. Büff. Fol. Pl. 190. f. 2.

Der Sittich mit dem blauen Kopfe. c) 1)

Erste Gattung mit kurzem Schwanz.

Pl. enl. 190. fig. 2.

Dieser Vogel ist an dem obersten Theil des Kopfs schön blau, auf der Oberseite des Halses hat er ein halbes orangenfarbenes Halsband; die Brust und

c) Sapphire crownet parrakets. Perrique couronnée de Saphir. *Edwards Gleau.* p. 177. pl. 293. n. 1.

Saphirgekrönter Papagey. Pſittacus minor vertice ſaphirino. Seligmann Vögel VIII. tab. 83. f. 1. (nach Edw.)

— Pſittacus brachyurus viridis, uropygio pectoreque coccineis vertice caeruleo. . . . Pſittacus Galgulus. *Linne Syſt. Nat.* ed. XII. p. 150. (XIII. 1. p. 349. n. 46.)

V.

1) La Perruche a tete bleue. *Buffon Oiſ.* VI. p. 163. Ed. in 12. XI. p. 228. n. 1.

Petite Perruche de Perou. *Buff. pl. enl.* 190. fig. 2.

Avicula

und der Steis sind roth, und das übrige Gefieder ist grün. Edwards sagt: man habe ihm diesen Vogel aus Sumatra geschickt. Herr Sonnerat d) hat ihn auf der Insel Lucon gefunden, und es ist aus Irrthum geschehen, daß er auf den illuminirten Platten den Namen eines Pernauers bekommen hat, denn man hat alle Ursache zu glauben, daß er in Amerika nicht anzutreffen ist. Diese Gattung gehört unter die, welche mit unter sich gekehrtem Kopfe schlafen 2); sie nährt sich vom Callou

Avicula Cechini. *Aldrov. orn.* 1. 20. p. 560?

Psittacus Galgulus. *Linne Amoen. acad.* 4. p. 236. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 16. Osbecks Reise 101.

Der Hangvogel. Müller Natursyst. 2. p. 149. n. 46.

Petite Perruche de l'isle de Luçon. *Sonnerat Voy. a la nouvelle Guinée.* p. 76. *Latham* Synops. I. 1. p. 312. n. 119. A.

O.

d) *Sonnerat Voy. a la nouvelle Guinée.* p. 76.

2) Linné und Odhelius beschreiben diesen Vogel, welcher in der Lagerströmischen Sammlung war, übereinstimmend mit der Büffonschen Abbildung folgendermaßen:

Psittacus Galgulus. — Corpus magnitudine passeris, capite, collo, dorso, abdomine, femoribus, alis, cauda viridibus Rostrum plumbeum, figura ut in congeneribus; vertex capitis macula rotunda cyanea notatus. Pectus ante sternum macula rotunda coccinea saturatissima ornatum. Uropygium

lou, einer Art von weißen Safte, den man in Ostindien aus dem Cocusbaum ziehet, wenn man die Köpfe des Kammes abschneidet, an dem die Frucht hängt. Die Indianer hängen einen solchen

gium pennis coccineis, longitudine fere caudae, tectum. Remiges virides, immaculatae, lateribus occultatis magis fuscescentibus Cauda breviſſima, rotundata, virescens. Pedes pallidi figura ut in congeneribus.

Mira et singularis admodum proprietas hujus aviculae, quod dum somnum capit, suspendat se pendulam omnino, alteroque pede, sub ramo, ne aves rapaces nocturnae hanc facile observent et sic a natura conservatur. *Am.* ac. l. c.

Eben so ist der Vogel in der königl. Sammlung beschrieben, aber die Flügel werden da blau genannt. *Mus. Ad. Frid.* a. a. O.

In dem Anhange zu dem System heißen die Schwungfedern bis auf den äußersten Rand blau, und die Ruderfedern unten bläulich, und es wird bemerkt, daß nur das Männchen, aber nicht das Weibchen den blauen Scheitel und die blutrothe Gurgel habe. *Linne Syst. Nat.* XII. Pars III. p. 228.

Linné rechnet auch den kleinsten grün und rothen indianischen Papagey des Edwards (p. 6. tab 6.) hieher, von dem Graf Büffon aber vermuthet, daß er zu dem folgenden Sittich mit dem rothen Kopfe oder dem guineischen Sperling gehöre. Der pomeranzenrothe Scheitel macht solches auch ehe glaublich, als daß er hieher gehöre.

Der Couliassi ist als eine Abart auch hieher gerechnet worden; Graf Buffon zählt ihn als eine besondere Art auf (n. 3.)

chen Bambus an das Ende des Astes, um diesen Saft aufzufangen, welcher sehr angenehm ist, ehe er in Gährung gehet, und beynahe den Geschmack von Cider oder jungen Obstwein hat. Es scheint nur, daß man den, von Aldrovand e) angezeigten Vogel zu dieser Gattung zählen kann. Bey diesem Vogel (des Aldrovand) ist das oberste auf dem Kopf blau, der Steis roth, und das übrige Gefieder grün; da aber dieser Naturforscher weder der Halsbinde, noch des Rothen auf der Brust erwähnt, und da er außerdem sagt: er komme von Malacca; so könnte dieser Vogel auch von einer andern, mit dieser aber sehr verwandten Gattung seyn.

e) Avicula ex Malaca insula, seu Psittacus minimus. *Aldrovande*, *Avi.* tom. III. p. 560. — Psittacus minor brevicaudus, viridis; vertice cyaneo; rectricibus caudae superioribus coccineis; rectricibus viridibus. . . . Psittacula Malaccensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 386. (n. 84.)

Der kleine grün und rothe Sittich. S. 191.

Büff: Vögel. XIX B. Seeligm: I. t: II.

Der Sittich mit dem rothen kopfe. S.191.



Düff: Vögel. XIX B. Düff. Fol: Pl. 60.

Der Sittich mit dem rothen Kopfe, oder der guineiſche Sperling. f) 1)

Zweyte Gattung mit kurzem Schwanze.

a) *Buff. Pl. enl.* 60.

b) *Edw.* tab. 6.

Seligm. I. tab. II. f. 1.

Dieſer Sittich iſt bey den Vogelhändlern unter den Namen des guineiſchen Sperlings bekannt g); er iſt in der Gegend ſehr gemein, von welcher

f) Pſittacus minimus. *Cluſius Exot. auctuar.* p. 365. — *Euſeb. Nieremberg* p. 227. — Pſittacus puſillus viridis Aethiopicus *Cluſii. Ray Synopſ. Avi.* p. 31. Petit Perroquet vert des Indes orientales. *Albin.* tom. III. p. 7. mit einer ſchlechten Abbildung. tab. 15.

(Der allerkleinſte grüne Papagey mit rother Stirn und Kehle. Klein Ord. d. V. v. B. S 48. n. 21.)

— Pſittacus viridis minimus fronte et gula rubris. *Klein, Avi.* p. 25. n. 21. — Pſittacus minimus viridis cum fronte et gula rubra. *Friſch pl.* 54. — Little red-headed parraket, or guiney ſparrow.

welcher er oft wegen der Schönheit seines Gefie-
ders, und seiner Geselligkeit und Artigkeit nach
Europa

sparrow. Petite Perruche a tete rouge ou le Moineau de Guinée. *Edwards Glean.* p. 54 mit einer guten ausgemahlten Abbildung. tab. 237.

— Psittacus minor brevicaudus, viridis superne saturatius, inferne dilutius; capite anterius et gutture rubris; uropygio cyaneo; rectricibus viridibus, lateribus taeniis transversis, alia coccinea, altera nigra notatis. . . . Psittacula Guinensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 387. (n. 85.) Peruche de lava. *Salerne, Ornithol* p. 72. — Psittacus brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. . . . Psittacus pullarius. *Linne Syst. Nat.* ed. XII. p. 149. (XIII. 1. p. 348. n. 45.)

v.

1) Der kleinste grüne Papagey aus Ostindien. Psittacus minimus viridis indicus. Alb. Seligmann Vögel I. tab. XI. fig. 2.

Psittacus (pullarius) brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra. *Linne Mus. Ad. Frid.* II. p. 15. *Scopoli Ann.* I. p. 33 n. 34.

Der kleinste grüne Papagey mit rother Stirn und Kehle. Scopoli Günther S. 28. n. 34. Zwergpapagey Müller Natursyst. 2. p. 149. Perruche a tete rouge, ou Moineau de Guinée. *Buffon Oiseaux* VI. p. 165. t. 7. Ed. in 12. XI. p. 230. n. 2. pl. VII. fig. 1.

Petite perruche male de Guinée. *Buff. planch. enl.* 60.

Red headed Guinea-Parrakeet. *Lath.* Synopf. I. 1. p. 309. n. 117. Bor. 2. 95. 13. Blumenb. 3. p. 179. 6.

Europa gebracht wird; allein reden lernt er nicht, und hat nur ein ziemlich unangenehmes Geschrey. Viele sterben auf der Reise; kaum wird man unter zehn einen auf der Reise von Guinea nach Europa erhalten h); und doch leben sie in unsern Himmelsstrichen lange, wenn man sie mit Fuchsschwanz und Canariensaamen nährt, wenn man nur ein Paar in einen Bauer setzt; sogar legen sie daselbst zuweilen Eyer i); allein man hat wenige Beyspiele, daß ihre Eyer ausgebrütet wären.

Wenn

g) Man nennt diese Papageyen guineische Sperlinge: sagt Bosmann, ohne daß man leicht davon den Grund angeben könnte, weil die gemeinen Sperlinge hier an der Goldküste in äußerster Menge sind. — Ihr Schnabel ist ein wenig gebogen, wie an den Papageyen. Man bringt eine große Anzahl von diesen kleinen Geschöpfen nach Holland. Sie werden dort gut bezahlt, obgleich in Guinea das Dutzend nur einen Thaler kostet, von welchem neun bis zehn auf der Reise sterben. *Histoire générale des Voyages.* tom. IV. p. 247.

V.

h) Bosmann Reise n. Guinea. S. 370 fig 23. 24. *Bosmann Voy. de Guinée.* Lond. p 277. fig. 23 und 24. *Hist. gener. des Voyages* tom. IV. p. 64.

V.

i) Man darf nicht zweifeln, daß man mit mehrerer Sorgfalt nicht dahin kommen werde, diese Vögel als Hausthiere häufiger fortzupflanzen. Bisweilen vermag dieses die Kraft der Natur selbst, ohngeachtet der rauhen Himmelsgegend und Witterung. Man sahe, daß in Frankreich zwey Sittiche von Corea zwey

Wenn einer von diesen gepaarten Vögeln stirbt, so wird der andere traurig, und überlebt ihn nicht leicht. Sie verschwenden einander wechselseitige Sorgfalt; das zärtliche Männchen hält sich nahe an sein Weibchen, und äßt es aus dem Kropfe; das Weibchen ist voller Unruhe, wenn es einen Augenblick von seinen Männchen getrennt ist; auf diese Art machen sie sich ihre Gefangenschaft durch Liebe und angenehmen Umgang erträglich. Die Reisenden k) versichern, daß diese Vögel in Guinea, wegen ihrer Menge vielen Schaden in den Feldfrüchten verursachen. Es scheint, daß sich die Gattung beynahe in alle mittägliche Klimate der alten Welt ausgebreitet hat, denn man findet sie in Aethiopien l), in Ostindien m), auf Java n) eben so gut als in Guinea o).

Viele

zwey Junge im Januarmonat ausbrüteten, und zwar in einem ungeheizten Zimmer, wo sie gleich wegen Kälte umkamen.

v.

k) *Barbot. Hist. de Guinée.* p. 220.

v.

l) *Clusius Exot. auctuar.* p. 365.

v.

m) *Albin.* tom. III. p. 7.

v.

n) *Salerne Ornith.* p. 72.

v.

o) Sie finden sich in großer Menge längst der ganzen Küste, aber vorzüglich an dem untern Theile, als

Viele Leute nennen diesen Vogel fälschlich den brasilianischen Sperling, ob er gleich unter dem Himmelsstrich von Brasilien nicht einheimisch ist, allein da er zu Schiffe aus Guinea dahingebracht wird, und von da aus nach Europa kommt, so hat man glauben können, er gehöre in dieser Gegend von Amerika zu Hause. Dieser kleine Sittich hat einen ganz grünen Körper, auf dem Bürzel einen schönen blauen Flecken, eine feuerrothe mit Aurorenroth vermengte Maske, die die Stirne deckt, das Auge einschließt, auf die Kehle herabfällt, und aus deren Mitte ein röthlich weißer Schnabel hervordringt. Der Schwanz ist sehr kurz, und wenn er beysammen liegt, scheint er ganz grün zu seyn; wenn er sich aber ausbreitet, so sieht man, daß er von drey Binden queer durchschnitten wird, einer rothen, einer schwarzen, und einer grünen, welche das Ende umfaßt und schließt. Das erste Gelenke des Flügels ist bey dem Männchen blau, und bey dem Weibchen gelb, auch unterscheidet sich das Weibchen dadurch vom Männchen, daß sein Kopf nicht so lebhaft roth ist. Clusius hat diesen Vogel unter dem Namen des kleinsten Papa-

zu Murea, Cormantin, Acra. *Voyage en Guinée par Bosmann.* p. 277. (teutsch p. 320.) Man findet eine unendliche Menge Papageyen zu Anamabo; sie sind so groß als Sperlinge, haben einen sehr schönen grünen Körper, einen Kopf und Schwanz von bewundernswürdiger Röthe, und überhaupt eine so nette Gestalt, daß der Verfasser einige davon nach Paris als ein Geschenk für den König brachte. *Hist. gener. des Voyages.* tom. IV. p. 64.

geyen p)[2]) sehr gut beschrieben. Edwards, Brisson und Linné haben ihn mit dem kleinen amerikanischen, mit verschiedenen Farben bemahlten Papagey, den Seba mittheilt, verwechselt q); allein es ist gewiß, daß dieses nicht eben derselbe Vogel ist, denn letzterer Verfasser sagt, sein Papagey habe nicht nur eine himmelblaue Halsbinde, und einen Schwanz, der prächtig mit einer Mischung von fünf Farben, von blau, gelb, roth, braun und dunkelgrün schattirt sey, sondern er sey auch wegen seiner Stimme, und seines angenehmen

p) Psittacus minimus. *Clus. exot. auct.* p. 365.

2) Linné sagt von diesem Vogel, welcher in der Königl. Sammlung war: Corpus magnitudine passeris, totum viride. Frons supra et subtus anteriora capitis fulvo-rubra. Oculi nigri. Rostrum flavescens. Pedes cinereo-caerulescentes. Uropygium caeruleſcens. Cauda aequalis, fulvo-rubra, apice viridi fascia transversa nigra. Mas basi alae caerulea. Foemina basi alae flavescente. *Mus. Ad. Fr. l. c.* Nach Edwards war dieser Vogel so groß als eine Lerche, nach Scopoli ist er so groß als der Kreuzvogel, ist am Steiße himmelblau und der Schwanz hat eine schwarze Binde am Ende. Seine grüne Farbe fiel etwas ins Gelbe. Der Schnabel war blaßgelb; der Schwanz kürzer als die darauf liegenden Federn. Ueber der schwarzen Binde am Schwanze stand eine andere scharlachrothe viermal breitere. Das Weibchen hatte einen gelben Hals, und die Federn auf der Brust braungraue Streifen. Scop. a. a. O.

q) *Seba.* tom. II. p. 40. (Psittacus minor versicolor. II. tab. 40. f. 1.)

men Geſanges liebenswürdig, und lerne leicht ſprechen; nun iſt es offenbar, daß dieſe Abzeichen auf unſern guineiſchen Sperling nicht paſſen, und dieſer Vogel des Seba, den er lebendig gehabt hat, iſt vielleicht eine ſechſte Gattung der kurzgeſchwänzten Sittiche aus der neuen Welt.

Eine Spielart, oder vielleicht eine mit unſerer nahe verwandte Gattung iſt der Vogel, den Edwards unter der Benennung des ſehr kleinen grün und rothen Papageyes r) [1]) mittheilt, von

r) Smaleſt green and red Indian perroquet. Pſittacus minimus viridis et ruber. *Edwards Hiſt. of Birds.* p. 6. — Pſittacus minor brevicaudus, viridis, ſuperne ſaturatius, inferne dilutius; capite ſuperius, dorſo infimo et uropygio rubris; rectricibus ſuperne viridibus, inferne caeruleo-baryllinis. . . . Pſittacula indica. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 390. (n. 86.)

v.

1) Der kleinſte grün und rothe indianiſche Papagey. Pſittacus minimus viridis et ruber indicus. Seligmann Vögel I. tab. 6.

Red and green indian Parrot. *Latham Synopſ.* I. 1. p. 311. n. 118.

Tres petit perroquet verd et rouge Edw. *Buffon Oiſeaux.* Ed. in 12. XI. p. 236. r.

Pſittacus (indicus) viridis, orbitis pallide incarnatis, vertice rubro vel aurantio, uropygii parte poſtica rubra, remigibus intus, cauda ſubtus ex caeruleſcente viridibus. *Linn. Syſt. Nat.* XIII. 1. P. 349. n. 128. Ich habe ſchon geſagt, daß Linné

dieſen

welchem er sagt, daß er aus Ostindien komme, und welcher in nichts von den vorigen abgehet, als daß er einen rothen Bürzel hat.

diesen Edwardschen Vogel zu seinem Psittacus Galgulus rechnete, so wie Klein zu demselben Vogel oder zu dem vorhergehenden ersten Sittich mit blauem Kopfe und kurzen Schwanze, daß die Farbe aber abweiche. In der dreyzehnten Ausgabe des Linneischen Systems hat Herr Gmelin eine besondere Art daraus gemacht.

O.

Der Sittich mit Kurzen Schwange 1M.2W.S. 199.

Büff. N. G. d. Vögel XIX B.

Büff. fol. R. 520. 1M 2W.

Der Coulaciſſi. s) 1)

Dritte Gattung des Sittichs mit kurzem Schwanze.

Buff. pl. enl. 520. f. 1. XVI. f. 2. XV.

So wie wir immer die Namen vorzüglich aufnehmen, welche die Thiere in ihrem Vaterlande haben, ſo haben wir auch dieſem Vogel den

s) Pſittacus minor brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens; (ſyncipite gutture, collo inferiore et uropygio rubris; taenia transverſa infra occipitium aurantio-rubra, mas) (ſyncipite et uropygio rubris; macula utrimque roſtrum inter et oculum viridi-caerulea faemina); rectricibus ſuperne viridibus, inferne caeruleo beryllinis. . . . Pſittacula Philippenſis. *Briſſ. Ornithol.* tom. III. (n. 87.) p. 394. et pl. 30. fig. 1. — Coulaciſſi. *Salerne Ornithol.* p. 72.

V.

1) Coulaciſſi. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 169. Ed. in 12. tom. XI. p. 236. n. 3. pl. VII. fig. 2.

Perruche des Philippines. *Buffon Pl. enl.* 520. fig. 1. das Männchen und fig. 2. das Weibchen.

ſeinigen, nehmlich Coulaciſſi, den man ihn auf den Philippinen, und beſonders auf der Inſel Lucon gegeben hat, gelaſſen.

Seine Stirne, die Kehle und der Bürzel ſind roth; ein halbes Halsband von Pommeranzenfarbe geht oben über den Hals; der übrige Theil des Leibes und die oberſten Flügeldecken ſind grün; die Schwungfedern ſind dunkel an ihrer äußern Seite, und ſchwärzlich an ihrer innern Spitze: die mittelſten Flügelfedern, und die Ruderfedern im Schwanze ſind oben grün und unten blau; der Schnabel, die Füße und Nägel ſind roth.

Das Weibchen iſt darin von dem Männchen verſchieden, daß es einen bläulichen Flecken an jeder Seite des Kopfs zwiſchen dem Schnabel und dem Auge hat; daß es auf dem Halſe kein halbes Halsband, kein Rothes auf der Kehle hat, und daß das Rothe auf der Stirne ſchwächer iſt, und ſich nicht ſo weit erſtreckt.

Briſſon t) und Linné u) haben dieſen Vogel mit dem Papageyen mit ſaphirblauer Krone des

Philippine Parrakeet. *Lath. Synopſ.* L. 1. p. 311. n. 119.

Pſittacus Galgulus. var. *Linne Syſt. Nat.* XIII. I. p. 349. n. 46. β.

t) *Supplement d'ornithol.* p. 128.

u)

des Edwards x) verwechselt, welcher unser erster kurzschwanziger Sittich mit blauem Kopfe ist.

u) *Syst. Nat.* XII. p. 150. In der dreyzehnten Ausgabe ist er als eine Abart aufgeführt.

x) *Gleam.* p. 177. tab. 293. n. 1. (Seligm. VIII. t 83. fig. 1.)

Der Sittich mit vergoldeten Flügeln. y)

Vierte Gattung mit kurzem Schwanze.

Edw. tab. 293. fig. 2.
Seligmann VIII. tab. 83. fig. 2.

Edwards, dem man die Kenntniß dieses Vogels zu verdanken hat, sagt: er sey wahrscheinlich aus Ostindien gebracht worden, doch könne er es nicht

y) Golden-winged parrakeet. *Edw. Glean.* p. 177. tab. 293. (fig 2.)
(Der Papagey mit den Goldflügeln. Psittacus minor alis aureis. Seligmann Vögel VIII. tab. 83. fig. 2.)

— Psittacus minor brevicaudus, viridis, superne saturatius, inferne dilutius; majoribus alarum tectricibus et remigibus intermediis aurantiis, remigibus quatuor primoribus exterius saturate caeruleis; rectricibus viridibus. . . . Psittacula alis deauratis. *Briss. Suppl. Ornithol.* p. 130. (n. 97.) Psittacus brachyurus viridis, alis macula caerulea fulvaque, orbitis nudis albis. . . . Psittacus chrysopterus. *Linne Syst. Nat.* ed. XII. p. 149. (XIII. 1. p. 348. n. 44.)

Der Sittich mit vergoldeten Flügeln. S. 202.

Büff. N. G. d. Vögel XIX. B. Seligm. XIII. T. 83. F. 2.

nicht versichern. Sein Kopf, die kleinen Deckfedern auf den Flügeln, und der ganze Körper sind grün, nur ist das Grüne auf der obern Seite des Körpers dunkler als auf der untern; die großen Deckfedern auf den Flügeln sind orangefarben; die vier ersten Schwungfedern sind dunkelblau an ihrer äußern Seite, braun aber an der innern und am Ende; die vier folgenden sind orangenfarben; einige von den folgenden haben mit dem ersten einerley Farbe, und endlich sind die, welche dem Körper am nächsten stehen, ganz grün, wie die Schwanzfedern; der Schnabel ist weißlich; die Füße und Klauen sind blaß fleischfarben.

1) Der Goldflügel. Müller Natursyst. 2. S. 149. n. 44.

Perruche aux ailes d'or. *Buffon Oiseaux* VI. p. 170. Ed. in 12. XI. 238.

♀.

2) Pittacus minor brevicaudus, dilute viridis, interna ad latera versus: capite, gutture et collo intense cinereo-albis, ad viride inclinantibus, rectricibus dilute viridibus, [illegible] transversis nigris notatis. . . . Pittacus Madagascariensis. Brif. Ornith. tom. IV. p. 394. et pl. 30. fig. 2. (n. 88.)

♂.

3) Perruche a tete grise. Buffon Oiseaux VI. p. 171. Ed. in 12. XI. p. 240. n. ?

Petite Perruche de Madagascar. Buff. Pl. enl. 791. f. 2.

Grey headed Parrakeet. Lath. Synopf. I. 1. p. 319. n. 113.

Pittacus (canus) viridis capite gula jugulo-que ex viridi griseis, caudae rotundatae rectricibus lateralibus nigris. Lath. Syst. Nat. XIII. 1. p. 370. n. 132.

♀.

Der

Der Sittich mit dem grauen Kopfe. 2) 1)

Fünfte Gattung mit kurzem Schwanze.

Buff. Pl. enl. 791. fig. 2.

Brisson, der diesen Vogel zuerst bekannt gemacht hat, sagt: er sey aus Madagascar; der Kopf, die Kehle, und die untere Seite des Halses

2) Psittacus minor brevicaudus, dilute viridis, inferne ad luteum vergens; capite, gutture et collo inferiore cinereo-albis, ad viride inclinantibus, rectricibus dilute viridibus, taenia transversa nigra notatis. . . . Psittacus Madagascariensis. *Briss. Ornith.* tom. IV. p. 394. et pl. 30. fig. 2. (n. 88.)

♀.

1) Perruche a tete grise. *Buffon Oiseaux* VI. p. 171. Ed. in 12. XI. p. 240. n. 5.

Petite Perruche de Madagascar. *Buff. Pl. enl.* 791. f 2.

Grey headed Parrakeet. *Lath. Synops.* I. 1. p. 315. n. 122.

Psittacus (canus) viridis capite gula jugulo-que ex viridi griseis, caudae rotundatae fascia lata nigra. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 350. n. 131.

♂.

Der Sittich mit dem grauen Kopf. S. 204.



Büff. N. G. d. Vögel. XIX. Th. v. Büff. fol. K. 191. Fig. 2.

Halses sind weißgrau, und fallen ein wenig ins Grüne; der Leib ist unterhalb heller grün als oben; die obersten Flügeldecken, und die mittelsten Schwungfedern sind grün; die großen Schwungfedern sind an der innern Seite braun, und an der äußeren Seite und dem Ende grün: die Ruderfedern im Schwanze sind hellgrün, mit einer breiten schwarzen Queerbinde nach ihrem Ende zu; der Schnabel, die Füße und die Nägel sind weißlich.

Der

Der Sittich mit den bunten Flügeln. 1)

Sechste Gattung mit kurzem Schwanze.

Buff. pl. enl. 791. n. 1.

Dieser Sittich ist ein wenig gröſſer als die vorhergehenden; man findet ihn in Batavia und auf der Insel Lucon. Sonnerat beschreibt ihn auf folgende Art a): der Kopf, der Bauch und Hals dieses Vogels sind hellgrün und gelblich; auf den Flügeln ist eine gelbe Binde, aber jede Feder, die diese Binde bildet, ist auſserhalb blau eingefaſst, die kleinen Schwungfedern sind grünlich, die gro-

ſsen

1) Perruche aux ailes variées. *Buffon Oiseaux* VI. p. 172. Ed. in 12. XI. p. 241. n. 6. Petite perruche de Batavia. *Buff. Pl. enl.* 791. f. 1. Petite perruche de Pisle de Luçon. *Sonnerat Voy.* p. 78. tab. 41. The black winged Parroquet. Psittacus fulvirostris. *Brown illustrat.* p. 16. tab. 8. *Lath. Synopf.* I. 1. p 316. n. 123.

Psittacus (melanopterus) pallide viridis, dorso, tectricibus alarum, caudae fascia remigibus primariis nigris, secundariis flavescentibus caeruleo punctatis. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 350. n. 132.

a) *Sonnerat voyage a nouvelle Guinee.* a. a. O.

Der Sittich mit den bunten Flügeln. S. 206.

Büff. N. G. d. Vögel. XIX B. v. Büff. fol. Pl. 791. Fig. 2.

ßen sind schön sammetschwarz, (daß also die Flügel gelb, blau, grün und schwarz geschäckt sind;) der Schwanz hat eine helle Lilasfarbe; nahe an seinem Ende ist eine schwarze, sehr schmale Binde; die Füße sind grau; der Schnabel und der Regenbogen sind röthlich gelb [2]).

2) Der schwarzflüglichte Papagey ist, von Brown in natürlicher Größe vorgestellet, ohngefähr einen halben Fuß lang. Der Schnabel dunkelgrau; der Kopf, die Stirn und der hintere Theil des Kopfs gelblich grün; der Scheitel und die Backen hell blaugrün; die Brust, der Bauch und die Dickbeine von gleicher Farbe; der Rücken, die Flügeldecken und ersten Schwungfedern sind schwarz; die Schwungfedern der zweyten Ordnung hellgelb, mit schön blauen Säumen; die Schwanzdecken sind dunkelgrün; der Schwanz ist ausgebreitet rund, aber das Ende jeder Feder spitz; an einer Seite hellblau, an der andern hell lilac mit einer schmalen schwarzen Binde; die Beine sind dunkelgraubraun. Sein Aufenthalt ist unbekannt; die Zeichnung ist nach einem Vogel in dem Brittischen Museum gemacht. Brown.

Der Sittich mit den blauen Flügeln. 1)

Siebente Gattung mit kurzem Schwanze.

Buffon Pl. enl. 455. fig. 1.

Diese Gattung ist neu, und uns vom Vorgebürge der guten Hoffnung geschickt worden; allein ohne die geringste Anzeige seines eigentlichen Vaterlandes, und seiner natürlichen Gewohnheiten. Er ist durchaus grün, einige Schwungfedern ausgenommen, welche schön blau sind; der Schnabel und die Füße sind röthlich; diese kurze Beschreibung ist hinreichend, um ihn von allen andern Papageyen mit kurzem Schwanze zu unterscheiden.

1) Perruche aux ailes bleues. *Buffon Oiſ.* VI. p. 173 Ed. in 12. XI. p. 242. n. 7. Petite Perruche aux Cap de bonne Eſperance. *Buff. pl. enl.* 455. fig. 1. Blue-winged Parraket. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 317. n. 124.

Pſittacus (capenſis) viridis, remigibus nonnullis caeruleis, roſtro pedibusque rubentibus. *Linn. Syſt. Nat.* XIII. 1. p 350. n. 133.

Der Sittich mit blauen Flügeln. S. 208.

Büff. N. G. d. Vögel. XIX B. v. Büff. fol. Pl. 435. F. 1.

Der Sittich mit der Halsbinde. S. 209.



Büff. N. G. d. Vögel. XIX Th. Sonnerat Guinea. Tab. 39.

Der Sittich mit der Halsbinde.

Achte Gattung mit kurzem Schwanze.

Sonnerat Guinea. tab. 39.

Die Kenntniß dieses Vogels haben wir ebenfalls dem Sonnerat zu verdanken, welcher ihn folgendermaßen beschreibt; man findet ihn auf den philippinischen Inseln, und besonders auf der Insel Lucon; er ist von der Größe des brasilischen (guineischen) Sperlings; der ganze Körper hat ein heiteres und angenehmes Grün, welches auf dem Rücken dunkler, auf dem Bauch aber heller, und gelb schattirt ist; er hat hinter dem Hals unten am Kopf eine breite Halsbinde; diese Halsbinde bestehet bey dem Männchen aus himmelblauen Federn; aber bey beyden Geschlechten sind die Federn des Halsbandes in die Queere schwarz geschäckt; der Schwanz ist kurz, am Ende spitz, und nur so lang als die Flügel reichen; der Schnabel, die Füße, der Regenbogen sind schwärzlich grau; diese Gattung hat nichts vorzügliches als ihre Gestalt

und Farben; überdem ist sie ohne Annehmlichkeiten und lernt nicht reden b).

b) *Sonnerat voyage a la nouvelle Guinee.* p. 77 et 78.

O.

Perruche a Collier. *Buffon Oiseaux* VI. p. 173. Ed. in 12. XI p. 243. n. 8.

Petite perruche a collier de l'isle de Luçon. *Sonnerat* a. a. O. tab. 39. Collared Parrakeet. *Latham Synopf.* I. 1. p. 317. n. 125.

Pſittacus (torquatus) viridis, occipitis faſcia flava transverſim nigro ſtriata. *Linné Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 351. n. 134.

Der Sittich mit Schwarzen Flügeln. S. 211.



Büff. N. G. d. Vögel. XIX. B. Sonnerat Guinea Tab 4.

Der Sittich mit schwarzen Flügeln 1).

Neunte Gattung mit kurzem Schwanze.

Sonnerat Guinea. tab. 4.

Auch diese Gattung findet man auf der Insel Lucon, und Sonnerat beschreibt sie auf folgende Art: Dieser Vogel, sagt er, ist ein wenig kleiner als der vorige; die obere Seite seines Halses, der Rücken, die kleinen Schwungfedern und der Schwanz sind dunkelgrün; der Bauch ist hellgrün und gelblich; der obere Theil des Kopfs ist beym Männchen lebhaft roth; die Federn, die beym Weibchen den Schnabel oberhalb umgeben, sind eben so roth, über dieses hat es einen gelben Flecken mitten auf der Oberseite des Halses. Das

1) Perruche a ailes noires. *Buffon Oiseaux* VI. p. 174. Ed. in 12. XI. p. 244. n. 9.

Petite perruche de l'isle de Luçon. *Sonnerat Voyage a la nouvelle Guinée.* p. 77 et 78. pl. 4.

Luzonian Parrakeet. *Latham Synopf.* I. 1. p. 318. n. 126.

Psittacus (minor) viridis, vertice coccineo, pectore caeruleo, remigibus majoribus nigris. *Linné Syst. Nat.* XIII. 1. p. 351. n. 135.

Männchen hat eine blaue, das Weibchen eine rothe Kehle; bey beyden Geschlechtern sind die großen Schwungfedern schwarz, die obern Deckfedern des Schwanzes sind roth; der Schnabel, die Füße und der Regenbogen sind gelb. Ich gebe, sagt Sonnerat, diese zwey Sittiche für Weibchen und Männchen aus, weil sie mir sehr wenig von einander abzugehen scheinen, mit einander in Absicht auf die Größe, Bildung, Farben übereinkommen, und einerley Klimat bewohnen; doch getraue ich mir nicht zu behaupten, daß es nicht zwey verschiedene Gattungen seyn könnten; beyde haben es noch mit einander gemein, daß sie mit dem Kopf unter sich gekehrt, an Zweigen aufgehängt schlafen, und daß sie begierig auf den Saft sind, der aus den frisch angeschnittenen Stielen der Cocos fließt c).

c) *Sonnerat Guinée.* a. a. O.



Büff. N. G. d. Vögel. XIX. B. v. Büff. fol. H. 433. Fig. 2.

Der Arimanon [1]).

Zehnte Gattung der Sittiche mit kurzem Schwanze.

Buffon Pl. enl. 455. n. 2.

Diesen Vogel findet man auf der Insel Otahiti, und sein Name bedeutet in der Landessprache einen **Cocusvogel**, weil er sich wirklich auf den Cocusbäumen aufhält; seine Beschreibung hat man dem Herrn Commerson zu verdanken. Ich habe ihn in das Gefolge der Sittiche mit kurzem Schwanz gesetzt, weil er zu diesem Geschlecht zu gehören scheint, indessen hat doch dieser Vogel ein Abzeichen, welches ihm eigen ist, und weder bey

1) L'Arimanon. *Buffon Oiseaux* VI. p. 175. Ed. in 12. XI. p. 245. n. 10.

Petite Perruche de l'isle de Taiti. *Buffon pl. enl.* 455. fig. 2.

Otaheitian blue Parrakeet. *Latham Synopſ.* I. 1. p. 255. n. 59.

Pſittacus (taitianus) caeruleus, capitis pennis elongatis, gula juguloque albis, roſtro pedibusque rubris. *Linné Syſt. Nat.* XIII. 1, p. 329. n. 91.

Sittichen mit kurzem noch langem Schwanze angetroffen wird; dieses Abzeichen besteht darin, daß er eine spitze Zunge hat, die mit einem Pinsel von kurzen und weißen Haaren aufhört. Das Gefieder dieses Vogels ist gänzlich schön blau, die Kehle und die untere Seite des Halses ausgenommen, welche weiß sind; der Schnabel und die Füße sind roth; er ist auf der Insel Otahiti sehr gemein, wo man ihn überall herumflattern sieht und unaufhörlich pfeifen hört; er fliegt in Gesellschaft, nährt sich von Banana, ist aber im Haus sehr schwer zu erhalten; er stirbt aus Verdruß, zumal wenn er allein im Bauer ist; man kann ihm keine andere Nahrung als den Saft von Früchten beybringen, und er schlägt alle andere festere Speisen hartnäckig aus.

Die Papageyen der neuen Welt.

Die Aras.

Von allen Papageyen ist der Ara der größeste und prächtigste; der Purpur, das Gold und das Himmelblau schimmern auf seinem Gefieder; er hat einen zuversichtlichen Blick, einen edlen Anstand, einen stolzen Gang, und sogar eine Miene, die Verachtung auszudrücken scheint, als ob er seinen Werth fühlte, und seine Schönheit zu sehr kennte; nichts desto weniger macht ihn sein ruhiges Naturell gesellig und sogar einiger Zuneigung fähig; man kann ihn zu einen Hausgenossen machen, ohne daß er einen Sklaven vorstellt, er mißbraucht die Freyheit nicht, die man ihm giebt; die sanfte Gewohnheit ruft ihn zu denjenigen zurück, welche ihn ernähren, und er kehrt richtig in die Wohnung zurück, an die man ihn einmal gewöhnt hat. Alle Aras sind den Klimaten der neuen Welt eigen, welche zwischen zwey Wendekreisen liegen, sowohl auf dem festen lande als den Inseln, und man findet nicht einen, weder in Afrika noch Ostindien. Als Christoph Kolumb in seiner zweyten Reise an Guadeloupe kam, sah er daselbst Aras,

welchen er den Namen Guacamayas gab a). Man findet sie sogar auf den wüsten Inseln, und überall machen sie die Zierde dieser dunkeln Waldungen aus, welche die der Natur allein überlassene Erde decken b). Diese Papageyen erschienen zuerst in Europa, und wurden daselbst mit Bewunderung betrachtet. Aldrovand, der zuerst im Jahr 1572 einen Ara in Mantua sah, merkt an, daß dieser Vogel damals ganz neu und sehr gesucht war, und daß sie Fürsten als Geschenke, die eben so schön als rar waren, gaben und annahmen c). In der That war der Ara selten, denn Belon, dieser so forschende Beobachter, hatte keinen Ara gesehen, weil er sagt, die grauen Papageyen seyn unter allen die größesten d). Ich kenne vier Gattungen von Aras,

a) *Herrera.* Lib. II. cap. 10.

b) „Während daß Anson und seine Offiziers die natürlichen Schönheiten dieser Einöde betrachteten, flog eine Schaar Aras über sie weg, und hielten sich, als wenn sie die Absicht gehabt hätten, das Schauspiel zu heben und prächtiger zu machen, auf, und machten tausend Schwenkungen in der Luft, wodurch man hinlänglich Zeit bekam, den Glanz und die lebhafte Farbe ihres Gefieders zu beobachten. Wer Zeuge von diesem Auftritte war, kann sie noch nicht mit kaltem Blute erzählen.“ *Voyage autour du monde par l'Amiral Anson.* p. 288. „Es ist das schönste von der Welt, zehn bis zwölf Aras auf einem ganz grünen Baum zu sehen; man sieht niemals eine schönere Mahlerey. *Dutertre Hist. des Antilles.* Tom. II. p. 247.

c) *Aldrovande Av.* Tom. I. p 665.

d) Nature des Oiseaux. p. 298.

Aras, nähmlich den rothen, blauen, grünen und schwarzen. Die Namensammler haben sechs Gattungen angegeben e), die sich aber auf die Hälfte einschränken lassen müßten, nämlich auf die drey erstern, wie durch die auf einander folgende Hererzählung erwiesen werden soll. Die Abzeichen, wodurch sich die Aras von andern Papageyen der neuen Welt unterscheiden, sind 1) die Größe und Stärke des Körpers, da sie wenigstens noch einmal so stark als die übrigen sind; 2) die Länge des Schwanzes, welcher ebenfalls selbst im Verhältniß mit dem Körper viel länger ist; 3) die nakte, schmutzig weiße Haut, welche die zwey Seiten des Kopfs deckt, ihn unterhalb umgiebt, und auch die Wurzel des Unterschnabels umfaßt, ein Abzeichen, welches kein Papagey hat; mitten in dieser kahlen Haut sitzen auch die Augen, welches diesen Vögeln eine unangenehme Miene giebt; eben so unangenehm ist ihre Stimme, die nichts als ein Geschrey ist, welches das Wort Ara mit einem so rauhen und so starken Ton auszusprechen scheint, daß er das Ohr beleidigt.

e) *Brisson*

Der rothe Ara f) 1).

Erste Gattung.

Pl. enl. 12. und 641.

Man hat diesen Vogel auf zwey verschiednen illuminirten Platten vorgestellt, einmal unter dem Namen des **rothen Ara**, und einmal unter

f) Psittacus erythroxantus. *Gesn. Av.* p. 720. — Psittacus erythrocianus. *Ibidem.* p. 721. — Psittacus quem erythroxantum distinguendi gratia cognominare visum est germanis Rotgelber Sittich. *Gesner Icon. Av* p. 38. — Psittacus erythrocianus. *Ibid.* p. 39. — Psittacus maximus alter. *Aldrov. Av.* tom. I. p. 665. — Psittacus erythroxantus ornithologi. *Ibid.* p. 683. — Psittacus erythrocianus ornithol. *Ibid.* — Psittacus erythroxantus. *Schwenckfeld Av. sies.* p. 343. — Psittacus erythrocyanus. *Ibid.* — Araracanga Brasilienſibus. *Marcgrave Hist. Nat. Bras.* p. 206. — Arara. *Pison Hist. Nat. Bras.* p. 85. — Psittacus erythroxantus. *Jonston Av.* p. 23. — Psittacus maximus alter. *Ibid.* p. 21. — Psittacus erythrocianus. *Ibid.* p 23. — Araracanga *Marcgravii. Ibid.* p. 141. — Haitini huacamaias Mexicanis alo, *Fernandez Hist. nov. Hisp* p. 38. cap. 117. — Psittacus erythroxantus. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 15. et *Onomast.* p. 67. n.

Der grosse rothe Ara.

S. 218.

Der kleine rothe Ara.

S. 218.

ter dem Namen des kleinen rothen Ara; aber diese zwey Abbildungen scheinen uns nicht zwey wirk-

n. 15. — Psittacus maximus alter vertice capitis compresso. *Idem* p. 74. n. 2. et *Onomast.* p. 66. n. 2. — Psittacus erythrocianus. *Idem.* p. 74. n. 14. et *Onomast.* p. 67. n. 14 — Psittacus maximus Marcgravii cosmoro. Ara rouge. *Barrere France equinox.* p. 145. — Psittacus puniceus, *Idem Ornithol.* Class. III. Gen. 2. Sp 7.

— Psittacus major diversicolor macaw seu macao dictus, *Willughby Ornithol.* p. 73. — Psittacus maximus alter *Aldrovandi, Ibid.* p. 73. Araracanga Marcgravii, *Ray Synops. Av.* p. 29. n. 1. — Psittacus maximus alter *Aldrovandi, Ibid.* n. 1.

Arras *Dutertre hist. des Antilles.* Tom. II. p. 247. Arras. *Labat nouveau voyage aux iles de l'Amerique.* Tom. II. p. 154. Arat par les Sauvages de l'Amerique 2. *de Lery Hist. d'un voyage au Bresil.* p. 170.

Guacamayas. Garcilasso de la Vega. Hist. des Incas, Tom. II. p 282. Guacamayas. *Gemelli Carreri Voyage autour du monde.* Tom. VI. p. 210.

Guacamayac. *Joseph Acosta Hist. nat. des Indes.* p. 197.

Carinde. *Thevet Singul. de la France antarc.* p. 92.

Macaw, au Bresil Jackon. *Dampiere Voyage.* Tom. IV. p. 65. Macaw. *Wasser voyage.* Tom. IV. p. 231.

Aras, *Rochefort Hist. nat. des Antilles.* p. 154.

Grand perroquet de Macao. *Albin*, Tom I. p. 11. Perroquet de lamaique. *Ibid.* — Psittacus macrourus ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis mediis rugosis. . . Psittacus Macao. *Linné Syst. Nat.* ed X. p. 96. — Psittacus maximus coccineo varius, cauda producta. *Browne*

Nat.

wirklich verschiedene Gattungen vorzustellen; es sind vielmehr zwey verschiedene Raßen, oder vielleicht

Nat. hist. of Iamaic p. 472. — Red and blue Macaw. Psittacus maximus puniceus et caeruleus. *Edw. History of Birds*, p. 158. t. 158. — Red and blue Macaw. *Bancroft Nat. hist. of Guyana*, p 155. — Red and yellow Macaw. *Ibid.* p. 156. teutsch, S. 93. 3. — Psittacus longicaudus, coccineus, uropygio dilute caeruleo; pennis scapularibus caeruleo et viridi variegatis; genis nudis, candidis, rectricibus binis intermediis coccineis, apice dilute caeruleis, utrimque extimis, inferne obscure rubris. . . . Ara Brasiliensis. *Brisson Ornithol* tom. IV. p. 184. pl. 19. fig. 1. — Psittacus major longicaudus, dilute coccineus; uropygio dilute caeruleo; pennis scapularibus luteis, viridi terminatis; genis nudis, candidis, rectricibus superne cyaneis, violaceo admixto, inferne obscure rubris; binis intermediis utrimque proxima prima medietate obscure rubra. . . . Ara Iamaicensis. *Brisson Ornithol.* tom. IV. p. 188. Le grand Perroquet rouge et l'Aracanga de Marcgrave. *Salerne Ornithol.*

D.

1) L'Ara rouge. *Buffon Oiseaux* VI. p. 179. *Pl. enl.* 12. Ed. in 12. XI. p. 250. n. 1.

Ara premier. *Fermin voy. Surinam.* 2. p. 173.

Ara erste Art. Fermin Surinam. S. 153.

Psittacus (Macao) ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, scapularibus caeruleo et viridi variis, genis nudis rugosis. *Linné Syst. Nat.* XII. 139. XIII. 1. p. 312. n. 1. *Scop. Ann.* I. p. 26. n. 21. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 199. 1. Der westindische Rabe. Müller Naturfyst. 2. S. 126. tab. 28. fig 1. Bor. 2. 89. 2. Blumenbach 3. p. 178. 1. Anson Reis. 2. p. 37.

Der

leicht nur zwey bloße Spielarten von einerley Raße. Indessen haben alle Nomenclatoren nach Gesnern und Aldrovanden zwey Gattungen daraus gemacht, obgleich alle Reisebeschreiber, (und namentlich Markgrav,) nämlich alle die, welche sie gesehen und mit einander verglichen haben, mit Grund nur einen und eben denselben Vogel aus ihnen machen, den man in allen heißen Himmelsstrichen von Amerika antrifft, auf den Antillen, in Mexiko, auf den Ländern der Erdenge, in Peru, in Guiana, Brasilien u. s. w., und diese Gattung, die in Amerika so zahlreich und ausgebreitet ist, findet sich nirgends in der alten Welt; es muß einem daher in der That sonderbar vorkommen, daß einige Schriftsteller g) nach Albin diesen Vogel den Papagey

Der rothe Papagey vom ersten Range, mit blauen Flügeln und Schwanze. Seligmann Vögel VI. tab. 53. Der flachköpfige Papagey. Halle III. n. 26. Rother Papagey vom ersten Range. Klein Ord. d Vögel in 4to. p. 25. n. 1. in 8vo. p. 46. n. 1. Götz im Naturforsch. XIX. 80.

Petit Ara rouge. *Buffon Oiseaux* VI. p. 180. Ed. in 12. XI. p. 251. pl. enl. 641.

Der roth und gelbe Makav. Bankroft Guiana. S. 94. *Latham Synopf* I. 1. p. 201. n. 2.

Ara Iamaicensis. *Brisson* l. c.

Psittacus (Aracanga) dilute coccineus, pennis scapularibus luteis viridi terminatis remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis. *Linné Syst. Nat* XIII. 1. p. 313. n. 52.

g) *Albin. Willughby.*

pagey von Makar genannt und geglaubt haben, er käme aus Japan. Es ist möglich, daß man einige aus Amerika dahin gebracht hat, aber es ist gewiß, daß sie daselbst keine landeseingebohrne sind, und es ist wahrscheinlich, daß diese Verfasser den großen ostindischen lory mit dem rothen westindischen Ara vermengt haben. Dieser große rothe Ara ist gegen dreyßig Zoll lang, allein sein Schwanz macht die Hälfte von seiner länge aus; der ganze Körper, die Flügel ausgenommen, ist zinnoberroth; die vier längsten Schwanzfedern haben eben diese Farbe; die vier großen Schwungfedern sind oberhalb türkisblau, und unterhalb kupferroth auf einem schwarzen Grunde; auf den kleinen Federn ist das Blaue und Grüne auf eine bewundernswürdige Art vereinigt und zusammengeschmolzen; die großen Deckfedern sind vergoldet gelb, und hören grün auf; die Schultern haben mit dem Rücken einerley Farbe; die obern und untern Deckfedern des Schwanzes sind blau; vier von den Seitenfedern an jeder Seite sind oberhalb blau, und alle haben ein kupferrothes Unterfutter, das an den vier mittlern heller und metallartiger aussieht. Ein Schöpfchen von mordorerothen sammetartigen Federn steht auf der Stirne hervor; die Kehle ist braunroth; eine weiße, nackte, pergamentartige Haut umgiebt das Auge, bedeckt die Backen, und umgiebt die untere Hälfte der Wurzel des Schnabels, welcher nebst den Füßen schwärzlich ist. Diese Beschreibung ist nach einem lebendigen Vogel gemacht worden, der von den größesten und schönsten war. Uebrigens merken die Reisenden Verschiedenheiten in den Farben und in der Größe dieser Vögel, nach den verschiedenen Gegenden, und

sogar

sogar von einer Insel zur andern an h). Ich habe welche gesehen, deren Schwanz ganz blau, und andere, bey denen er roth war und blau aufhörte; ihre Größe ist eben so veränderlich als ihre Farben; aber die kleinen Aras sind seltner als die großen. Ueberhaupt waren die Aras ehemals in St. Domingue sehr gemein. Aus einem Schreiben des Ritters Deshayes ersehe ich, daß, seitdem sich die Franzosen daselbst niedergelassen, und ihre Anlagen bis auf die Gipfel der Berge getrieben haben, diese Vögel daselbst seltner geworden sind i). Uebrigens halten sich die rothen und die blauen Aras, welche unsere zweyte Gattung ausmachen, in einerley Himmelsstrichen auf, und haben durchaus einer-

h) Diese Vögel sind so verschieden nach den Ländern, wo sie sich aufhalten, daß es keine Insel giebt, welche nicht seine Papageyen, seine Aras und kleine Papageyen hätte, welche in der Größe des Leibes, in der Stimme und dem Unterschiede des Gefieders ungleich wären. *Dutertre hist. des Antilles.* Paris 1667. Tom. II p. 247. Die Aras sind vorzüglich schöne Vögel, sie haben einen langen Schwanz, welcher aus schönen Federn von verschiedener Farbe besteht, nach dem Unterschiede der Inseln, wo sie ausgebrütet sind. *Hist. nat. et morale des Antilles.* Rotterd. 1658 p. 154.

i) Auf allen diesen antillischen Inseln sind die Aras sehr selten geworden, weil die Einwohner sie zerstören, um sie zu essen. Sie ziehen sich in weniger bewohnte Gegenden zurück, und man sieht sie nicht mehr den angebaueten Oertern nahe kommen. Eine Bemerkung von dem Herrn de la Borde, Königl. Arzte zu Cayenne.

einerley natürliche Gewohnheiten; folglich kann man alles, was wir von diesem sagen, auf die andern anwenden.

Die Aras bewohnen die Gehölze in den feuchten Gegenden, die mit Palmbäumen bepflanzt sind, und nähren sich hauptsächlich von den Früchten der Latanen (oder Fächerpalmen), davon es große Wälder in den nassen Savanen giebt; sie fliegen gewöhnlich Paar und Paar, und selten in Haufen, doch versammeln sie sich zuweilen des Morgens, um alle miteinander zu schreyen, und lassen sich sehr weit hören. Eben so schreyen sie, wenn sie von einem Gegenstande erschreckt werden k).

Sie schreyen auch allezeit, wenn sie fliegen, und unter allen Papageyen fliegen sie am besten; über die freyen Oerter fliegen sie weg, halten sich aber nicht darin auf; sie setzen sich allezeit auf den Gipfel oder auf den höchsten Ast der Bäume; den Tag über ziehen sie weit weg, um ihre Nahrung zu suchen, allein alle Abend kommen sie an dem nemlichen Ort zurück, von welchem sie sich nicht über eine französische Meile entfernen, um reife Früchte zu suchen. Dutertre l) sagt (in seiner Ge-

k) Die Indianer waren in völligster Sicherheit, (zu Nubarco in Darien,) wie ein Geschrey von dieser Art rother Papageyen von außerordentlicher Größe, welche sie Guacamayas nannten, ihnen die Annäherung ihrer Feinde anzeigten. *Expedition d'Ojeda etc. Hist. gener. des Voyages.* Tom. XII. p. 156.

V.

l) *Hist. des Antilles.* Tom II. p. 248.

V.

Geschichte der Antillen), daß sie, wenn sie hungrig seyn, von den Früchten des Mancanillenbaumes essen, welche, wie man weiß, für den Menschen, und wahrscheinlich für die meisten Thiere ein Gift sind; er setzt hinzu, daß das Fleisch der Aras, welche von diesen Früchten gegessen haben, ungesund und sogar vergiftet sey. Nichts destoweniger ißt man alle Tage in Guiana, Brasilien u. s. w. Aras, ohne eine Unbequemlichkeit zu fühlen, es mag nun entweder in diesen Gegenden nicht Mancenillenbäume geben, oder die Aras mögen eine hinreichendere und schicklichere Nahrung finden, und deswegen von den Früchten dieses giftigen Baums nicht essen. Es scheint, die Papageyen seyn in der neuen Welt eben so gewesen, wie man alle Thiere in den wüsten ländern gefunden hat, nämlich vertraulich und gesellig, und keinesweges über den Anblick der Menschen bestürzt, welcher in diesen Gegenden schlecht bewafnet, und in kleiner Anzahl seine Herrschaft noch nicht hatte erkennen lassen m). **Petrus von Angleria** versichert das, was wir oben gesagt haben, von den ersten Zeiten der Entdeckung von Amerika n). Die Papageyen ließen sich

m) Die kleinen Vögel, welche die Wälder von Neuseeland anfüllen, kannten die Menschen so wenig, daß sie sich ruhig auf die Aeste der Bäume, welche uns am nächsten waren, und sogar auf das Ende unserer Flinten setzten. Wir waren ihnen neue Gegenstände, welche sie mit eben solcher Neugierde als die unsrige war, ansahen. Forster Cap. Cook zweyte Reise. Tom. I. p. 206.

n) Lib. X. decad. 3.

sich mit Schlingen und beynahe mit der Hand fangen, das Geräusch der Waffen erschreckte sie eben so wenig, und sie flohen nicht, wenn sie ihre Gefährten todt niederfallen sahen; sie zogen der Einsamkeit der Wälder, die Bäume, die nahe an Häusern gepflanzt waren, vor. Dort fiengen sie die Indianer drey bis viermal des Jahrs, um sich ihre schöne Federn zuzueignen, ohne daß diese Art von Gewaltthätigkeit sie aus dem Wohnplatz, den sie sich gewählt hatten, zu vertreiben schien o); und nach diesen ersten Nachrichten von Amerika ist es, daß **Aldrovande** gesagt hat, diese Vögel erwiesen sich von Natur als Freunde der Menschen, oder ließen sich wenigstens keine Zeichen von Furcht merken, sie näherten sich den Hütten, folgten den Indianern nach, wenn sie dieselben hineingehen sahen, und schienen eine große Neigung zu den Plätzen zu haben, die von diesen friedliebenden Menschen bewohnt wären p). Ein Theil von dieser Sicherheit bleibt den Papageyen noch, die übrig, die wir in die Wälder verwiesen haben. **De la Borde** bezeuget es von diesen aus Guyana; sie lassen ohne Mißtrauen und ohne Furcht sehr nahe an sich kommen, und Piso sagt von den brasilischen Vögeln, welches man aber auf die ganze neue Welt ausdehnen darf, daß sie nicht schlau sind, und leicht in alle Schlingen gerathen. Die Aras machen ihre Nester in Löcher von alten verfaulten Bäumen, welche in ihrem Vaterlande gar nicht selten sind, wo es

o) *Lery*, p. 174.

p) *Aldrovand*, p. 652.

es mehr Bäume giebt, die vor Alter fallen, als junge und gesunde; wenn das Loch zu eng ist, so erweitern sie es mit ihrem Schnabel, innerhalb legen sie es mit Federn aus. Das Weibchen legt jährlich zweymal, wie alle andere amerikanische Papageyen, und jede Brut bestehet gewöhnlich aus zwey Eyern, welche nach Dürertre, so groß wie Taubeneyer, und gefleckt wie Rebhühnereyer sind q); er fügt hinzu, die Jungen haben zwey Würmer in den Nasenlöchern, und einen dritten in einer kleinen Beule, die ihnen auf dem Kopfe hervorbreche, diese Würmer aber sterben von selbst, wenn die Vögel anfangen Federn zu bekommen r); diese Würmer in den Nasenlöchern haben die Aras nicht allein, die übrigen Papageyen, die Caßiken und viele andere Vögel haben sie ebenfalls, so lange sie im Nest sind. Es giebt auch viele vierfüßige Thiere, besonders die Affen, welche Würmer in der Nase und in andern Theilen des Körpers haben.

q) Es begiebt sich oft, daß die Aras ein bis zwey Eyer in unsern gemäßigten Gegenden legen; Aldrovand führt davon einige Beyspiele an. Der Herr Marquis d'Abzac berichtet uns, daß ein großer rother Ara bey ihm drey Eyer gelegt habe; sie waren ohne Keim, aber demohngeachtet war das Weibchen sehr hitzig und begehrte zu brüten; man gab ihr ein Hühnerey, welches sie ausbrütete. Aus einem Briefe des Herrn Marquis d'Abzac vom Schlosse Noyac bey Perigueux am 21sten Sept. 1776.

r) *Hist. des Antilles.* Tom II. p. 249.

Man kennt diese Insekten in Amerika unter dem Namen der **Makakwürmer**; sie dringen zuweilen in das Fleisch der Menschen, und verursachen Geschwüre, die sehr schwer zu heilen sind. Man hat Pferde an Geschwüren, welche von Makakwürmern herrührten, fallen sehen, welches von der Nachläßigkeit herkommt, mit welcher man die Pferde in diesem Lande behandelt, wo man sie weder einstallet noch putzt. Das Männchen und Weibchen brüten die Eyer, und versorgen die Jungen wechselsweise; sie bringen ihnen beyde zu fressen; so lange sie die Erziehung nöthig haben, verlassen sie die Alten, die sich nicht trennen, niemals; man sieht sie allezeit in der Nähe auf einem Baum sitzen.

Die jungen Aras werden leicht zahm, und in verschiedenen Gegenden von Amerika fängt man diese Vogel bloß im Neste, und man stellt den Alten nicht nach, weil ihre Erziehung zu beschwerlich und vielleicht fruchtlos seyn würde; indessen erzählt doch **Dütertre**, daß die Wilden auf den antillischen Inseln eine sonderbare Art hätten, diese Vögel lebendig zu fangen; sie forschten den Augenblick aus, wo sie die auf die Erde herabgefallene Früchte essen; sie suchten sie zu umringen, und plötzlich stießen sie ein Geschrey aus, klatschten mit den Händen, und machten ein so großes Geschrey, daß die Vögel, über den plötzlichen Schreck, den Gebrauch ihrer Flügel vergäßen, und sich auf den Rücken wärfen, um sich mit Schnabel und Klauen zu vertheidigen; die Wilden hielten ihnen alsdann einen Stock hin, den die Vögel nicht zu ergreifen verfehlten, und in dem Augenblick bände man sie

mit

mit einem Faden an den Stock; er behauptet noch, daß man sie zahm machen könne, wenn sie schon erwachsen und auf diese gewaltsame Weise gefangen wären; aber diese Begebenheiten scheinen ein wenig verdächtig, um so mehr, da jetzt alle Aras vor dem Anblick des Menschen davon fliehen, und also um so mehr vor einem großen Geräusche fliehen würden s). Waffer sagt: daß die Indianer auf der Erdenge von Amerika die Aras zahm machten, wie wir die Aelstern, daß sie ihnen die Freyheit gäben, den Tag über in den Wäldern herum zu fliegen, aus welchen sie auf den Abend ganz richtig zurück kamen; daß diese Vögel die Stimme ihres Herrn und den Gesang eines Vogels, den er Chicali t) nennt, nachahmten. Fernandez erzählt, man könne sie reden lehren; sie sprächen aber nur auf eine grobe und unangenehme Art aus; wenn man sie im Hause halte, so zögen sie ihre Jungen wie andere Hausvögel auf u). Ganz gewiß ist es, daß sie niemals so gut sprechen als die andern Papageyen; und daß sie, wenn sie zahm gemacht sind, nicht zu entfliehen suchen. Die Indianer bedienen sich ihrer Federn, um Festmützen und andern Putz daraus zu verfertigen. Sie stecken einige von diesen schönen Federn durch die Backen, die Nasenwand und die Ohren. Das Fleisch der Aras, ob es gleich gewöhnlich hart und schwarz ist, ist doch gut zu essen. Man macht gute Brü-

s) *Hist. des Antilles.* Tom. II. p. 248.

t) *Waffer*, Tom. IV. *Voy. du Dampier.* p. 231.

u) *Fernandez Hist. nov. Hisp.* p. 38.

hen davon, und überhaupt sind die Papageyen das gemeinste Wildpret, und welches man am meisten auf Cayenne ißt. Der Ara ist vielleicht mehr als irgend ein anderer Vogel der fallenden Sucht unterworfen, welche in den heißen Gegenden weit heftiger ist, und den Tod schneller nach sich zieht, als in den gemäßigten. Ich habe einen der größesten und schönsten von dieser Gattung gehabt, den mir die Marquise von Pompadour 1751 gegeben hatte; er fiel monatlich zwey bis dreymal, und bey alledem lebte er auf meinem Landgute in Burgund verschiedene Jahre, und würde noch länger gelebt haben, wenn man ihn nicht getödtet hätte; aber in dem mittäglichen Amerika sterben diese Vögel gemeiniglich an der fallenden Sucht, wie alle andere Papageyen, die ihr ebenfalls in ihrem Hausthierstande ausgesetzt sind. Es ist, wie ich in dem Artikel von den Kanarienvögeln gesagt habe, wahrscheinlich, daß die Beraubung des Weibchens und der Ueberfluß der Nahrung ihnen diese Anfälle verursachen, gegen welche die Wilden, die sie in ihren Hütten aufziehen, um mit ihren Federn zu handeln, ein sehr einfaches Mittel erfunden haben; dieses besteht darin, daß sie dieselben an dem Ende einer Zehe ritzen, und einen Tropfen Blut herauslassen. Der Vogel scheint auf der Stelle hergestellt zu seyn, und eben dieses Mittel gelingt bey vielen andern Vögeln, welche im Hausthierstande diesen Anfällen unterworfen sind. Man wird sich erinnern, daß in dem Artikel von den Kanarienvögeln, welche an dieser Seuche fallen, gesagt worden, daß sie sterben, wenn sie nicht einen Tropfen Blut durch den Schnabel von sich geben; es scheint, die Natur suche durch eben das Mittel zu heilen,

heilen, welches die Wilden erfunden haben. Man nennt in den Colonien diesen epileptischen Zufall Crampe, einen Krampf, und versichert, daß ihn alle Papageyen, die als Hausvögel leben, bekommen, wenn sie sich auf ein Stück Eisen, als auf einen Nagel, ein Stängchen u. d. gl. setzen, und man trägt deshalb große Sorge, daß sie nur auf Holz zu sitzen kommen; diese Thatsache, welche, wie man sagt, ganz sicher ist, scheint anzuzeigen, daß dieser Zufall, welcher nichts als eine starke Erschütterung in den Nerven ist, nahe an die Electricität stößt, deren Wirkung, wie man weiß, in dem Eisen weit stärker ist als in dem Holze.

Anhang.

Der Verfasser hält den großen und kleinen rothen Aras für eine Art, und zeigt den Unterschied der Farben nicht ausführlich an.

Die Abbildung des großen rothen Aras ist auch sehr verschieden von der Beschreibung; es ist die Abbildung nähmlich ganz roth ohne blaue Federn im Schwanze; blos die ersten Schwungfedern sind blau, die folgenden grün, roth und gelb, so auch die Flügeldecken. Der Steiß und Bürzel sind etwas kupferroth. Hiermit kommt **Fermins** Beschreibung noch am mehrsten überein. **Scopoli** beschreibt ihn fast wie der Verfasser; die ersten vier Schwanzfedern waren blau, und die mittelsten roth, mit einer länglichen blauen Spitze. So paßt auch **Bankrofts** Beschreibung des roth und blauen Makaws, (welchen **Marrini** aus Versehen Psittacus severus genannt hat) auf die **Büffonsche** Beschreibung. Bey dem Ritter von **Linné** sahe ich zu Upsala im Gerichtshause drey boshafte Thiere dieser Art und von solchen Farben. Auch habe ich einen auch gegen Fremde sehr zahmen sogenannten westindischen Raben gesehen, welcher sehr verliebt in die Büffonsche Abbildung zu seyn schien, sie wenigstens oft küßte, wenn ich sie

ihm vorhielt, auch ziemlich deutlich Karl mein Herr und einige andere Wörter ausprach, und beynahe solche Farben hatte, wie Herr Götz 2)

2) Diese Beschreibung des Herrn Götz verdient hier angeführt zu werden. Er sagt: „Der obere Theil des Schnabels ist gelblich weiß, die Spitze schwarz, an der Wurzel die untere Hälfte dieses Obertheils schief herunter gleichfalls schwarz, und von da bis an die schwarze Spitze der Rand zu beyden Seiten hellschwarz. Der Unterschnabel ist ganz glänzend schwarz. Er ist von außen hohl, so daß, wenn man den Kopf rückwärts beugt, man wie in einen Sack an diesem Unterschnabel hineinsehen kann. Diesen Sack bildet die Haut, welche an dem untern Theil der Zunge und am innern Theile des Unterschnabels angewachsen und durchsichtig ist. Die Nasenlöcher sind oval, unterwärts noch innerhalb der Federn versteckt, doch so, daß vornher die Haut nackt ist, so daß man kaum die eine Seite der Nasenlöcher blos sieht; die Zunge ist dick, fleischigt, vorne rund, wie abgestumpft, schwarz; in der Mitte ist der Länge nach eine kleine Vertiefung; ohngefähr einen Zoll von der Spitze an nach hinten zu bildet sich eine lange, breite Höhle, in welcher der Anfang des Schlundes liegt, der, wenn der Vogel die Zunge ausstreckt, als eine lange, schmale Spalte erscheint; gerade über dieser Spalte ist im Gaum eine andere tiefe Höhle, die etwas weiter erscheint, und an beyden Seiten fleischigt gezähnelt ist; die Ohren sind weit hinter den Augen, abwärts oval, von der Größe einer kleinen Erbse, mit orangegelben feinen Haaren besetzt; an dem Ende der untern Hälfte des Oberschnabels, und an dem ganzen Ende des Unterschnabels sitzt eine nackte, fleischfarbige Haut fest, die um die Augen herumgeht, sich sehr ausdehnen läßt, und daher, wenn der

sie an ihm beschreibt, nur nicht so vieles Blau im Schwanze. Von diesem großen rothen Ara habe ich

Schnabel geschlossen ist, viele Runzeln hat, welche die Fleischfarbe schön schattiren. Fast in der Mitte dieser schwarzen Haut sitzen die schwarzen Augen, die einen gelben Ring und eine gelbliche, mit einem schwarzen Rande eingefaßte Nickhaut haben. An einem Exemplare, das Hr. Gerning besitzt, befinden sich auf dieser fleischfarbigen Haut breite schwarze Streifen, die in der Form eines Sterns vom Auge, das der Mittelpunkt des Sterns ist, ausgehn, und nach dem Ende zu immer breiter werden. — Die Stirne ist mit feinen, dichten, rothen Haaren bewachsen. Der obere Kopf, der Hinterkopf, Hals, Brust, Bauch, Schenkel, die obern Deckfedern des Rückens und der Flügel sind schön scharlachroth; in jedem Flügel befinden sich 21 Schwingfedern von äußerst schöner glänzender ultramarin und Königsblauen Farbe, so daß die Spitzen der Fahnen prächtig ins Grüne schillern; der Schaft ist schwarz; die erste Schwingfeder hat auf der schmalen Fahne hier und da schwärzliche Flecken; die vierte ist die längste; die breite Fahne aller Schwingfedern ist, so weit sie zugedeckt ist, wenn der Flügel zusammenliegt, grauschwarz; die sechste hat wieder an der schmalen Fahne schwarze Flecken, so wie die neunte, zehnte, eilfte, sechszehnte und siebzehnte; die innere Seite der Schwingfedern ist zinnoberroth, so daß die Enden der Fahnen der erstern ins Gelbe, der übrigen ins Saftgrüne schillern; die Pflaumfedern sind gränlich; die obersten kleinsten Deckfedern sind schön scharlachroth; von den folgenden etwas längern sind die 2 oder 3 ersten seladongrün, auf der schmalen Seite der Fahne mit einem rothen Flecken, die übrigen haben einen gelblichen Flecken, der immer stärker wird, so daß sie endlich ganz gelb werden, und nur die äußer-

sten

ch noch einen lebendig und mehrere todte ausgestopfte gesehen, aber keinen von den kleinen, die also wohl seltener sind.

Der sten Spitzen grün werden; endlich von den längsten Deckfedern sind die vordern wie die Schwingfedern; die hintern gelb, gegen die Spitze grün und dann blau; liegt nun der Flügel zusammen, so ist dies eine vortrefliche Mischung von blau, grün, roth, gelb und schwarz, an der sich das Auge nicht satt genug sehen kann, um die herrliche Schönheit der Natur zu bewundern. Die Kiele der gelblichen Deckfedern sind roth, der Rücken ist himmelblau, die Seitenfedern hinter den Schenkeln roth, grün und hellblau vermischt; von den zwölf Ruderfedern sind die zwo mittelsten die längsten, scharlachroth, an der Spitze hell, die folgenden auf beyden Seiten sind auch roth, sie haben aber eine blaue Spitze, die sich etwas weiter hinaufzieht, aber immer matter wird, bis sie sich ganz verliert; die folgenden sind auf beyden Seiten nur oben röthlich; die untere Hälfte aber ist blau wie der Flügel, die 3 folgenden zu beyden Seiten sind wie die Schwingfedern gefärbt. Paarweise haben diese Ruderfedern einerley Größe, die nach außen zu abnimmt; ihr Schaft ist schwarz; ihre Deckfedern, deren Schaft braun ist, blau wie der Rücken; die innere Seite aller Ruderfedern ist wie die innere Seite der Schwingfedern, nur daß diese mehr in das Grüne und das Gelbe schillern; die Federn unter dem Schwanze sind blau; der Vogel hat 4 Zehe, 2 nach vorne, 2 mehr auf die Seite als nach hinten, sie sind grau und schwarz geschuppt; die Klauen scharf und schwarz; die äußere Vorderzehe ist die längste, dann die äußere Hinterzehe.

Um die Größe dieses Vogels desto genauer zu bestimmen, so habe ich einige Ausmessungen nach dem rheinländischen Duodezimalschuh von ihm genom-

Der kleine rothe Ara hat in der Büffonschen Abbildung weniger und nicht so starkes Rothes. Nur die Kopfplatte und der untere Theil des Vogels ist roth, und an den Lenden und am Steiße haben die Federn schon am Ende grünliche Ränder, so wie die etwas dunkleren Rückenfedern. Der Schnabel ist gänzlich schwarz, die Füße sind schwärzlich; die nackte Haut um den Augen ist weiß;

nommen. Der Bogen des obern Schnabels mißt 3½ Zoll von der Spitze bis an die Wurzel, von der Spitze des Schnabels bis an die Spitze des Schwanzes 3 Schuh; die längsten Schwanzfedern 2 Schuh; die Flügel ausgebreitet von einer Spitze zur andern 3 Schuh, 11 Zoll.

Da der untere Theil des Schnabels um vieles kürzer ist, als der obere Theil, so geht der Papagey, wie ich selbst bemerkt habe, beym Fressen folgendergestalt zu Werke. Wenn er etwas zum Fressen oder Saufen nehmen will, so faßt er es in der Spitze des obern Theils des Schnabels, und hohlt es mit der Zunge nach. Hat er etwas zu zerbeißen, so geschieht dies mit der Spitze des untern Schnabels, (wiewohl man dies keine Spitze eigentlich nennen kann, indem dieser Theil rund ist,) den er in den obern Theil des Schnabels drückt. Wenn man ihm Zucker oder sonst etwas hartes zu fressen giebt, so nimmt er es zwischen die Finger; er bringt dann die äußere Hinterzehe nach vorne zu, und mit dieser und der äußern Vorderzehe faßt er den Fraß eben so, wie Klein von dem Eisvogel erzählt.

Wenn diese Art Papageyen ein wenig Fleisch bekommen, so beißen sie sich immer die Federn aus; Petersilien ist ihnen, so wie allen Papageyen, ein Gift, auch bittere Mandeln sind ihnen schädlich, wovon sie aber doch durch süßes Mandelöl geheilt werden können. Naturf. XIX. a. a. O.

weiß; oben ist der Hals gelb; das vorderste Flügelgelenk hat violette braune Deckfedern; die ersten Schwungfedern, die obersten Schwanzdecken und die äußersten Ruderfedern sind blau; die mittelsten längsten Ruderfedern sind braunroth. — Unter den Beschreibungen paßt die von Bankrofts roth und gelben Mackav noch am besten auf diesen Vogel. Er ist kleiner als der vorige, selbst in Guiana, wo er doch einheimisch ist, ein wenig selten. Beyde Theile seines Schnabels sind schwarz; die Federn an dem obern Theil der Flügel gelb; die auf dem Wirbel des Kopfs und an der Brust roth, und die langen Federn in den Schwingen und dem Schwanze blau und roth. Bancr. Guiana a. a. O.

Der

Der blaue Ara x) 1).

Zweyte Gattung.

Buff. pl. enl. 36.

Die Namensammler haben auch hier zwey Gattungen aus einer gemacht; sie haben den ersten den blau und gelben Ara von Jamaika 2), und

x) Psittacus maximus cyanocroceus. *Aldrovande, Av.* tom. I. p. 663. — Rotgelber papagey. Psittacus cyanocroceus. *Schwenckfeld, Av. Sileſ.* p. 343. — Ararauna Braſilienſibus. *Marcgrave, Hiſt. Braſ.* p. 206. — Canide. *Lery, Voyage au Breſil.* p. 170. — Canidas. *Coréal, Voyage aux Indes occidentales.* p. 176. — Guacamayas. *Garcilaſſo de la Vega. Hiſt. des Incas*, tom. p. 282. — Guaçamayas. *Acoſta Hiſt. Nat. des Indes.* p. 197. — Carinde. *Thevet, Sing. de la France antarct.* p. 92. — The great blue and yellow parrot, called the Machao and cockatoon, rectius cahatoon a voce. Psittacus maximus cyanocroceus. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 1. et Onomaſt. p. 66. n. 1. — Psittacus maximus cyanocroceus. *Jonſton, Avi.* p. 21. — Ararauna Braſilienſibus. *Ibid.* p. 141. — Ararauna Braſilienſibus *Marcgravii, Macao* dictus. *Willughby, Ornithol.* p. 73. — Psittacus maximus cyanocroceus Aldrovandi

Der blaue Ara.

S. 238.



Prüff. Vögel XIX. Th. v. Buff. fol. Pl. 36.

und den andern den blau und gelben Ara von Braſilien 3) genannt; allein dieſe zwey Vögel ſind

vandi. *Ibid.* p. 72. — Pſittacus maximus cyanocroceus Aldrovandi, *Ray Synopſ. Av.* p. 28. n. 1. — Canide lorii, *Ibid.* p. 181. n. 5. — Pſittacus maximus alter Jonſtonii, ararauna Braſilienſibus, Marcgravii Kararaoua, aras bleue. *Barrere Franc. equinox.* p. 145. — Pſittacus maximus cyanocroceus Jonſtonii, *Idem Ornithol.* Claſſ. III. Gen. 2. Sp. 6. — Blew Macaw, femelle du perroquet de Macao. *Albin*, tom. III. p. 5. — The great Maccaw. Pſittacus maximus Aldrovandi. *Sloane, Voy. of Iamaic.* p. 266. — The blue and yellow Maccaw. Pſittacus maximus cyanocroceus. *Edw. Hiſt. of Birds.* p. 159. (t. 159.) Pſittacus macrourus ſupra caeruleus, genis nudis, lineis plumoſis. Pſittacus ararauna. *Linn. Syſt.* ed. X. p. 96. — Pſittacus vertice viridi, cauda cyanea. *Klein, Avi.* p. 24. n. 2. — Pſittacus maximus caeruleo varius, cauda producta. *Browne, Hiſt. Nat. of Iamaic.* p. 274. — Blue and yellow Maccaw. *Nat. hiſt. of Guyane.* p. 155. — Pſittacus major longicaudus, ſuperne cyaneus, inferne croceus; ſyncipite viridi; taenia transverſa ſub gutture nigra; genis nudis, candidis, lineis plumoſis nigris ſtriatis; rectricibus inferne luteis; ſuperne cyaneis, lateralibus interius ad violaceum inclinantibus. . . . Ara Braſilienſis cyaneo crocea. *Briſſon* p. 193. et pl. 20.

Pſittacus major longicaudus ſuperne cyaneus, inferne croceus, genis nudis candidis, rectricibus ſuperne cyaneis inferne croceis. Ara Iamaicenſis cyano-crocea. *Briſſon ornith.* tom. IV. p. 191.

Le grand perroquet bleu. *Salerne Ornithol.* p. 62.

V.

1) Pſittacus (Ararauna) ſupra caeruleus, ſubtus luteus, genis nudis, lineis plumoſis. *Linné* Syſ. XIII. 1. p. 313. n. 3. α.

sind nicht nur von einer Gattung, sondern auch aus einerley Gegenden in dem heißen Klima des mittäglichen Amerika; der Irrthum dieser Namensammler kommt wahrscheinlich daher, daß Albin den ersten von diesen blauen Aras für das Weibchen des rothen Ara gehalten hat; und da man erkannt hat, daß er nicht von dieser Gattung war, so hat man geglaubt, er könne von dem gemeinen blauen Ara unterschieden seyn, allein es ist ganz gewiß eben der Vogel; dieser blaue Ara hält sich mit dem rothen an einerley Orten auf; er hat einerley natürliche Gewohnheiten mit ihm, und ist wenigstens eben so gemein. Seine Beschreibung ist

— Ara bleu. *Ferm. Surin.* 2. p. 174. Blaue Aras. Fermin Surinam 2. S. 153.

Ara bleu. *Buffon Oiseaux* VI. p. 191. Ed. in 12. XI. p. 267. n. 10.

Der blau und gelbe Makaw. Bankroft Guiana. S. 93.

Der Papagey mit grünem Scheitel und lasurblauem Schwanze. Scopoli Günther S. 20. n. 22. Scop. *Ann.* I. n. 22.

Der blau und gelbe P. Klein Ord. in 4to. S. 25. n. 2. in 8vo. p. 46.

Der blau und gelbe Papagey vom ersten Range. Seligmann Vögel VI. tab. 54. Bor. 2. p. 88. 1. tab. V. A. n. 65. Der blaugelbe Rabe. Müller Natursyst. 2. S. 127. n. 3. Halle Vögel p. 111. n. 22.

2) Ara jamaicensis cyaneo-crocea. *Brisson* l. c. Blue Maccaw. *Latham Synopf.* l. 1. p. 205. n. 4. A.

Psittacus Ararauna var. β. caeruleus. *Linné Syst. Nat.* XIII. 1. p. 314.

ist leicht zu machen, denn er ist ganz himmelblau oberhalb des Leibes, auf den Flügeln und dem Schwanze, und schön gelb unterhalb des Leibes y); das Gelbe ist lebhaft und satt, und das Blaue hat Wiederscheine und einen blendenden Glanz. Die Wilden bewundern diese Aras und besingen ihre Schönheit; das gewöhnliche Ende ihrer Lieder ist: **gelber Vogel, gelber Vogel, wie du so schön bist**

3) Ara brasiliensis cyaneo-crocea. *Briss.* l. c. Psittacus Ararauna. *Linné* l. c. p. 313. α.

y) An dem andern, Canidé genannt, ist das ganze Gefieder am Bauche und dem Halse wie feines Gold gelb; das Obertheil auf dem Rücken, die Flügel, und der Schwanz sind so schön blau, daß nichts darüber geht. Man könnte sagen, daß er unten in einem Goldzeuge gekleidet sey und darüber in einem violetten Mantel gehüllet sey. *Lery Voyage au Bresil.* Paris 1578. p. 171. Thevet bezeichnet die beyden Aras eben so gut: „Die Natur scheinet mit Vergnügen den schönen Vogel, den die Wilden Carinde nennen, gebildet zu haben, indem sie ihn mit so angenehmen und schönem Gefieder bekleidet hat, daß man ohnmöglich bey diesem Kunststücke ohne Bewunderung bleiben kann. Dieser Vogel ist nicht größer als ein Rabe, und sein Gefieder vom Bauche bis zur Kehle ist gelb, wie Gold; die Flügel und der sehr lange Schwanz sind fein lasurblau. Diesem Vogel ist ein andrer ähnlich an Größe, aber von verschiedner Farbe; er hat nähmlich statt des Gelben eine scharlachrothe Farbe, und übrigens eine lasurblaue.“ *Singularités de la France antarctique, par Thevet.* Paris, 1558. p. 92.

bist z). Die blauen Aras mengen sich nicht unter die rothen, ob sie gleich einerley Oerter besuchen, ohne Händel mit einander anzufangen; sie haben etwas verschiedenes in der Stimme; die Wilden kennen die rothen und die blauen, ohne sie zu sehen, blos an ihrem Geschrey; sie behaupten, diese sprächen das Ara nicht so deutlich aus a).

z) Canidé jouve, canide jouve, heura oncebe. *Lery* p. 173.

V.

a) Coréal bezeichnet die Aras mit den Namen Canidas und Arar, die sie, wie er sagt, in Brasilien führen. *Voyage aux indes occidentales.* Paris 1722. tom. I. p. 179.

Dampier bemerkt die von der Bay Allerheiligen unter dem Namen Makaw und Jackons. *Nouveau Voyage autour du monde.* Rouen 1715. tom. IV. p. 65.

V.

Ich habe einen blauen sogenannten westindischen Raben dieser Art in Kopenhagen gesehen, welcher sehr boshaft gegen Fremde war, und mit seinem scharfen Schnabel bisweilen tiefe Einschnitte in den Fingern machte, aber ziemlich gut das Wort Jacob aussprach, welches seiner natürlichen Stimme am ähnlichsten zu kommen schien, und vielleicht mögen sie deßfalls Jackons genannt seyn. Sein Gefieder ist übrigens ungleich schöner und glänzender als es hier abgebildet werden konnte.

V.

An-

Anhang.

Bankrofts Beschreibung dieses Vogels stimmt mit der Büffonschen überein, doch bemerkt jener, daß die Federn auf dem Kopfe grün sind, und sagt, wie auch in der Büffonschen Abbildung zu sehen, ganz richtig, die (weiße) Haut um die Backen und Augen herum ist mit schwarzen Federn gefleckt (gestreift); die Kehle ist mit einem schwarzen Ringe umgeben. **Bankr.** a. a. O.

Kleine Abweichungen bemerkt **Scopoli.** Er sagt: „Er ist oben blau, unten aber gelb, und hat ein schwarzes Halsband; die Backen haben schwarze mit Federn bewachsene Queerlinien; der Schnabel ist schwarz, die Stirn gelbblau; Flügel und Schwanz von unten gelb; der Bürzel himmelblau; die Dickbeine pomeranzenfarbig; die mittelsten zwey Schwanzfedern sind anderthalb Schuh lang."

Sc.

Herr **Schreber** bemerkte an diesem Vogel, (wie auch an dem großen rothen Ara) folgendes: „Der Schnabel hatte auf der untern Fläche der Spitze, von der Kerbe an sehr schmale und seichte Furchen, die von beyden Seiten des Randes schräg hinterwärts liefen, und unter Winkeln von ohnge-

fähr sechszig bis hundert Graden zusammenstießen; so daß die gedachte Fläche davon ein Ansehen, fast wie eine Feile bekam. Dieser Bau hilft dem Vogel den Mangel der Zähne ersetzen. Naturf. 19. S. 81.

Brissons Beschreibungen dieses Vogels aus Jamaika und desselben aus Brasilien sind in keinem wesentlichen Stücke verschieden. Bey dem aus Jamaika hat er die schwarze Kehle nicht angegeben, wie bey dem aus Brasilien.

O.

Der grüne Ara.

S. 245.

Brüff. Vögel XIX. Th. v. Brüff fol. Pl. 383.

Der grüne Ara b) r).

Dritte Gattung.

Buff. Pl. enl. 383.

Der grüne Ara ist viel seltner als der rothe und blaue; er ist auch weit kleiner, und man darf nur eine Gattung zählen, obgleich die Namen-

b) Maracana Brasilienſibus ſecunda. *Marcgrave, Hiſt. Nat. Braſil.* p. 207. — Maracana Braſilienſibus ſecunda Marcgravii. *Jonſton, Av.* p. 142. — Maracana Braſilienſibus, ſecunda Marcgravii. *Willughby Ornithol.* p. 74. — Maracana ararae, id eſt, Macai ſpecies minor. *Ray Synopſ. Av.* p. 29. n. 5. — The ſmall macaw. Maracana altera Braſilienſibus. *Sloane Voyag. of Iamaic.* p. 297. — The Braſilian green mackaw. L'ara vert du Breſil. *Edwards, Glan.* p. 41. Pl. 229. — Pſittacus major longicaudus, viridis; ſyncipite et taenia utrimque ſecundum maxillam inferiorem caſtaneo purpuraſcentibus; vertice caeruleo; marginibus alarum coccineis; calcaneis rubro circumdatis; genis nudis, candidis, lineis plumoſis nigris ſtriatis; rectricibus ſuperne in exortu viridibus, apice caeruleis ſubtus obſcure rubris. . . . Ara Braſilienſis viridis. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 199. (n. 6.) —

sammler auch zwey gegeben haben, weil sie ihn mit einem grünen Sittich vermengt haben, den man Ara und Sittich genannt hat, weil er das Wort Ara ziemlich deutlich ausspricht, und einen viel längern Schwanz hat als die andern Sittiche; aber es ist nichts destoweniger ein wahrer Sittich, welcher in Cayenne sehr bekannt und sehr gemein ist, statt daß der grüne Ara daselbst so selten ist, daß ihn die Einwohner nicht einmal kennen, und, wenn man

Psittacus major longicaudus, saturate viridis; macula in syncipite fusca; vertice viridi-caerulescente; macula in alarum exortu miniata, genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus superne prima medietate viridibus altera cyaneis, subtus saturate rubris. . . . Ara Brasiliensis erytrochlora. *Ibid.* p. 202. (n. 7.) — Psittacus macrourus viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis, subtus purpurascentibus. . . . Psitracus severus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. Gen. 44. Sp. 5. (XII. 1. p. 140. n. 6. XIII. 1. p. 316. n. 6.)

V.

1) Psittacus severus. *Linné Mus. Ad. Fr.* 1. p. 13. *Scop. Ann.* I. p. 27. n. 23. Der grüne Papagey mit unten rothen Flügeln und Schwanze. Scop. Günther p. 21. n. 23. Bor. 2. 89. 3.

Ara vert. *Buffon Oiseaux.* VI. p. 194. t. 8. Ed. in 12. Tom. XI. p. 271. n. 3. pl. 8. Ara vert du Bresil. *Buff. pl. enl.* 383.

Brasilianische grüne Papagey mit blauem Scheitel und rothen (langen) Schwanze. Psittacus s. Macao viridis brasiliensis. Seligmann Vögel VII. tab. 10. *Lath. Synops.* I. 1. p. 208. n. 9.

Der grüne brasilianische Papagey. Müller Natursyst. 2. S. 130.

O.

man ihnen von demselben sagt, glauben, es sey dieser Sittich. Sloane sagt, der kleine Macao oder der kleine grüne Ara sey in den Wäldern auf Jamaika sehr gemein; allein Edwards merkt mit Recht an, daß er sich geirrt hat, weil er bey aller Mühe, die er sich gemacht hat, durch seine Correspondenten doch niemals mehr als einen hat auftreiben können; da doch, wenn er auf Jamaika gemein wäre, viele nach England kommen würden. Dieser Irrthum des Sloane kommt vermuthlich daher, daß er, wie die Namensammler den grünen Sittich mit langem Schwanze mit dem grünen Ara vermengt hat. Uebrigens habe ich diesen grünen Ara lebendig; ich habe ihn vom Herrn Sonini von Manoncour bekommen, welcher ihn auf Cayenne von Wilden von Oyapoc, wo er im Nest gefangen worden, erhalten hat. Seine Länge von der Schnabelspitze bis ans Ende des Schwanzes beträgt ohngefähr 16 Zoll; sein Körper hat sowohl oben als unterhalb eine grüne Farbe, welche, je nachdem man sie aus einem Gesichtspunkt betrachtet, entweder glänzend und vergoldet, oder dunkel olivenfarb erscheint; die großen und kleinen Schwungfedern sind aquamarinblau auf einem braunen Grunde, und ihre Unterseite ist kupferroth; die Unterseite des Schwanzes hat eben diese rothe Farbe, die Oberseite bemalt ein in Olivengrün zerschmolzenes Aquamarinblau; das Grüne des Kopfes ist lebhafter, und weniger mit Olivenfarb vermengt als der übrige Körper; an der Wurzel des Oberschnabels, auf der Stirne ist eine schwarze Einfassung von kleinen faserichten Federchen, welche Haaren gleichen; die weiße, nackte Haut, welche die Augen umgiebt, hat eben-

falls kleine Bürstchen von diesen schwarzen Haaren, die in Linien stehen; der Regenbogen im Auge ist gelblich. Dieser eben so schöne als seltne Vogel ist auch wegen seinen geselligen Sitten und seinem sanften Naturell liebenswürdig; er wird bald mit Personen, die er oft sieht, bekannt; er liebt ihre Schmeicheleyen, und scheint sie erwiedern zu wollen, von fremden aber erduldet er sie nicht, am allerwenigsten aber von Kindern, die er lebhaft verfolgt, und über die er sich herwirft; er kennt bloß seine Freunde. Wie alle Papageyen, die man im Hause erziehet, setzt er sich auf den Finger, sobald man ihm denselben anbietet, er setzt sich auch auf Holz, aber im Winter und sogar im Sommer, wenn es kühl und regnerisch ist, ist er lieber auf dem Arm oder auf der Schulter, zumal wenn die Kleider von Wolle sind; denn überhaupt scheint er sich am liebsten auf Tuch oder auf Zeugen von dieser Art aufzuhalten, welche am besten vor der Kälte schützen; auch hält er sich gern auf den Küchenheerden auf, wenn sie noch nicht ganz kalt sind, und noch eine angenehme Wärme erhalten. Aus eben dem Grunde scheint er es zu vermeiden, sich auf harte Körper zu setzen, die Kälte mittheilen, dergleichen Eisen, Marmor, Glas und dergleichen sind, und er schauert und zittert sogar im Sommer bey kalter und regnerichter Witterung, wenn man ihm Wasser auf den Körper gießt; indessen badet er sich gern in großer Hitze und taucht seinen Kopf ins Wasser. Wenn man ihn ein wenig kratzt, so streckt er die Flügel aus und setzt sich zusammen, und alsdann läßt er sein unangenehmes Geschrey hören, welches dem Geschrey des Hähers ziemlich ähnlich ist, indem er dabey die Flügel aufhebt und

die Federn sträubt; und dieses gewöhnliche Geschrey scheint sowohl sein Ausdruck des Vergnügens als des Verdrusses zu seyn; zu einer andern Zeit hat er ein kurzes und hohes Geschrey, welches weniger zweydeutig ist als das erstere, und welches Freude und Zufriedenheit ausdrückt, denn er läßt es gemeiniglich hören, wenn man ihn anredet, oder wenn er Leute kommen sieht, die er liebt. Indessen drückt er doch auch durch eben dieses Geschrey seine Ungeduld und seine üble Laune aus. Uebrigens ist es nicht möglich, etwas gewisses über das verschiedene Geschrey dieses Vogels und seines gleichen festzusetzen, weil man weiß, daß diese Thiere, welche so organisirt sind, daß sie Geschrey, Pfeifen und sogar die Sprache nachahmen können, fast jedesmal die Stimme verändern, so oft sie einige Töne hören, die ihnen gefallen, und welche sie nachmachen können. Dieser ist sehr eifersüchtig, zumal ist ers über kleine Kinder, die er Theil an den Schmeicheleyen und Wohlthaten seiner Gebieterinn nehmen sieht; wenn er eins bey ihr sieht, so breitet er gleich die Flügel aus, und wirft sich über dasselbe her; da er aber nur einen kurzen und schwerfälligen Flug hat, und sich zu fürchten scheint, er möchte unterweges fallen, so schränkt er sich darauf ein, daß er ihm sein Mißvergnügen durch Gebehrden und unruhige Bewegungen, und durch ein durchdringendes und wiederhohltes Geschrey bezeugt, und er setzt diesen Lärm so lange fort, bis es seiner Gebieterinn gefällig ist, das Kind von sich zu lassen, und ihn auf den Finger zu nehmen; alsdann bezeugt er ihr seine Freude durch ein vergnügtes Murmeln, und zuweilen durch eine Art von Ausplatzen, welches vollkommen das ernsthafte

lachen einer alten Person nachahmt; er liebt eben so wenig die Gesellschaft anderer Papageyen, und wenn man einen in das Zimmer setzt, in welchem er wohnt, so hat er keine Ruhe, bis man ihn von dem Gesellschafter befreyet. Es scheint also, dieser Vogel wolle mit keinem, wer es auch sey, die geringste Liebkosung, noch die kleinste Gefälligkeit von denen theilen, die er liebt, und daß die Art der Eifersucht nur von der Zuneigung herkommt. Dies wird dadurch glaublich, daß, wenn jemand anders als seine Gebieterinn diesem Kinde schön thut, gegen welches er in so schlimme Laune geräth, er sich darum nicht zu bekümmern scheint, und zeigt nicht die geringste Unruhe darüber. Er frißt beynahe von alle dem, was wir essen; Brod, Rindfleisch, gebratene Fische, Backwerk und Zucker sind vorzüglich nach seinem Geschmack, doch scheint er ihnen gekochtes Obst vorzuziehen, welches er begierig verschlingt, wie auch die Haselnüsse, welche er mit seinem Schnabel zerbricht, und sie hernach in seinen Pfoten auseinander macht, um das herauszunehmen, was eßbar ist; die zarten Baumfrüchte saugt er aus, statt sie zu kauen, indem er sie mit der Zunge gegen die obere Kinnlade des Schnabels drückt; was die andern nicht so zarten Nahrungsmittel betrifft, als Brod, Backwerk u. s. w. zermalmt oder zerkaut er so, indem er das Ende des Unterschnabels gegen den hohlsten Ort des Oberschnabels anstemmt; seine Nahrung aber mag bestehen, worin sie will, so sind seine Auswürfe allezeit grün, und mit einer Art von weißer Kreide vermengt gewesen, wie bey den meisten andern Vögeln, außer wenn er sich nicht wohl befand, zu welcher Zeit sie orangenfarben oder gelblich waren.

ren. Uebrigens bedient sich dieser Ara, wie alle andere Papageyen, seiner Pfoten sehr geschickt; er bringt den hintern Zeen vorwärts, um Früchte und andere Bissen, die man ihm giebt, zu fassen, zu halten, und sie hernach zum Schnabel zu bringen. Man kann also sagen, daß sich die Papageyen ihrer Zehen fast wie die Eichhörnchen oder Affen bedienen; sie bedienen sich ihrer auch, um sich aufzuhängen oder anzuklammern; der grüne Ara, von welchem hier die Rede ist, hieng sich fast immer so an die Dräte seines Bauers auf, wenn er schlafen wollte. Die Papageyen haben noch eine andere gemeinschaftliche Gewohnheit, welche wir bey mehrern verschiedenen Gattungen bemerkt haben; sie gehen weder, noch klettern sie auf oder ab, ohne damit anzufangen, daß sie sich anhacken oder mit ihrer Schnabelspitze forthelfen; hernach rücken sie mit ihren Pfoten vorwärts, um sich ihrer als des zweyten Ruhepunkts zu bedienen; nur wenn sie auf dem ebenen Boden gehen, bedienen sie sich also ihres Schnabels nicht, um von einem Orte zum andern zu gehen. Die Nasenlöcher sind bey diesem Ara nicht, wie bey den meisten übrigen Papageyen sichtbar; statt auf dem in die Augen fallenden Horn des Schnabels zu sitzen, sind sie unter den ersten kleinen Federchen verborgen, die das Grundstück der obern Kinnlade bedecken, welche sich erhebt, und an der Wurzel eine Höhlung macht; wenn sich der Vogel Mühe giebt, einige schwere Töne nachzuahmen, bemerkt man auch alsdann, daß sich seine Zunge gegen das Ende zurückbiegt, und wenn er frißt, biegt er sie auf eben die Weise; ein Vermögen, welches den Vögeln versagt ist, die einen geraden Schnabel und

eine spitzige Zunge haben, und welche sie nicht anders bewegen können, als daß sie dieselbe nach der Richtung des Schnabels zurückziehen oder vorwärts strecken. Uebrigens ist dieser kleine grüne Ara so stark und vielleicht stärker als die meisten andern Papageyen; er lernt leichter reden, und spricht deutlicher aus als der rothe und blaue Ara, er hört den andern Papageyen zu und unterrichtet sich mit ihnen; sein Geschrey ist ohngefähr dem Geschrey der andern Aras gleich, doch ist seine Stimme nicht völlig so stark, und spricht das Ara nicht so deutlich aus. Man behauptet, die bittern Mandeln seyn den Papageyen tödtlich, allein ich habe mich nicht davon überzeugt, ich weiß nur, daß Petersilien, wenn sie ihn auch nur in geringer Menge genießen, und den sie sehr zu lieben scheinen, ihnen nicht gut bekömmt; sobald sie welchen gefressen haben, läuft eine dichte und klebrichte Feuchtigkeit aus ihrem Schnabel, und sie sterben hernach in weniger als einer oder zwey Stunden.

Es scheint, daß man in der Gattung des grünen Ara eben die Verschiedenheit der Rassen oder der Individuen antreffe, die man in der Gattung der rothen Aras wahrnimmt; wenigstens hat Edwards den grünen Ara c) nach einem Exemplar von der ersten Größe mitgetheilt, weil er den in Ruhe liegenden Flügel dreyzehn Zoll, und die mittlere Schwanzfeder funfzehn Zoll lang findet; dieser

c) The great green maccauw. *Glan.* part. III. pl. 313. pag. 224.

ser grüne Ara hatte eine rothe Stirne; die Schwungfedern waren blau, wie der untere Theil des Rückens und der Steiß, Edwards nennt die Farbe des einen Theils der Flügel und der Unterseite des Schwanzes dunkel orangenfarben; dies ist wahrscheinlich das düstere bronzierte Roth, welches ich in dem Futter der Flügel des grünen Ara gesehen habe; die Schwanzfedern waren bey Edwards Vogel oberhalb roth, und am Ende blau 2).

2) Nach Scopoli ist er auch ganz grün, die ersten sechs Schwungfedern sind himmelblau, die Schwanzfedern aber haben nur blaue Spitzen. Er hat die Größe eines Waldhehers, glatte Backen, durch welche mit Federn besetzte Striche laufen, und einen schwarzen Schnabel. Der Rand der Flügel ist bis zu ihrem Umfange roth, der Schwanz grün, und dessen mittelste Federn haben die Länge eines halben Fußes. Die Dickbeine sind mit röthlichen Federn eingefaßt. Scop. a. a. O.

Der schwarze Ara [1].

Vierte Gattung.

Dieser Ara hat ein schwarzes Gefieder, mit glänzend grünen Wiederscheinen, und diese gemischte Farben sind denen auf dem Gefieder des Ani sehr ähnlich. Ich kann die Gattung dieses Ara bloß anzeigen, der den Wilden von Guyana bekannt ist, den ich mir aber nicht habe verschaffen können; ich weiß nur, daß sich dieser Vogel von den übrigen Aras durch einige natürliche Gewohnheiten unterscheidet; er kommt den Wohnplätzen niemals nahe, und hält sich bloß auf den dürren und unfruchtbaren Gipfeln der felsigten und steinigten Gebürge auf. Es scheint, daß de Laet von diesem Ara unter dem Namen Ararauna oder Macao geredet hat, von welchem er sagt: sein

1) L'Ara noir. *Buffon Oiseaux* VI. p. 202. Ed. in 12. XI. p. 282. n. 4.

Black Maccaw. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 206. n. 6.

Psittacus (ater) niger cum splendore viridi, rostro oculisque rubentibus, pedibus flavis. *Linné Syst. Nat.* XIII. 1. p. 314. n. 54.

O.

sein Gefieder sey schwarz, allein so gut mit Grün gemischt, daß es in den Sonnenstrahlen bewundernswürdig schimmere; er setzt hinzu, dieser Vogel habe gelbe Füße, einen röthlichen Schnabel und röthliche Augen, und halte sich blos in dem Innern des landes auf d). Brisson e) hat noch einen andern Ara aus einem Sittich gemacht, und ihn den bunten moluckischen Ara genannt; allein es ist bereits gesagt worden, daß es in Ostindien keine Aras gebe, und diesen Sittich habe ich in dem Artikel von den Sittichen aus der alten Welt abgehandelt.

d) *De Laet Descript. des Indes orientales.* p. 490.

V.

e) Ara moluccensis varia. *Brisson Ornith.* tom. IV. p. 197. n. 5. Psittacus atricapillus. *Linné Syst. Nat.* XIII. p. 317. n. 55. Büffons oben beschriebene große Sittich mit schwarzer Kopfbinde. n. 6.

Zusatz.

Zusatz.

Der große grüne Ara des Edwards 1).

Edw. tab. 313.
Seligmann IX. tab. 2.

Ich will hier gleich den großen grünen brasilianischen Papagey des Edwards folgen lassen, weil er von einigen zu den Aras gerechnet wird, und Linné ihn besonders aufgestellt hat.

Er ist langschwänzig, von grüner Farbe, aber die Flügel und der Bürzel sind blau; der Schwanz ist keilförmig und von rother Farbe, mit blauen Endspitzen der Ruderfedern; die Stirn ist roth, der

1) Great green Maccaw. *Edw. birds.* tab. 313. Der große grüne brasilianische Papagey. Psittacus magnus viridis. Le gros Arras vert. Seligmann Vögel IX. tab. 2.

Psittacus (militaris) macrourus viridis, alis caeruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis. *Linné Syst. Nat.* XII. 1. p. 139. ohne andere Schriftstellen. XIII. 1. p. 343. n. 2. Der grüne Husar. Müller Natursystem. 2. S. 127. Military Maccaw. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 202. n. 3.

Der grosse grüne Ara.

S. 256.

Krüger jun. del.

Brüff. Vögel XIX. Th. Seelig. IX. t. 2.

der Schnabel schwarz, und die nackten Backen haben befiederte Striche. Er ist von allen Papageyen der größte, sein Flügel dreyzehn, und der Schwanz funfzehn Zoll lang.

Herr Gmelin rechnet auch Bankrofts größten Papagey von Guinea hierher, welcher doch in einigen Stücken von dem Edwardischen abweicht. Er heißt in Guiana Acuche, ist beynahe so groß als ein Makav, und hat einen langen, schwachen und fleischfarbigen Schnabel. Der Leib hat sehr schöne erbsgrüne Federn; die auf dem Wirbel des Kopfs sind roth, so wie auch die obern Ränder der Flügel; der Schwanz ist lang, und besteht aus grünen, rothen und blaulich purpurfarbenen Federn. Diese Papageyen sind in Demerary sehr gemein, und sprechen oft sehr deutlich 2).

2) Largest guiana Parrot. *Bancroft Guiana.* p. 158. Der größte Papagey von Guiana. Bankroft Guiana. S. 95.

Die Amazonen und die Kriks.

Ich werde alle diejenigen Amazonen-Papageyen nennen, welche Roth auf dem Flügelgelenke haben; sie sind in Amerika unter diesen Namen bekannt, weil sie ursprünglich aus dem Amazonenlande kamen; diejenigen nenne ich Kriks, welche kein Roth auf dem Gelenke, sondern nur auf dem Flügel haben; auch dieses ist ein Name, welchen die Wilden von Guyana diesen Papageyen gegeben haben, welche auch selbst in Frankreich unter diesen Namen bekannt zu werden anfangen; sie unterscheiden sich noch weiter dadurch von den Amazonen, 1) daß das Grüne des Gefieders der Amazonen glänzend und sogar blendend ist, statt, daß das Grüne des Kriks matt und gelblich aussieht. 2) Daß der Kopf der Amazonen mit einem schönen sehr lebhaften Gelb bedeckt ist, da dieses Gelb bey den Kriks dunkel, und mit andern Farben vermengt ist. 3) Daß die Kriks ein wenig kleiner sind als die Amazonen, welche selbst viel kleiner sind als die Aras. 4) Die Amazonen sind sehr schön und sehr selten, statt daß die Kriks die gemeinsten unter den Papageyen sind, und am wenigsten Schönheit haben; außerdem findet man sie überall in großer Menge, die Amazonen hingegen nur in Para und einigen andern Gegenden,

die

die nahe am Amazonenflusse liegen. Da aber die Kriks Roth auf den Flügeln haben, so muß man sie hier in die Nähe der Amazonen bringen, bey welchen dieses Rothe das Hauptabzeichen ausmacht; sie haben auch einerley natürliche Gewohnheiten; sie fliegen beyde in zahlreichen Haufen, setzen sich in großer Anzahl an einerley Orten, und schreyen alle miteinander, daß man sie sehr weit hören kann; sie kommen auch in die Wälder, sie mögen in der Höhe oder in der Niedere, und sogar in den nassen Savanen liegen, wenn sie nur gemeine Palmbäume und Arouara haben, deren Früchte sie sehr lieben, wie auch die Früchte des elastischen Gummibaums, der Bananenbäume u. s. w. Sie fressen also von weit mehr Arten von Früchten als die Aras, welche sich gewöhnlich von den Früchten der Latanenpalmen nähren, und doch sind die Früchte der Latanenpalme so hart, daß man Mühe hat, sie mit dem Messer zu zerschneiden; sie sind rund, und so groß wie Rainettenäpfel. Einige Schriftsteller a) haben behauptet, das Fleisch der amerikanischen Papageyen nehme die Farbe und den Geruch der Früchte und Saamen an, von welchen sie sich nährten; sie hätten einen Knoblauchgeruch, wenn sie von der Frucht des Acaju gegessen hätten, einen Geschmack nach Muskaten und Gewürznelken, wenn sie von den Früchten des Indienholzes lebten, und ihr Fleisch werde

a) *Dutertre Hist. des Antilles.* tom. II. p. 251. *Labat Nouveaux Voy. aux iles de l'Amerique.* tom. II. p. 159.

schwarz, wenn sie sich von der Frucht des Genipa nähyrten, deren Saft zuerst helle wie Wasser ist, einige Stunden darauf aber schwarz, wie Dinte, wird. Sie setzen hinzu, daß sie, wenn die Goyaven [1]) reif, welche in der That sehr gut zu essen sind, sehr feiste werden; endlich, daß sie der Baumwollensaamen so berauscht, daß man sie mit den Händen fangen kann. Die Amazonen, die Kriks und die übrigen amerikanischen Papageyen, machen, wie die Aras, ihre Nester in die Löcher alter Bäume, die von den Spechten ausgehöhlt worden sind, und legen ebenfalls nur zwey Eyer, und zweymal des Jahrs, welche das Männchen und Weibchen wechselsweise brüten. Man versichert, daß sie ihren Nestern nie entsagen, und daß sie, wenn man auch ihre Eyer betastet und in den Händen gehabt hat, doch nicht aufhören, sie zu bebrüten, wie es die meisten übrigen Vögel thun. Zur Zeit ihrer Liebe versammeln sie sich haufenweise, legen in einem Strich zusammen, und suchen in Gesellschaft ihre Nahrung; wenn sie gesättiget sind, machen sie ein anhaltendes und lärmendes Gewäsche, verändern beständig den Platz, und gehen immer hin und her von einem Baum zum andern, bis die Dunkelheit der Nacht und die Ermüdung sie nöthiget, ruhig zu werden und zu schlafen. Morgens, sobald die Sonne anfängt zu scheinen, siehet man sie auf Aesten, die der Blätter beraubt sind; sie bleiben ruhig darauf, bis der Thau, der ihre Federn angefeuchtet hat, vergangen ist, und sie sich

1) Psidium Guajava.

sich wieder erwärmet haben; alsdann ziehen sie mit einem Geräusche, wie es die grauen Krähen machen, das aber weit stärker ist, ab; ihre Zeit zu nisten ist die Regenzeit b). Gewöhnlich nehmen die Wilden die Papageyen aus dem Neste, weil sie leichter zu erziehen sind und eher zahm werden; doch fangen sie, nach Labat, die Caraiben auch, wenn sie groß sind; sie bemerken, sagt er, die Bäume, auf welche sie sich Abends in großer Menge setzen, und, wenn es Nacht geworden ist, bringen sie in die Nähe des Baums brennende Kohlen, auf welche sie Gummi und grünen indianischen Pfeffer legen, dieses macht einen dicken Rauch, welcher die Vögel betäubt, daß sie zur Erde niederfallen; alsdann fangen sie dieselben, binden ihnen die Füße, und lassen sie aus ihrer Betäubung kommen, indem sie ihnen Wasser auf den Kopf schütten c). Sie schießen sie auch mit Pfeilen, die an den Spitzen mit Baumwolle bewickelt sind, ohne sie sehr zu verletzen d). Wenn man sie aber alt fängt, sind sie schwer zahm zu ma-

b) Wie Herr Borde, königl. Arzt zu Cayenne, versichert. V.

c) *Labat Nouveau voyage aux iles de l'Amerique.* tom. II. p. 52. V.

d) Die Wilden in Brasilien, welche vielen Fleiß auf das Bogenschießen wenden, haben sehr lange Pfeile, an deren Ende sie einen Flock Baumwolle festmachen, um die Papageyen damit niederzuschießen, ohne sie zu verwunden. Wenn sie dieselben aber betäubt haben, heilen sie dieselben. *Belon Nat. des Oiseaux,* p. 297.

machen; es giebt nur ein einziges Mittel, sie geschmeidig zu machen, daß man sie betasten darf; man bläset ihnen nämlich Tobacksrauch in den Schnabel, sie hauchen genug davon ein, um halb berauscht zu werden, und sind zahm, so lange sie trunken sind, worauf man eben dieses Einblasen wiederhohlt, wenn sie böse werden, und gewöhnlich hören sie in wenigen Tagen auf, es zu seyn; übrigens sind die wilden Papageyen sehr schlimm; sie beißen grausam, und lassen nicht los, und dies ohne gereitzt zu werden. Diese Papageyen, die alt gefangen worden sind, lernen niemals, als sehr unvollkommen, sprechen. Man macht eben die Operation mit dem Tobacksrauche, um sie zu verhindern, zu cancaniren, wie die amerikanischen Franzosen sagen, wenn sie ihr häßliches Geschrey ausdrücken wollen, und sie hören in der That auf zu schreyen, wenn man ihnen ziemlich Tobacksrauch eingeblasen hat. Einige Schriftsteller e) haben behauptet, die Papageyenweibchen lernten nicht reden, allein sie haben sich sehr geirrt; man unterrichtet sie so leicht als die Männchen, und sie sind sogar gelehriger und sanfter. Uebrigens sind unter allen amerikanischen Papageyen die Amazonen und die Kriks am fähigsten Erziehung anzunehmen und Sprache zu lernen; zumal, wenn sie jung gefangen worden sind. Da die Wilden unter sich einen Handel mit Papageyenfedern treiben, so eignen sie sich eine gewisse Anzahl von Bäumen zu, auf welche diese Vögel nisten; dieses ist eine

e) Frisch u. a.

eine Art von Eigenthum, davon sie Einkünfte ziehen, indem sie die Papageyen an Fremde verkaufen, und mit den Federn mit andern Wilden handeln. Diese Papageyenbäume kommen vom Vater auf Sohn, und sind oft das Beste unter ihrer unbeweglichen Erbschaft f).

f) *Fernandez hist. nov. Hispan.* p. 38.

Die Amazonenpapageyen.

Man kennt fünf Gattungen von denselben, verschiedne Spielarten nicht mitgerechnet. Die erste ist die Amazonin mit gelbem Kopfe; die zweyte der Tarabe, oder die Amazonin mit rothem Kopfe; die dritte die Amazonin mit weißem Kopfe; die vierte die gelbe Amazonin; und die fünfte der Aouroucouracu.

Der Amazonen Papagey mit gelben Kopfe. S.265.

Buff. l'öq. XIX B. *Brisson.*

Die Amazoninpapagey mit gelbem Kopfe g) [1]).

Erste Gattung.

Der oberste Theil des Kopfs dieses Vogels ist schön lebhaft gelb; die Kehle, der Hals, der obere Theil des Rückens, und die obern Deckfe-

g) Psittacus maior viridis alarum costa superne rubente. Perroquet amazone. *Barrère France equinox.* p 144.

Perroquet de la riviere des amazones. *Labat Nouveaux voy. aux iles de l'Amerique.* tom. II. p. 217.

— Psittacus macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis. Psittacus nobilis. *Linn Syst. Nat.* ed X. p. 97. XII. I. p. 140. n. 5. Psittacus major brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, colli pennis in apice nigro marginatis; vertice luteo; remigibus quinque intermediis exterius superne prima medietate rubris; rectricibus quatuor utrinque extimis, interius prima medietate rubris, dein saturate viridibus, apice luteoviridibus, rubro mixtis. . . . Psittacus amazonicus Brasiliensis. *Briss. Ornithol.* tom IV. p. 272. pl 26. fig. 1. (n. 35.)

dern der Flügel sind glänzend grün; die Brust und der Bauch haben eine grüne Farbe, die ein wenig ins Gelbe fällt; das vorderste Gelenk der Flügel ist lebhaft roth; die Flügelfedern grün, schwarz, violetblau und rothbunt; die beyden äußersten Ruderfedern an jeder Seite des Schwanzes haben am Anfange innere rothe Fahnen; darauf dunkelgrüne bis zu dem Ende, welches gelblich grün ist; die übrigen Ruderfedern sind dunkelgrün mit gelbgrünen Enden. Der Schnabel ist roth an der Wurzel, und übrigens aschgrau; die Regenbogenhaut im Auge ist gelb; die Füße sind grau, und die Nägel schwarz.

Wir bemerken noch, daß Linné diesem Papagey irrig nackte Backen beylegt, welches sehr unrecht die Amazonenpapageyen mit den Aras, welche

1) L'Amazone a tete jaune. *Buffon Oiseaux* VI. p. 208. Ed. in 12. tom. XI. p. 292. n. 1.

Yellow headed Amazons Parrot. *Latham Synopf.* I. 1. p. 282.

Pſittacus (ochrocephalus) viridis, vertice flavo, tectricibus alarum rubris, remigibus ex viridi, nigro, violaceo et rubro variis, rectricibus duabus extimis baſi intus rubris. *Linné Syſt. Nat. a Gmel.* XIII. 1. p. 339. n. 112.

Auch gehöret Scopoli große grüne Papagey mit rothen Schultern, Pſittacus nobilis, wohl hieher. *Ann. med* 1. p. 28. n. 24. teutſch. S. 22. n. 24.) ſo wie Pſittacus viridis remigibus rectricibusque introrſum caeruleis, phoeniceis et flavis. Grüner Paperl. *Kramer El. Auſtr.* p. 332. n. 3.

che allein dieses Kennzeichen haben, verwechselt 2); die Amazonen haben im Gegentheil Federn auf den Backen, das heißt, zwischen dem Schnabel und den Augen, und haben, wie alle übrige Papageyen, nur einen sehr kleinen Kreiß von nackter Haut um den Augen.

2) Linné sagt von seinem grünen Papagey mit nackten Backen und rothen Schultern, den er in der königl. Sammlung sahe: der Leib sey ganz grün, so groß als eine Turteltaube; die Biegung des Flügels scharlachroth; das Gesicht nackt und weiß; die Schwungfedern und die Ruderfedern des keilförmigen Schwanzes grün. Er sey aus Surinam. *Muf. ad. Frid.* 2. p. 13. Er erwähnt keiner gelben Farbe, noch des Rothen in den Flügeln; vielleicht war es eine andere Art.

Latham trennt diesen edlen Papageyen des Linné (den Amazonen des Müller Naturfyst. 2. S. 129. n. 5. Bor. 2. 93. 12.) auch, und nennt ihn Noble Parrot. *Lath Synopf.* I. 1. p. 207. n. 8. *Linn. Syst. Nat. a Gmel.* XIII. 1. p. 314. n. 5.

Anhang.

Scopoli nennt einen großen grünen Papagey mit rothen Schultern Psittacus nobilis. Er war in dem kayserlichen Thiergarten zu Wien, und in dem gräfl. Thurnschen Kabinet. Er war grün, hatte scharlachrothe Schultern, und die Schwanzfedern waren an der innern Seite etwas unter die Hälfte scharlachroth; der Schnabel hornfarbig, der Kopf gelb, der Nacken gelb und grün bunt; die Schwungfedern waren an einer Seite schwärzlich, und an der andern blau; der Vogel war so groß als eine Krähe. Scop.

Der gelbköpfigte Amazonen Papagey.

S. 269.

Brüff. Vögel XIX. Th. v. Brüff. fec. Pl. 312.

Spielarten oder Gattungen, welche den Amazonen mit dem gelben Kopfe sehr nahe sind.

Buffon Pl. enl. 312.

Es giebt noch zwey Gattungen, welche der, die ich erst beschrieben habe, sehr nahe kommen, und vielleicht bloß Spielarten sind. Die erste 1), die ich auf den illuminirten Platten (n. 312.) unter der Benennung des grünen und rothen Papageyen von Cayenne vorgestellt habe, ist noch von keinem Naturbeschreiber angezeigt worden, obgleich dieser Vogel in Cayenne unter dem Namen der Bastart, Amazonin oder Halbamazonin bekannt ist; man behauptet, er falle aus einer Vermischung eines Amazonenpapageyes mit einem andern Papagey. Er ist in der That bastardisirt, wenn man ihn mit der Gattung vergleichen will, von der ich erst geredet habe; denn er hat nicht das schöne

1) Perroquet vert et rouge de Cayenne. *Buffon pl. enl.* 312. *Buffon Oiseaux.* VI. p. 209. Ed in 12. XI. p. 294 var. 1.

Psittacus ochroleucus. *Linné Syst. Nat.* XIII. I. p. 339. n. 112. var. β.

schöne Gelb auf dem Kopfe, sondern nur ein wenig gelblich an der Stirne, gegen die Wurzel des Schnabels; das Grüne seines Gefieders ist auch nicht so glänzend, es ist gelblich grün, und es ist nichts als das Rothe der Flügel, welches jenem gliche, und auf eben dem Platze stehet; auch hat er eine gelbe Schattirung unter dem Schwanze; sein Schnabel ist röthlich, und die Füße sind grau; seine Größe ist dem vorigen Vogel gleich, und man kann nicht wohl zweifeln, daß er nicht sehr nahe an die Gattung der Amazonin gränzen sollte.

II.

Die zweyte Spielart ist zuerst von Aldrovand h) 2) angezeigt worden, und nach seiner Be-

h) Psittacus poikilorinchos. *Aldrovande, Av.* tom. I. p. 170. — Psittacus poikilorinchos. *Jonston, Av.* p. 22. — Psittacus poikilorinchos. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 5. et *Onomast.* p. 67. n. 5. — Psittacus poikilorinchus Aldrovandi, *Willughby Ornithol.* p. 74. Psittacus poikiloriochos Aldrovandi, *Ray Synopf. Av.* p. 30. n. 3. — Psittacus major brevicaudus viridis, inferne ad luteum vergens; vertice luteo; remigibus quibusdam intermediis exterius superne in medio rubris; rectricibus quatuor utrimque extimis in exortu exterius viridibus, interius luteis, dein rubris, versus apicem viridibus, apice luteis. . . . Psittacus Amazonicus poikilorinchos. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 270. (n. 34.)

2) Amazone a tete jaune. var. 2. *Buffon Oiseaux* VI. p. 210. Ed. in 12. XI. p. 295. 2.

Psit-

Beschreibung scheint sie von unserm Papagey sich nur durch die Farben des Schnabels zu unterscheiden, von dem dieser Verfasser sagt, er sey an den Seiten der obern Schnabelhälfte ockergelb, der obere Theil sey der Länge nach bläulich, und habe eine kleine weiße Binde gegen das Ende; der Unterschnabel sey in seiner Mitte auch gelblich, und übrigens durchaus bleyfarben; aber alle Farben des Gefieders, die Größe und die Bildung des Körpers, kommen vollkommen mit dem Amazonenpapagey mit gelbem Kopfe überein. Es scheint nicht zweifelhaft zu seyn, daß dieser Vogel nicht eine Spielart von dieser Gattung sey.

Psittacus ochrocephalus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. I. p 339. n. 112. var γ.

Der Harlequin. Halle Vögel p. 116. n. 33.

Der Tarabe, oder die Amazonin mit rothem Kopfe i) 1).

Zweyte Gattung.

Dieser Papagey, den Markgrav als einen natürlichen Brasilianer beschreibt, wird in Guiana nicht gefunden; der Kopf, die Brust, das Flügelgelenk, und das oberste der Flügel sind roth; wegen dieser Merkmale muß er zu den Amazonenpapageyen gezählt werden; das ganze übrige Gefieder ist grün; der Schnabel und die Füße sind dunkel, aschgrau.

i) Tarabe Brasiliensibus. *Marcgrave Hist. Nat Bras.* p. 207. — Tarabe Brasilianis. *Jonston Av.* p 142. — Tarabe Brasiliensibus Marcgravii. *Willughby* — Tarabe. *Ray Syno. f. Av.* p. 33. n. 5. — Psittacus major brevicaudus, viridis; capite gutture, collo inferiore, pectore et rectricibus alarum superioribus minimis rubris; rectricibus viridibus. . . . Psittacus Brasiliensis erythrocephalos. *Briss. Ornithol.* tom. IV p 240. (n 24.) — Tarabe. *Salerne Ornithol* p 68. n. 5.

1) Tarabé ou Amazone a tete rouge. *Buffon Oiseaux* VI. p. 211. Ed in 12. XI. p. 297. n. 2.
Psittacus (Taraba) viridis, capite, gula, jugulo, pectore et tectricibus alarum minoribus rubris. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1 p. 344. n 123.

Der Amazonen Papagey mit weissen Kopf.

S. 273.

Der Amazonen Papagey mit weissen Kopf.

S 273

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl 349.

Die Amazoninpapagey mit dem weißen Kopfe k) l).

Dritte Gattung.

Buff. pl. enl. 549. u. 335.

Am richtigsten würde man diesen Papagey die Amazonin mit der weißen Stirne genennet haben, weil nur dieser Theil des Kopfs weiß ist; zuwei-

k) Pſittacus leucocephalus. *Aldrovande Av.* tom. I. p. 670. — Quiltoton tertium pſittaci genus. *Fernandez Hiſt. nov. Hiſp.* p. 39. cap 117. — Papagallo. *Olina.* p. 23. — Pſittacus leucocephalus. *Jonſton Av.* p. 22. Pſittacus major. *Ibid.* pl. 14. — Pſittacus leucocephalus. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 7. et *Onomaſt.* p. 67. n. 7. — Pſittacus leucocephalus Aldrovandi. *Willughby Ornithol* p 75. — Pſittacus leucocephalus Aldrovandi, *Ray Synopſ. Av.* p. 31. n. 5. et p. 181. n. 7. — Pſittacns viridis albo capite. *Barrère Ornithol.* Claſſ. III. Gen. 2. Sp. 9. — Pſittacus viridis fronte alba, collo rubro. *Friſch* pl. 46. — Pſittacus viridis, fronte alba, collo rubro. *Klein*, p. 25. n 9. — Papaguayos que tienen in flucco de plumas blancas en el nacimiento del pico, de oviedo. *Sloane Iamaic.* p. 297. n. 8. — The white headed

zuweilen umfaßt auch dieses Weiße das Auge, und erstreckt sich bis auf den Wirbel des Kopfs, wie bey

headed parrot. Psittacus viridis capite albo. *Edw. hist. of Birds.* p. 166. Psittacus brachiurus viridis, remigibus caeruleis, fronte alba. . . Psittacus leucocephalus. *Linn. Syst. Nat.* ed X. p. 100. — Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice fusco marginatis; medio ventre rubro mixto; syncipite albo; vertice caeruleo rubris macnlis vario; genis, gutture et collo inferiore coccineis; rectricibus lateralibus rubris, apice viridibus, binis utrimque extimis superne exter us caerulescentibus. . . . Psittacus Martinicanus. *Briss. Ornithol.* tom IV p 242. (n. 26.) — Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice nigro marginatis; syncipite albo, collo inferiore dilute rubro, pennarum marginibus albis; ventre obscure purpureo; rectricibus quatuor utrimque extimis interius prima medietate rubris, altera luteis, viridiluteo terminatis, extima exterius caerulea . . . Psittacus Martinicanus gutture rubro. *Ibid.* 244. (n. 27.) — Perroquet a tête blanche. *Salerne Ornithol.* p. 65. n. 5.

V.

1) Amazone a tête blanche. *Buffon Oiseaux* VI. p. 212. tab. 9. Ed in 12. XI. p. 238. n. 3. tab 9.

Perroquet a front blanc du Senegal. *Buffon pl. enl.* n. 335. white fronted Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 279. n. 88. Der weißköpfige Papagey.

Psittacus viridis capite albo. Seligmann Vögel VI. tab. 61.

Psittacus (leucocephalus) viridis, remigibus caeruleis, fronte alba, orbitis niveis. *Linn. Syst. Nat.* XII. 1. p. 145. 30. XIII. 1. p. 338. n. 30. a.

Der Weißkopf. Müller Naturfyst. 2. S. 143. Bor. 2. 93. 11.

Per-

bey dem Vogel auf der 549sten Platte: oft deckt es nur die Stirn, wie bey dem Vogel auf der 335sten Platte. Die beyden vorgestellten Exemplare, welche eine Spielart in der Gattung anzuzeigen scheinen, unterscheiden sich noch durch den Ton der Farben, welches bey dem letztern Vogel ein dunkleres und herrschenderes Grün ist, und weniger schwarze Wellen hat; bey dem erstern ist es heller, mit gelblich vermischt, und auf dem ganzen Körper durch schwarze Festons unterbrochen: die Kehle und die Vorderseite des Halses sind schön roth; bey den andern ist diese Farbe nicht so schön, und nicht so weit verbreitet, aber er hat noch immer Flecken von dieser Farbe unter dem Bauche; bey beyden sind die großen Schwungfedern blau; die Schwanzfedern sind gelblich grün, und haben auf ihrer ersten Hälfte eine rothe Tinte. Man bemerkt auf dem vordersten Gliede des Flügels einen rothen Flecken, der, so zu sagen, das Abzeichen der Amazonen ist. Sloane sagt, man bringe diese Papageyen häufig von Cuba nach Jamaika,

Perroquet de la Martinique. *Buffon pl. enl.* 549. White headed Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 280. n. 88. A.

Pfittacus leucocephalus. *Linné* l. c. var. β.

Der grüne Papagey mit weißer Stirn des Frisch. Klein Ord. d. V. in 4to. S. 26. n. 13. in 8. S. 47. n. 9

Der Weißkopf mit blauem Wirbel des Edw. Klein Ord. d. V. in 4to. S. 27. n. 34

Der grünblaue Papagey mit weißer Stirn. Halle Vögel. p. 120. n. 41.

ka, und man finde sie auch auf St. Domingue. Man trifft sie auch in Mexiko, aber nicht in Guiana an. Herr Brisson hat zwey Gattungen aus diesem Vogel gemacht, und sein Irrthum kommt daher, weil er geglaubt hat, daß der weißköpfige Papagey, den Edwards mitgetheilt hat, ein anderer als der seinige sey: man wird sich davon überzeugen, wenn man die Edwardsche Platte mit unserer vergleicht, daß es eben derselbe Vogel sey. Ueberdies ist der martinikische Papagey, der durch P. Labat 1) angezeigt ist, und dessen oberer Theil des Kopfs schieferfarben und ein wenig roth ist, wie man siehet, von unserm Amazonenpapagey mit weißem Kopfe unterschieden, und es ist ohne Grund, daß Brisson gesagt hat, daß er mit ihm einerley Vogel sey.

1) Voyage aux iles de l'Amerique. tom. II. p. 214.

Die

Die gelbe Amazonen Papagey. S. 277.



Büff. Vögel. 19 B. Büff. Fol. Pl. 13.

Die gelbe Amazonin m) 1).

Vierte Gattung.

Buff. Pl. enl. 13.

Dieser Amazonenpapagey ist wahrscheinlich aus Brasilien, weil Salerne sagt, er habe einen gesehen, welcher portugiesische Wörter ausge-

m) Psittacus major brevicaudus, luteus; marginibus alarum et remigibus majoribus exterius in medio rubris; rectricibus quatuor utrimque extimis interius prima medietate rubris; altera pallide luteis. . . . Psittacus luteus. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 306. (n. 47.) Perroquet jaune. *Salerne Ornithol.* p. 69. n. 9.

V.

1) Amazone jaune. *Buffon Oiseaux* VI. p. 214. tab. 10. Ed. in 12. XI. p. 301. n. 4. tab. 10.

Perroquet jaune. *Buff. pl. enl.* n. 13. Aurora Parrot. *Latham Synopf.* l. 1. p. 301. n. 106.

Psittacus (Aurora) flavus, axillis alarum marginibus, remigibusque majoribus extrorsum in medio rubris. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 342. n. 50. *Mantiss* p. 524.

Glutpapagey. Müller Naturfyst. Suppl. S. 76. n. 48.

sprochen habe. Doch weiß ich nicht zuverläßig, ob der, den ich mittheile, aus Brasilien sey; das ist aber gewiß, daß er aus der neuen Welt kommt, und zu den Amazonen gehört, weil er das Rothe auf dem Gelenk der Flügel hat. Sein ganzer Körper und sein Kopf sind sehr schön gelb: auf dem Rande des Flügels roth, so wie auf den Schwungfedern und Seitenfedern des Schwanzes; der Regenbogen im Auge ist roth; der Schnabel und die Füße sind weiß.

Anhang.

Brisson schätzt ihn ohngefähr so groß als seinen Amazonenpapagey, ohngefähr einen Fuß lang, den Schnabel 11½ linie dick, 10½ linie lang; den Schwanz 4 Zoll lang; den äußersten Vorderzehen 17 linien, den inneren 1 Zoll; den äußersten Hinterzehen 15 linien, und den inneren 9 linien lang; die Flügelausbreitung 2 Z ½ Zoll; angelegt erreichen die Flügel ohngefähr zwey Drittheile des Schwanzes; die Sehe im Auge sey schwarz, die Regenbogenhaut und die Augenlieder roth; die Wurzel des Oberkiefers werde von einer nackten, weißen Haut, darin die Nasenlöcher liegen, umgeben. Er halte sich vielleicht in Mexiko oder Brasilien auf. Briß. a. a. O.

Der Ajurucurau n) [1]).

Fünfte Gattung.

Buff. pl. enl. 547.

Der Ajurucurau des Markgrav ist ein schöner Vogel, der sich in Guiana und in Brasilien aufhält; die Stirn ist bläulich, mit einer Binde von

n) Aiuru-curau prima species. *Marcgrave Hist. Nat. Brasil.* p 205. — Aiuru-curos. *De Laet. Descript. des Ind. occident.* p. 490. — Aiuru-curau. *Jonston Av.* p. 140. — Psittaci majoris seu mediae magnitudinis, Marcgravii prima species. *Willughby Ornithol.* p. 76. — Aiuru curaou. *Ray Synopf. Av.* p. 32. n. 1. — Psittacus major dorso flavescente. Crik. *Barrère France equinox.* p. 144. — Psittacus viridis, capite croceo, fronte cyanea. *Klein Av.* p. 25. — Psittacus viridis, capite luteo fronte caerulea. *Frisch.* pl. 47. — Psittacus brachiurus viridis fronte caerulea, humeris sanguineis. — Psittacus aestivus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. p 101. — Psittacus major brevicaudus, viridis; syncipite caeruleo, ad violaceum inclinante, vertice genisque luteis; remigibus quinque intermediis exterius superne prima medietate rubris, rectricibus utrimque extimis, interius rubris; taenia transverf

Der Ajurucuran.

S. 280.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 544.

von eben dieser Farbe über die Augen; das übrige vom Kopf ist gelb; die Federn an der Kehle sind gelb und bläulich grün eingefaßt; das übrige an seinem Körper ist hellgrün; der Rand des Flügels ist roth; die obern Deckfedern der Flügel sind roth; die Flügelfedern sind grün, schwarz, gelb, blauviolet und roth geschäckt; der Schwanz ist grün, wenn aber die Federn ausgebreitet seyn, so scheinen sie schwarz, roth und blau gefranzt zu seyn; der Regenbogen im Auge hat eine Goldfarbe; der Schnabel ist schwärzlich, und die Füße aschfarben.

versa saturate viridi notatis, apice viridi, luteis quatuor utrimque extimis extrorsus rubra macula insignitis. . Psittacus amazonicus. *Briss Ornithol.* tom. IV. p. 257. (n. 3.) Ajurucurau. *Salerne Ornithol.* p. 68.

V.

— 1) L'Aourou-couracu *Buffon Oiseaux* VI. p. 215. Ed. in 12. XI. p. 302 n. 5 *Buff. pl. enl.* 547. Perroquet amazone Common Amazons Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 284. n. 91.

Psittacus (aestivus) brachiurus, viridis luteo submaculatus, fronte caerulea, humeris sanguineis, orbitis incarnatis. *Linné Syst. Nat.* XII. 1. p. 146. n. 32. XIII. 1. p. 340. n. 32. α. Bunter Amazon. Müller Naturſyſt. 2. p. 144. n. 32.

Der grüne Papagey mit safrangelben Kopfe und lasurblauer Stirne. Klein Ord. in 8. S. 47. n. 10. in 4to. S. 26. n. 14. Halle Vögel. p. 118. n. 38.

O.

Spielarten des Ajurucurau.

Es giebt verschiedne Spielarten, die man zu dieser Gattung rechnen kann.

I. Der Vogel des Aldrovand, den derselbe unter dem Namen des grünen, schwarzschnablichten Papageyen o) 1) angezeigt hat, der beynahe in nichts

o) Psittacus viridis melanorinchos. *Aldrov.* tom. I. p 670. — Psittacus viridis melanorinchos. *Jonston Av.* p 22. — Psittacus menalorinchos. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 6. et *Onomast.* p. 67 n 6. — Psittacus viridis melanorinchos Aldrovandi. *Ray Synops. Av.* p. 30. n. 4. — Psittacus viridis melanorinchos Jonstonii *Barrère* Class. III G. 2. Sp. 8. — Psittacus medius viridis, oculis et rostro nigris, Iamaica parrot. *Browne Nat. hist. of Iamaica* p 473. Psittacus major brevicaudus, viridis, infetne ad luteum vergens; syncipite et gutture caeruleo viridibus; capite et pectore luteis; marginibus alarum et tectricibus caudae inferioribus coccineis; rectricibus viridi luteis. . . . Psittacus Iamaicensis icterocephalos. *Briss. Ornithol* tom. IV. p. 213. (n. 26.) — Perroquet vert a bec noir. *Salerne Ornithol.* p. 65.

1) Acurou-couracu. var. 1. *Buffon Oiseaux* VI. p. 216. Ed. in 12. XI. p. 304. var. 4.

Psitta-

nichts von diesem unterschieden ist, wie man sehen kann, wenn man die Beschreibung des Aldrovand mit der unsrigen vergleicht.

Psittacus aestivus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 340. var. β. *Lath. Synopf.* l. 1. p. 285. n. 91. A. ♀.

II. Eine zweyte Spielart ist ebenfalls ein Papagey, den Aldrovand angezeigt hat p) 1), der eine Stirn von aquamarinblau hat, mit einer Binde

p) Psittacus viridi alarum costa superne rubente. *Aldrov. Av.* p 668. — Toznene, primum genus Psittaci. *Fernandez Hist. nov. Hisp* p. 38. c. 117. — Psittacus viridi alarum costa superne rubente. *Hernandez Hist. nov. Hisp* p. 715. — Psittacus viridis alarum costa superne rubente. *Jonst. Av.* p. 22. — The great green parrot with red pinion feathers. Psittacus viridis cum alarum costa superne rubente. *Charleton Exercit.* p. 74. n. 4. et *Onomast.* p. 66. n. 4. — Psittacus viridis alarum costa superne rubente. Common parrot. *Wilughby Ornithol.* p. 74. — Psittacus viridis alarum costa superne rubente. *Ray Synopf. av.* p. 30. n. 2. et p. 181. n. 6.

Psittacus viridis alarum costa superne rubente Jonst. *Barrère Ornithol.* Class. III. Gen. 2. Sp. 5. — Psittacus viridis alarum costa superne rubente. *Sloane Voyag. of Iamaic.* p. 297. n. 7. — Psittacus medius viridis luteo quandoque varius, angulis alarum rubris. Main parrot. *Browne Nat. hist. of Iamaic.* p. 472. — Psittacus major brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, superne pennis in apice nigro marginatis; synciptte caeruleo-berillino; vertice pallide flavo; genis et gutture luteis; remigibus quinque intermediis exterius superne prima medietate rubris, luteo marginatis, altera viridibus, luteo terminatis. Psittacus amazonicus Iamaicensis. *Briss. Ornithol.* tom. IV.

p.

Binde von eben dieser Farbe über die Augen, worinn er sich bloß durch eine Nüance von der oben beschriebenen Gattung entfernt; der obere Theil des Kopfs ist auch blasser gelb; der obere Schnabel ist an der Wurzel roth, in der Mitte bläulich und an der Spitze schwarz; der untere Schnabel ist weißlich: alles übrige von der Beschreibung des Aldrovand giebt durchaus Farben an, die mit unserer fünften Gattung übereinkommen, wovon folglich dieser Vogel bloß eine Spielart ist. Man findet ihn nicht nur in Guiana, Brasilien und Mexiko, sondern auch in Jamaika, und er muß in Mexiko sehr gemein seyn, weil ihm die Spanier einen besondern Namen, Catharina q), gegeben haben; man findet ihn auch in Guiana, woher man ihn vermuthlich nach Jamaika gebracht hat, denn die Papageyen fliegen nicht gut genug, um eine

p. 276. (n. 36.) — Perroquet vert a ailes rougeatres. *Salerne Ornithol.* p. 64.

1) Acurou-couracu. var. 2. *Buffon Oiseaux* VI p. 217. Ed in 12. XI p. 305. var. 2. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 285. n. 91. ß.

Pfittacus aeſtivus. *Linné Syſt. Nat.* XIII. 1. p. 340. n. 32. var. γ.

q) Man unterscheidet auf Neuspanien mehrere schöne Arten der Papageyen; die Caterinillas haben ein gänzlich grünes Gefieder; die Loros sind auch grün, ausgenommen am Kopfe und den Enden der Flügel, welche schön gelb sind; die Pericos sind von gleicher Farbe, und haben nur die Größe eines Drosſels. *Hiſt. gener. des Voy.* tom. XII. p. 616.

eine ziemliche Reise übers Meer zu machen. Labat sagt sogar, sie gehen nicht von einer Insel zur andern; und man kenne die Papageyen der verschiedenen Inseln; also sind die Papageyen von Brasilien, Cayenne und dem übrigen Theil des festen landes von Amerika, die man auf den Inseln vom Wind und unter dem Wind findet, dahin gebracht worden, und man siehet keine oder sehr wenige von diesen Inseln auf dem festen Lande, wegen der Schwierigkeit, die die reißende Ströme im Meer dieser Ueberfahrt in den Weg legen, die man in sechs oder sieben Tagen von Terra firma nach den Inseln zurücklegen kann, und die von den Inseln nach dem festen Lande sechs Wochen bis zwey Monate erfordert.

III. Eine dritte Spielart ist diejenige, welche Markgrav unter dem Namen Ajurus uruca r) 1) beschrieben hat. Dieser Vogel hat eine Art von blauer Mütze auf dem Kopfe, die ein wenig mit schwarz vermischt ist, und in deren Mitte ein gelber Flecken ist; diese Anzeige kommt, wie man siehet, ganz gut mit unserer Beschreibung überein; der Schnabel ist bey seiner Wurzel aschen-

r) Aiuru-curuca. *Marcgrave Hist. Nat. Braſ.* p. 205. — Aiuru-curuca, psittaci tertia species Marcgravii. *Jonst av.* p. 141. — Psittaci majoris, seu mediae magnitudinis. Marcgravii tertia species, ajuru-curuca. *Willughby Ornithol.* p. 76. — Ajuru curuca *Ray Synopſ av.* p. 33. n. 8. — Psittacus major brevicaudus, viridis; capite superius caeruleo, nigro mixto; vertice et maculis infra oculos luteis; gutture caeruleo; rectricibus superne dilute viridibus, inferne viridi luteis. . . . Psittacus Brasilienſis cyanocephalos. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p 234. (n. 21.) — Ajuru curuca. *Salerne Ornithol.* p. 68.

V.

1) Acurou-couraou. var. 3. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 219. Ed. in 12. XI. p. 308. var. 3.

Psittacus aestivus. *Linné Syst. Nat.* XIII. 1. p. 340. n. 34. var δ. Blue topped Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1, p. 286. n. 91. C.

aschenfarben, und an seinem Ende schwarz; und dieses ist der einzige kleine Unterschied, den man zwischen diesen beyden Papageyen antrifft, daher man leicht glauben kann, dieser Vogel des Markgrave sey eine Spielart von unserer fünften Gattung.

IV.

Abart des Ajurucurau.

S. 289.

Krüger jun. del.

Prüff. Vögel XIX. Th. Seelig. VI. T. 37.

Edw. tab. 162.
Seligm. VI. tab. 57.

IV. Eine vierte Spielart, die ebenfalls Marcgrave) 1) anzeigt, und von der er sagt, daß sie der vorigen ähnlich sey, ist nichts destoweniger

1) Pſittacus, ſecunda ſpecies. *Marcgrave, Hiſt. Nat. Braſ.* p. 205. — Pſittaci ſecunda ſpecies. *Jonſt. Av* p. 140. — Pſittaci majoris ſeu mediae magnitudinis Marcgravi ſecunda ſpecies. *Willughby Ornithol.* p. 76. — Pſittaci ſecunda ſpecies Marcgravii *Ray Synopſ. av.* p. 33. n. 3. — Pſittacus viridis et luteus, capite cinereo. Barbadenſis. *Klein av.* p. 25. n. 24. Green and yellow parrot from Barbadoes. Parroquet des barbades. *Albin*, tom. III. p. 6. pl. II. — Green parrot from the weſt-indies. Pſittacus viridis major occidentalis. *Edw. hiſt. of Birds.* p. 162. — Pſittacus major brevicaudus, viridis; ſyncipite dilute cinereo; vertice, genis, gutture, collo inferiore, rectricibus alarum ſuperioribus minimis et cruribus luteis; remigibus intermediis exterius prima medietate rubris; rectricibus viridibus. . . . Pſittacus Barbadenſis. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 236. (n. 22.) Pſittacus major brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, pennis in apice nigro marginatis; collo ſuperiore et dorſo ſupremo luteo et rubro variis; ſyncipite caeruleo berillino; vertice pallide flavo; pennis et

niger wie die Vögel, die wir erst angeführt haben, von den Namensammlern als eine eigene Gattung angegeben worden, die sie überdem ohne allen Grund verdoppelt haben; wenn man aber die Beschreibungen Markgravs vergleicht, sieht man keinen andern Unterschied darin, als daß sich das Gelbe auf dem Halse ein wenig weiter verbreitet, welches noch nicht hinreichend ist, eine besondere Gattung aus dem Vogel zu machen, und noch weniger sie zu verdoppeln, wie es Brisson gethan hat, der den Papagey des Albins als eine von Edwards seinem verschiedenen Vogel angiebt, da doch dieser letzte sagt, sein Papagey sey mit Albins seinem einerley.

et gutture luteis; remigibus quinque intermediis exterius superne prima medietate rubris; rectricibus quatuor utrimque extimis interius prima medietate rubris luteo marginatis, altera luteo viridibus, taenia transversa saturate viridi notatis, extima exterius caeruleo marginata. . . . Psittacus amazonicus varius. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 281. (n. 37.)

V.

1) Acurou - Couraou. var. 4. *Buffon Oiseaux* VI. p. 219. Ed. in 12. XI. p. 308. var. 4.

Psittacus aestivus. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 340. n. 32. var. ε.

Der grün und bleichgelbe Papagey mit aschgrauem Kopfe von Barbados. Klein Vögel in 8. S. 48. n. 24. Grün und gelber Graukopf. Klein Ord in 4to. S. 26. n. 28.

Der große grüne Papagey aus Westindien. Psittacus viridis major occidentalis. Seligmann Vögel VI. tab. 57.

Der Amazonen Papageÿ mit gelber Stirne S. 291.

Buff. Vög. XIX B. *Fritsch F. 47.*

V. Eine fünfte Spielart ist endlich der Papagey, den Brisson 1) 1) unter dem Namen des Amazonenpapageyes mit gelber

t) Psittacus major brevicaudus, viridis, colli pennis in apice nigro marginatis, caeruleo admixto, syncipite pallide flavo; vertice genisque luteis; taenia supra oculos caerulea; remigibus quatuor intermediis exterius superne prima medietate rubris; rectricibus tribus utrimque extimis interius, rubris, taenia transversa saturate viridi notatis, apice viridi-luteis, tribus utrimque extimae proximis exterius rubra macula insignitis, extima interius caerulea-violacea. . . . Psittacus amazonicus fronte lutea. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 261. (n. 32.)

1) Acurou-Couracu var. 5. *Buffon Oiseaux* VI. p. 221. Ed in 12. XI. p. 310. var 5. Brasilian yellow-fronted Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p 287. n. 91. E.

Psittacus (amazonicus) subvirescens, fronte flava, temporibus fulvis. *Linn. Syst. Nat.* XIII 1. p. 341. n. 33. XII 1. p. 147. n. 33. Surinamischer Papagey. Müller Linné Natursyst 2. p. 145.

Linné rechnete hieher des Briss. Psitt. amaz. n. 31. Frisch t. 47. den Ajurucu. Marcgr. 205. Will. 76. Ray 33. und sagt, er komme seinem aestivo sehr nahe, sey aber doppelt so groß. Die äußersten Schwungfedern wären blau, in der Mitte roth; die äußersten Ruderfedern in der Mitte blau, und die an der Seite an der innern

Stirne mitgetheilet hat, der von diesem in nichts abweicht, als daß seine Stirn weißlich oder blaßgelb ist, da sie bey dem andern bläulich aussiehet, welches bey weitem nicht zureicht, eine besondre und eigne Gattung aus ihm zu machen.

Seite roth. Der Herr Gmelin hat sie deßfalls auch als eine besondere Art, wie Linné, aufgestellet.

Es giebt gewiß noch manche Spielarten des Ajurucuru, welche in den Farben ansehnlich verschieden sind. Ich will nur eine Vlte anführen, welche ich lange lebendig gesehen habe, und die sich von den vorigen und besonders der Büffonschen Abbildung dadurch auszeichnete, daß das ganze Gesicht, die Schultern und Dickbeine zitrongelb waren, an der Stirn kein Blau, und auf dem Scheitel nichts Weißes zu sehen war.

O.

Die

Die Kriks [1]).

Ob es gleich eine sehr große Anzahl von Vögeln giebt, denen man diesen Namen beylegen muß, so kann man doch auf sieben Gattungen setzen, davon die andern alle Spielarten sind. Diese sieben Gattungen sind: 1) der Krik mit der gelben Kehle; 2) der Müller oder der gepuderte Krik; 3) der roth und blaue Krik; 4) der Krik mit dem blauen Gesichte; 5) der eigentlich sogenannte Krik; 6) der Krik mit dem blauen Kopfe; 7) der Krik mit dem violetten Kopfe.

1) Wenn dieser Name in der teutschen Sprache aufgenommen wird, und ohne weitere Bezeichnung des Vogels vorkäme, so könnte er bey einigen Anlaß zur Verwechselung geben, weil die kleinen Kriechenten an vielen Orten Kriken genannt werden. Ein Unwissender konnte dann gar Papageyen mit Schwimmfüßen erdichten; wenigstens sind ähnliche Irrthümer genng in der Naturgeschichte aus solchen zweydeutigen Namen gekommen.

Der Krik mit dem gelben Kopfe und der gelben Kehle u) 1).

Erste Gattung.

Frisch *tab.* 48.

Der ganze Kopf dieses Kriks, ingleichen die Kehle und die Unterseite des Halses sind schön gelb; die Unterseite des Körpers ist glänzend grün,

u) Psittacus viridis alius, capite luteo, *Frisch* pl. 48. — Psittacus viridis, capite, humeris et femoribus luteis. *Klein Av.* p. 25. n. 11. — Psittacus major brevicaudus, viridis, superne pennis in apice nigro marginatis, syncipite cinereo-albo; vertice, genis, gutture et collo inferiore luteis; remigibus quatuor intermediis exterius superne prima medietate rubris; rectricibus quatuor utrimque extimis prima medietate rubris; exterius viridi-luteo marginatis, altera viridi-luteis, interius macula saturate viridi notatis, extima exterius dilute caerulea. . . . Psittacus amazonicus gutture luteo. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 287. (n. 38.)

1) Crick a tete et gorge jaune. *Buffon Oiseaux* VI. p. 222. Ed in 12. XI. p. 312. n. 1.

Yellow-headed Creature. *Bancr. Guiana.* p. 159.

Der gelbkuppigte Papagey. *Bankr. Guiana.* S. 95.

Der Krik mit dem gelben Kopf. S. 294.



Krüger jun. del.

Büff. Vögel XIX. Th. Frisch Vögl. T. 48.

grün, die obere aber ist etwas gelblich grün, die Schultern des Flügels sind gelb, anstatt, daß bey den Amazonen die Schultern roth sind; die erste Reihe der Flügeldecken ist roth und gelb; die übrigen Reihen sind schön grün; die Schwung- und Ruderfedern sind bunt, grün, schwarz, violetblau, gelblich und roth; die Regenbogenhaut in den Augen ist gelb; der Schnabel und die Füße sind weißlich.

Dieser Krik mit gelber Kehle ist anjetzt lebendig bey dem Herrn Bougot, der uns folgende ausführliche Nachricht von seinen natürlichen Eigenschaften und Sitten mitgetheilt hat: „Er ist einer Zuneigung zu seinem Herrn fähig; er liebt ihn aber mit der Bedingung, bisweilen geliebkoset zu werden; er scheinet unzufrieden zu seyn, wenn man ihn vernachläßigt, und rachsüchtig, wenn man ihn beleidigt; er hat Anfälle vom Ungehorsam, beißt in seiner Laune, und lachet laut, wenn er gebissen hat, als wenn er seiner Bosheit Beyfall

Yellow-winged Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 289. n. 93.

Pfittacus (ochropterus) viridis, fronte orbitisque albidis, vertice, genis, gula, jugulo, tectricibusque alarum remotioribus flavis. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 341. n. 115.

Der grüne Papagey mit bleichgelben Kopfe, Schultern und Schenkeln. *Klein* Ord. d. V. in 8. S. 47. n. 11. in 4to. S. 26. n. 15.

Grünbunte Papagey mit gelben Schilden. *Halle* Vögel S. 114. n. 28.

O.

zuriefe; Schläge oder strenge Behandlung machen ihn nur widerspenstig, verhärteter und eigensinniger, man kann ihn nur durch Sanftmuth wieder zu Rechte bringen.

Die Begierde zu zerstückeln, das Bedürfniß zu zernagen, machen den Vogel zu einem Verderber von allem, was um ihm ist; er zerschneidet das Zeug der Meubles, benagt das Holz der Stühle, zerreißt Papier und Federn, u. s. w.; wenn man ihn von von einem Orte aus dem Wege bringt, so führt ihn die Begierde zum Widerspruch gleich darauf wieder zurück; er ersetzt seine bösen Eigenschaften durch Annehmlichkeiten; er behält leicht alles, was er sagen soll; vor dem Sprechen schlägt er mit den Flügeln, bewegt und freuet sich auf seiner Stange; das Bauer macht ihn traurig und stumm; er spricht nicht gut als in der Freyheit; endlich schwatzt er weniger des Winters als im Sommer, worin er Morgens und Abends nicht aufhöret zu plappern, so daß er darüber das Fressen vergißt.

In diesen frohen Tagen ist er liebreich, empfängt und theilt die Liebkosungen aus, gehorchet und höret auf, aber ein Eigensinn unterbricht und endigt oft diese gute Laune; die verschiedene Jahrszeit scheint einen Einfluß auf ihn zu haben; er wird alsdann still; man kann ihn wieder aufmuntern, wenn man nahe bey ihm singet; er ermuntert sich alsdann, und bemüht sich durch seinen Lärm und sein Geschrey die Stimme, die ihn reizte, über zu hohlen.

Er liebt Kinder, und hierin ist er von den andern Papageyen verschieden; einige liebt er vorzüglich, diese haben die Erlaubniß, ihn zu greifen und ungestraft wegzutragen; er liebkoset sie, und wenn ein großer Mensch ihn in dieser Zeit anrührt, so beißt er sehr scharf; wenn seine Freunde, die Kinder, ihn verlassen, beklagt er sich, folgt ihnen, und ruft sie mit lauter Stimme zurück; zur Zeit der Mauster scheint er zu leiden und niedergeschlagen, und diese Zeit des starken Mausern währet ohngefähr drey Monate.

Man giebt ihm zu seiner gewöhnlichen Nahrung Hanf, Nüsse, Früchte aller Art und in Wein getunktes Brod; Fleisch würde er vorziehen, wenn man es ihm geben wollte, aber man hat bemerkt, daß ihn dasselbe ungeschickt und traurig macht, und daß ihm davon nach einiger Zeit die Federn ausfallen. Man hat auch bemerkt, daß er sein Fressen in den Backentaschen aufbehält, und nachher durch eine Art von Wiederkauen hervorhohlet x).

x) Diese Bemerkungen kommen von dem Pater Boucor, Gardian der Kapuciner von Semur, welcher sich lange ein Vergnügen aus Erziehung der Papageyen gemacht hat.

Der Müller oder der gepuderte Krik 1).

Zweyte Gattung.

Buff. pl. enl. 861.

Kein Naturbeschreiber hat diese Gattung auf eine deutliche Art angezeigt und beschrieben; es scheint bloß, daß es der große grüne grau gepuderte Papagey sey, den **Barrére** unter dem Namen des **weißlichen Papagey** angedeutet hat y). Er ist der größte unter allen Papageyen der neuen Welt, die Aras ausgenommen; die Einwohner auf Cayenne haben ihn darum den Müller genannt, weil sein Gefieder, dessen Grund grün ist, mit Mehl gepudert zu seyn scheint; er hat einen gelben Flecken auf

1) Meunier ou Crick poudré. *Buffon Oiseaux* VI. p. 225. Ed. in 12. XI. p. 316. n. 2. Meunier de Cayenne. *Buffon pl. enl.* 861. Meally green Parrot. *Latham Synopf.* I. 1. p. 291. n. 94. Pfittacus (pulverulentus) viridis et supra quasi farina conspersus, capitis macula flava alarum rubra. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 341. n. 116.

y) Pfittacus major albicans, capite luteo. *Barrère, France equinoxiale*, p. 144.

Der Müller od. gepuderte Krik.

S. 298.

Büff. Vögel XIX. Th. v. Büff. fol. Pl. 861.

auf dem Kopf; die Federn auf der obern Fläche des Halses sind ganz leichtbraun verbrämt; die Unterseite des Körpers ist nicht so dunkelgrün als die obere, und nicht weiß gepudert, die äußern Schwungfedern sind schwarz, einen Theil der äußern Bärte ausgenommen, welche blau sind; er hat einen großen rothen Flecken auf den Flügeln; die Schwanzfedern haben von ihrem Anfange, bis auf zwey Drittheile ihrer Länge, mit der Oberseite des Körpers einerley Farbe, und das übrige ist gelblich grün. Dieser Papagey gehört unter diejenigen, welche man am meisten schätzt, sowohl seiner Größe und seiner besondern Farben, als auch der Leichtigkeit wegen, mit welcher er reden lernt, und seinem sanften Naturell; er hat nur einen einzigen Zug, der nicht gefällt, dieses ist sein Schnabel, welcher eine weißliche Hornfarbe hat.

---

1) Crik rouge et bleu. Buffon Oiseaux VI. p. 226. Ed in 12. XI. p. 318. n. 3.
Red and blue Parrot. Lath. Synop. I. 1.

Der

Der roth und blaue Krik z) 1).

Dritte Gattung.

Aldrovand hat diesen Papagey angezeigt, und alle andere Naturalisten haben das, was er davon gesagt hat, bloß nachgeschrieben; indessen kom-

z) Psittacus versicolor seu erythrocyanos. *Aldrov.* tom. I. p. 675. Psittacus erythrocyanus. *Jonston.* p. 22. — Psittacus versicolor seu erythrocyanus Aldrovandi, *Willughby Ornithol.* p. 75. — Psittacus versicolor seu erythrocyanus Aldrovandi *Ray Synopf. Av.* p. 31. n. 6. — Psittacus brachyurus, capite, pectore dorsoque caeruleis; ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo. . . . . Psittacus caeruleocephalus. *Linn. Syst. Nat.* ed. X. p. 100. — Psittacus major brevicaudus caeruleus, vertice viridi; lateribus luteis; remigibus rectricibusque roseis. . . . Psittacus Guianensis caeruleus. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 304. (n. 46.)

V.

1) Crick rouge et bleu. *Buffon Oiseaux* VI. p. 226. Ed in 12. XI. p. 318. n. 3.

Red and blue Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 177. n. 84.

Psittacus (caeruleocephalus) caeruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo, remigibus

kommen sie doch in der Beschreibung, die sie von ihm geben, nicht überein. Nach Linné hat er einen grünen, und nach Brisson einen rosenfarbnen Schwanz [2]); weder der eine, noch der andere hat ihn gesehen, und hier ist das, was Aldrovand von ihm sagt.

„Der Name des bunten (ποικιλος) würde sehr auf ihn passen, in Absicht auf die Verschiedenheit und den Reichthum seiner Farben; das blaue und das sanfte Rothe (roseus) sind die herrschenden; das Blaue färbt den Hals, die Brust und den Kopf, auf dessen obersten Theil ein gelber Flecken ist; der Steiß hat eben die Farbe; der Bauch ist grün; der obere Theil des Rückens ist hellblau; die Schwung- und Schwanzfedern sind alle rosenfarben; die Deckfedern der Flügel sind grün, gelb und rosenfarb gemengt; die auf dem Schwanze sind grün; und der Schnabel ist schwärzlich. Aldrovand sagt nicht, aus welchem Lande dieser Vogel gekommen ist; da er aber roth auf den Flügeln, und außerdem einen gelben Fleck

gibus rectricibusque rubris. *Linn. Syst. Nat.* XII. 1. p. 145. n. 28. XIII. 1. p. 336. n. 28. Der guianische Blaukopf. Müller Linné Natursyst. 2. S. 143.

Der blauköpfige Papagey. Halle Vögel p. 122. n. 48.

2) Den größten Theil des Schwanzes, die Ruderfedern nämlich nennt Linné doch auch roth, wie Aldrovand und Brisson.

Fleck auf dem Kopfe hat, so habe ich geglaubt, man müsse ihn unter die amerikanischen Kriken zählen. Ich muß anmerken, daß ihn **Brisson** mit dem von **Barrere** a) angezeigten, violetten Papagey vermengt, welcher doch sehr verschieden ist, und weder unter die Amazonen noch Kriken gehört, da er nichts rothes auf den Flügeln hat. In der Folge wird dieser violette Papagey vorkommen.

a) *France equinoxiale*, p. 144.

V.

Man sehe unten den violetten Papagey. n. 7. pl. enl. 408.

Ø.

Der

Der Krik mit blauem Gesichte.

S. 303.

Büff. Vögel. 19 B. Büff. Fol. Pl. 360.

Der Krik mit blauem Gesichte b) 1).

Vierte Gattung.

Buff. Pl. enl. 360.

Dieser Papagey ist uns aus der Havanna geschickt worden, und wahrscheinlich ist er in Mexiko und in den Ländern der Erdenge gemein, aber

b) Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice superne nigro, inferne caeruleſcente marginatis, capite anterius et collo inferiore cinereo caeruleis, ad violaceum vergentibus; macula in summo pectore rubra; remigibus quatuor intermediis exterius superne prima medietate rubris; rectricibus tribus utrimque extimis interius in exortu rubris, dein viridibus, apice, viridi luteis, extima superne in utroque latere caeruleo mixta. . . Psittacus amazonicus gutture caeruleo. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 266. (n. 33. tab. 25. fig. 1.)

V.

1) Crick a face bleue. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 227. Ed. in 12. XI. p. 320. n. 4.

Perroquet de la Havane. *Buff. pl. enl.* 360.
Blue-fronted Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 291. n. 95.

Pſit-

aber in Guiana findet man ihn nicht; er ist viel kleiner als der Müller oder der gepuderte Krik, und ist zwölf Zoll lang; zwischen den Schwungfedern, die indigoblau sind, stehen einige rothe hervor; sein Gesicht ist blau; die Brust und der Bauch haben ein leichtes Roth, oder lilas und grün gewässert; alles übrige Gefieder ist grün, einen gelben Flecken unten am Bauche ausgenommen.

Psittacus (havanensis) viridis, fronte, gula et jugulo ex cinereo-caeruleis, pectoris macula magna rubra orbitis cinereis. *Linn. yst. Nat.* XIII. I. p. 342. n. 117.

---

1) Crick à face bleue. Buffon Ois. VI. p. 227. Ed. in 12. XI. p. 320. n. 4.

Perroquet de la Havane. Buff. pl. enl. 320.

Blue-fronted Parrot. Lath. Synop. I. 1. p. 179.

Der

Der Krik c) 1).

Fünfte Gattung.

Buff. pl. enl. 839.

So wird dieser Vogel in Cayenne genannt, wo er so gemein ist, daß man seinen Namen allen andern Kriken gegeben hat; er ist kleiner als die

c) Aiuru catinga Brasilienſibus. *Marcgrave Hiſt. Nat. Braſ.* p. 207. — Pſittacus major vulgaris praſinus. *Barrere, France equinox.* p. 144. — Pſittacus flaveſcens, ſuperne ex viridi caeruleus. *Idem Ornithol.* Claſſ. III. Gen. 2. Sp. 1. — Little green parrot, Pſittacus minor viridis. *Edwards, Hiſt. of Birds*, p. 168. — Pſittacus ſubmacrourus viridis, tectricibus remigum primorum caeruleſcentium fulvis, cauda ſubtus rubra. . . . Pſittacus agilis *Linn. Syſt. Nat.* ed. X. p. 99. — Pſittacus major brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens; rectricibus lateralibus interius rubris, apice viridibus, binis utrimque extimis exterius ſuperne caeruleſcentibus. . . . Pſittacus Cayanenſis. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 237. (n. 23.) Aiuru catinga. *Salerne Ornithol.* p. 68. V.

1) Criq. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 228. Ed. in 12. XI. p. 321. n. 5. *Buff. pl. enl.* 839. Agile Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 297. n. 101.

Pſittacus (agilis) viridis, tectricibus remigum primorum caeruleſcentium fulvis, cauda vix elongata ſubtus rubra. *Linn. Syſt. Nat.* XII. 1. p. 143. n. 20. XIII. 1. p. 320. n. 20.

Cayennischer Parkit. Müller Linné Naturſyſt. 2. S. 138. n. 20. Vor. 2. 92. 10.

Der

die Amazonen, doch muß man ihn nicht, wie unsere Nomenklatoren gethan haben, unter die Sittiche setzen d); sie haben diesen Krik für den Sittich von Guadeloupe genommen, weil er, wie derselbe, ganz grün ist; indessen wäre es ihnen doch leicht gewesen, diesen Irrthum zu vermeiden, wenn sie den Markgrav zu Rathe gezogen hätten, welcher ausdrücklich sagt, dieser Papagey sey so groß, wie ein junges Huhn; dieses einzige Abzeichen wäre hinreichend gewesen, um sie zu überzeugen, daß dieses nicht der Sittich von Guadeloupe sey, welcher eben so klein ist, als die übrigen Sittiche. Man hat diesen Krik e) auch mit dem Tahua, welches man Tavua ausspricht, vermengt, welcher doch in vielen Stücken von ihm abweicht, denn der Tavoua hat nichts Rothes in den Flügeln, und gehört folglich weder unter die Amazonen, noch unter die Kriks, sondern vielmehr unter die Papageyen, von welchem wir im folgenden Artikel reden werden. Der

Der kleine grüne Papegey. Plittacus minor viridis. Seligmann Vögel VI. tab. 63. O.

d) *Willughby, Ray, Linn.* et *Briss.* V.

Brisson hat doch den Sittich von Guadeloupe als eine besondere Art, und nicht unter diesem Krik aufgestellet, sondern unter dem Namen Plittaca aquarum lupiarum insulae. orn. 4. p. 310. n. 58. Ed. in 8. II. p. 132. Linné hat diesen Guadelupischen Papagey des Brisson auch nicht unter seinem Plittacus agilis, theilt auch ohnehin das Geschlecht der Papageyen nicht in solche Familien als Büffon. In der dreyzehnten Ausgabe des Linneischen Systems ist dieser Sittich von Guadelupe als eine Abart β. des Plittacus rufirostris angeführt. p. 323. O.

e) *Barrère, France equinox.* p. 144. et *Briss.* tom. IV. p. 238.

Der Krik, welchen wir hier beschreiben, ist von der Schnabelspitze bis ans Ende des Schwanzes einen Fuß lang, und wenn die Flügel in Ruhe liegen, reichen sie ein wenig über die Hälfte des Schwanzes hinab; er ist sowohl auf der Ober- als Unterseite schön und ziemlich hellgrün, besonders auf dem Bauch und Hals, wo das Grüne sehr prächtig ist; die Stirn und der oberste Theil des Kopfs sind ebenfalls ziemlich schön grün; die Backen sind grünlich gelb; auf den Flügeln ist ein rother Flecken; die Schwungfedern sind schwarz, und hören blau auf; die zwey mittlern Federn des Schwanzes sind eben so grün als der Rücken, und die äußern Federn, deren an jeder Seite fünf sind, haben jede einen länglich rothen, großen Flecken auf den innern Fahnen, welcher immer breiter wird, je mehr die Feder nach außen stehet; die Regenbogenhaut ist roth, Schnabel und Füße sind weißlich. **Markgrav** hat eine Spielart in dieser Gattung angezeigt f), die sich bloß durch die Größe unterscheidet, indem dieser Papagey nur ein wenig kleiner ist, als der vorige; er nennt den ersten **Ajuru-Catinga**, und den zweyten **Ajuru-apara**.

f) Aiuru-apara Brasilienſibus. *Marcgrave, Hist. Nat. Brasil.* p. 238. — *Salerne Ornithol.* p. 238. V.

Der grüne langschwänzige Papagey mit rothem Augenkreise. Halle 122. n. 46.

Diese Ajuru Catinga und Ajuru-Apara führt Brisson freylich bey dem Sittich von Guadelupe an, Linné aber beyde nicht bey seinem Plittacus agilis. O.

Der Krik mit dem blauen Kopfe g).

Sechste Gattung.

Edw. tab. 230.
Seligmann VII. tab. 13.

Die sechste Gattung dieser Papapageyen ist die, die Edwards unter der Aufschrift des grünen Papageyes mit blauem Gesichte mitgetheilt hat. Der Vogel hält sich in Guiana auf, wie

g) Blue faced green Parrot. Perroquet vert facé de bleu. *Edwards Gleau.* p. 43. mit einer guten ausgemahlten Abbildung. tab. 230.

Crick a tete bleue. *Buffon Oiseaux* VI. p. 230. Ed. in 12. XI. p. 324. n. 6. Blue faced green Parrot. *Lath. Synopf.* I. 1. p. 293. n. 96.

Blue headed Creature. *Bancr. Guiana.* p. 158.

Der blauköpfige Papagey. Bankroft Guiana. S. 95.

Der grüne Papagey mit den blauen Backen. Pfittacus viridis fronte caeruleo. Seligmanns Vögel VII. tab 13.

Pfittacus autumnalis, fronte gulaque caeruleis. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 345. n. 37. var. β.

Krik mit blauem Kopf t. 308.

Krüger, jun: Del.

Büff. Vögel. 19 B. Seeligm. VII t. 13.

wie die vorhergehenden. Die ganze Vorderseite des Kopfs und die Kehle sind blau, und diese Farbe hört auf der Brust mit einem rothen Flecken auf; das übrige des Körpers ist grün, welche Farbe auf dem Rücken dunkler ist als unter demselben; die obern Deckfedern der Flügel sind grün; ihre große Schwungfedern sind blau, die, welche auf sie folgen, sind roth, und ihre obere Seite ist am Ende blau; die Schwungfedern, welche nahe am Körper stehen, sind grün; die Schwanzfedern sind oberhalb, bis auf die Hälfte ihrer länge grün, und unterhalb gelblich grün; die Seitenfedern haben an ihren äußern Fahnen Roth: die Regenbogenhaut im Auge ist orangenfarben; der Schnabel ist schwärzlich aschfarben, und hat an den Seiten der obern Kinnlade einen röthlichen Flecken; die Füße sind fleischfarben, und die Klauen schwärzlich.

Spielarten des Kriks mit dem blauen Kopfe.

Ich muß zu dieser sechsten Gattung folgende Spielarten zählen:

1. Den Cocho, den Fernandez angezeigt hat h), und der von dem obigen darin unterschieden zu seyn scheint, daß sein Kopf, statt roth und bläulich, roth und weißlich ist; außerdem aber ist er dem Krik mit dem blauen Kopfe vollkommen ähnlich, und auch von gleicher Größe, und dieser ist ein wenig kleiner als die Kriken von der ersten und zweyten Gattung. Die Spanier nennen ihn Catharina, ein Name, den sie auch dem Papagey von der zweyten Spielart des Ajuraru-curu geben, und Fernandez sagt, er spreche sehr gut.

h) *Fernandez Hist. nov. Hisp.* p. 38.

Crick a tete bleue. var. 1. *Buffon Oiseaux* VI. p. 231. Ed. in 12. XI. p. 326. var. 1. Cocho. Psittacus (autumnalis) capite ex rubro et albido varius. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 345. n. 37. var. γ.

Krik mit blauem Kopf. abart. S. 311.

Krüger jun: del.

Büff. Vögel. 19 B. Seeligm. VI. t. 59.

Edw. tab. 164. Seligm. VI. tab. 59.

II. Die zweyte Spielart ist der Papagey, den Edwards unter dem Namen des kleinen grünen angezeigt hat i), und der von dem

i) Leſſer green parrot. Pſittacus viridis minor occidentalis. *Edwards*, *Hiſt. of* Birds. tab. 164. — Pſittacus brachyurus viridis, fronte remigumque macula coccinea, vertice, remigibusque primoribus caeruleis. . . . Pſittacus autumnalis. *Linn. Syſt. Nat.* ed. X. p. 102. — Pſittacus major brevicaudus, viridis, ſuperne ſaturatius, inferne dilutius; ſyncipite coccineo; vertice caeruleo; genis aurantiis; marginibus alarum luteis; remigibus intermediis exterius prima medietate rubris; rectricibus ſuperne obſcure viridibus, inferne viridibus flavicantibus. . . . Pſittacus americanus, *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 293. (n. 40.)

Der kleine grüne Papagey. Le plus petit Perroquet verd. Seligmann Vögel VI. tab. 59.

Crick a tete bleue. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 232. var. 2. Ed. in 12. XI. p. 326. i.

Pſittacus autumnalis. *Linn. Syſt. Nat.* XII. 1. p. 147. XIII. 1. p. 345. n. 37. *a*.

Der Herbſtpapagey. Müller Linné Naturſyſt. 2. S. 146. n. 37.

Krik mit dem blauen Kopfe in nichts unterschieden ist, als daß er eine rothe Stirn und orangenfarbne Backen hat; da er ihm aber sonst, sowohl in Absicht auf die Farben, als auf die Größe gleicht, so kann man ihn für eine Spielart in dieser Gattung ansehen.

Der kleinere grüne Papagey des Edwards. Bankroft Guiana. S. 96. *Bancr. Guiana.* p. 160.

Autumnal Parrot. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 293. n. 96. B.

Edw.

Krik mit blauem Kopfe. abart: t.313.

Büff: Vögel. 19 B. Seeligm: VI. t.56.

Edw. tab. 161. Seligm. VI. tab. 56.

III. Noch eine Spielart hat Edwards unter dem Namen des grünen braſilianiſchen Papageyen mitgetheilt k), die ſich von dem

k) Braſilian green parrot. Pſittacus viridis Braſilienſis. *Edwards Hiſt. of Birds.* t. 161. — Pſittacus brachyurus viridis, facie rubra temporibus caeruleis. . . . Pſittacus Braſilienſis. *Linn. Syſt. Nat.* ed. X. p. 102. — Pſittacus major brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, ſuperne pennis obſcure purpureo marginatis, capite anterius rubro; vertice viridi-flavicante; genis caeruleis; rectricibus lateralibus interius rubris, apice luteis, extima exterius caerulea, binis utrimque proximis exterius rubris. . . . Pſittacus Braſilienſis fronte rubra. *Briſſ. Ornithol.* tom. IV. p. 254. (n. 30.)

Der braſilianiſche grüne Papagey. Le Perroquet verd du Breſil. Seligmann Vögel VI. tab. 56.

Crick a tete bleue. var. 3. *Buffon Oiſeaux* VI. p. 232. Ed. in 12. XI. p. 327. var 3. k.

Braſilian green Parrot. *Bancroft Guiana.* p. 160. *Lath. Synopſ.* I. 1. p. 294. n. 96. c.

Der braſilianiſche grüne Papagey. Bankroft Guiana. S. 96.

Pſittacus (braſilienſis). *Linn. Syſt. Nat.* XII. 1. p. 147. n. 36. XIII. 1. p. 344. n. 36.

Krik mit dem blauen Kopfe nicht in Absicht auf die Größe, sondern nur in Absicht auf die Farben, der Stirn und des obern Theils der Kehle unterscheidet, welche schön roth sind, statt daß sie bey dem andern bläulich aussehen; da er ihm aber sonst in allem übrigen ähnlich ist, so habe ich ihn bloß für eine Spielart erklärt. Ich sehe nicht ein, aus welcher Ursach Brisson den Papagey aus Dominque, den der P. Labat angezeigt hat, zu diesem Krik hat setzen können; denn Labat sagt bloß, er habe einige rothe Federn an den Flügeln, in dem Schwanze und unter der Kehle, und alles übrige Gefieder sey grün; nun ist diese Anzeige nicht hinreichend, ihn zu diesem zu setzen, weil diese Abzeichen auf mehrere andere Amazonen oder Kriken passen können.

Brasilianischer Papagey. Müller Linné Syst. 2. p. 146. n. 36.

Psittacus pileatus. *Scopol. Ann.* 1. n. 32?

O.

An

Anhang.

Scopoli sahe in dem gräfl. Thurufhei Kabinet einen Vogel, welchen er den grünen Papagey mit einem rothen Huth und rother Stirn nennet. Er war von der Größe des Mistlers oder der Schnarrdrossel; die Backen waren nackt; der hornfarbene Schnabel am Grunde braun; die Schwing- und Schwanzfedern an ihrer äußeren Seite blau, an der inneren aber schwarz; der Bürzel ist gelbgrün. Scopoli durch Günth. S. 27. n. 32.

O.

Der

Krik mit dem blauen Kopfe nicht in Absicht auf die Größe, sondern nur in Absicht auf die Farben, der Stirn und des obern Theils der Kehle unterscheidet, welche schön roth sind, statt daß sie bey dem andern bläulich aussehen; da er ihm aber sonst in allem übrigen ähnlich ist, so habe ich ihn bloß für eine Spielart erklärt. Ich sehe nicht ein, aus welcher Ursach Brisson den Papagey aus Dominque, den der P. Labat angezeigt hat, zu diesem Krik hat setzen können; denn Labat sagt bloß, er habe einige rothe Federn an den Flügeln, in dem Schwanze und unter der Kehle, und alles übrige Gefieder sey grün; nun ist diese Anzeige nicht hinreichend, ihn zu diesem zu setzen, weil diese Abzeichen auf mehrere andere Amazonen oder Kriken passen können.

Brasilianischer Papagey. Müller Linné Syst. 2. p. 146. n. 36.

Psittacus pileatus. *Scopol. Ann.* 1. n. 32?

O.

An

Anhang.

Scopoli sahe in dem gräfl. Thurufhei Kabinet einen Vogel, welchen er den grünen Papagey mit einem rothen Huth und rother Stirn nennet. Er war von der Größe des Mistlers oder der Schnarrdrossel; die Backen waren nackt; der hornfarbene Schnabel am Grunde braun; die Schwing- und Schwanzfedern an ihrer äußeren Seite blau, an der inneren aber schwarz; der Bürzel ist gelbgrün. Scopoli durch Günth. S. 27. n. 32.

O.

Der

Der Krik mit dem violetten Kopfe 1) 1).

Siebente Gattung.

Der tapirirte Papagey. *Buff. pl. enl.* 120.

Der P. Dutertre ist der erste, der diesen Papagey, den man in Guadeloupe findet, angezeigt und beschrieben hat. „Er ist so schön, sagt er,

1) Perroquet de Guadeloupe. *Dutertre hist. des Antilles.* tom. II. p. 250. Perroquet de la Guadeloupe. *Labat nouveau voyage aux iles de l'Amerique.* Tom. II. p 214.

Psittacus major brevicaudus, superne viridis inferne cinereo-caerulescens; capite et collo caerulescentibus; viridi et nigro variegatis; rectricibus viridibus. . . . Psittacus aquarum lupiarum Insulae. *Briss. Ornithol.* tom. IV. p. 302. (n. 44.)

V.

1) Crick a tete violette. *Buffon Oiseaux* VI. p. 233. Ed. in 12. XI. p. 328. n. 7. Ruff-necked Parrot. *Latham Synopf.* I. 1. p. 268. n. 75.

Psittacus (violaceus) viridi et nigro admisto varius, dorso ex fusco viridi, remigibus majoribus nigris, reliquis ex luteo viridi et rubro variis, tectricum macula rosea. *Linn. Syst. Nat.* XIII. 1. p. 337. n. 106.

Der tapicirte Papagey. S. 316.

Büff: Vögel. 19 B. Büff: Fol: Pl: 120.

er, und so sonderbar in Absicht auf die Farben seines Gefieders, daß er verdient, aus allen andern ausgewählt und beschrieben zu werden. Er ist fast so groß wie eine Henne; der Schnabel und die Augen sind mit Incarnat verbrämt; alle Federn des Kopfs, des Halses und des Bauchs sind violet, ein wenig mit grün und schwarz vermengt, und schielern wie ein Taubenhals; der ganze obere Theil des Rückens ist sehr braun grün; die großen Schwungfedern sind schwarz, alle übrige sind gelb, grün und roth, und auf den Deckfedern der Flügel hat er zwey Flecke in Gestalt der Rosen von eben diesen Farben; wenn er die Federn seines Halses sträubt, macht er sich damit eine schöne Krause um den Kopf, auf welche er sich eben so viel zu gut zu thun scheinet, als der Pfau auf seinen Schwanz; er hat eine starke Stimme, spricht sehr deutlich, und lernt geschwind, wenn man ihn jung fängt. Ich habe diesen Papagey nicht gesehen, und man findet ihn nicht in Cayenne, er muß sogar heutiges Tages in Guadeloupe sehr rar seyn, denn keiner von den Einwohnern dieser Insel hat mir Nachricht davon gegeben; allein dieses ist nichts außerordentliches, denn seitdem diese Inseln sehr bewohnt sind, hat sich die Anzahl der Papageyen sehr vermindert; und Dütertre merkt besonders von diesem an, daß ihn die französischen Colonisten zur Zeit der Goyaven und Cochinnanen u. s. w., von welchen er außerordentlich feist und saftreich werde, fürchterlich zugesetzt haben. Er sagt auch, er sey von einem sanften Naturell, und man könne ihn leicht greifen. „Wir hatten, fügt er hinzu, zwey, welche ihr Nest auf hundert Schritte von unserm Hause, in einen großen Baum machten; das Männchen

und

und Weibchen brütete wechselsweise, und kamen eins nach dem andern, ihr Fressen in der Hütte zu holen, wohin sie ihre Jungen brachten, sobald sie im Stande waren, das Nest zu verlassen m). Ich muß bemerken, daß, wie die Kriken die gemeinsten unter allen Papageyen, und zugleich diejenigen sind, die am besten reden, die Wilden es unternommen haben, sie zu erziehen und Versuche an ihnen zu machen, ihr Gefieder zu verändern; sie bedienen sich zu diesem Geschäfte des Bluts eines kleinen Frosches, dessen Gattung von den europäischen Fröschen sehr verschieden ist; sie ist um die Hälfte kleiner, und schön himmelblau, mit in die Länge gezogenen goldfarbenen Streifen; es ist der schönste unter allen Fröschen der ganzen Welt; er hält sich selten in Sümpfen auf, sondern immer in den Wäldern, die weit von Wohnungen entfernt sind. Die Wilden nehmen einen jungen Krik aus dem Neste, und reißen ihm einige von den Schulterfedern und einige andere Federn auf dem Rücken aus, hernach reiben sie den halbgerupften Papagey mit dem Blute dieses Frosches; die Federn, welche nach dieser Operation wachsen, werden, statt daß sie vorher grün waren, schön gelb, oder sehr schön roth; und diese nennt man in Frankreich tapirirte Papageyen. Diese Gewohnheit ist bey den Wilden sehr alt, denn **Markgrav** redet bereits davon; die Wilden in Guiana und an dem Amazonenflusse treiben die Kunst die Papageyen zu tapirieren

m) *Hist. gener. des Antilles.* tom. II. p. 251.

ren n). Uebrigens bekommt das Ausreißen der Federn diesen Vögeln ziemlich übel, und sie sterben so oft davon, daß diese tapirierte Papageyen sehr selten sind, ob sie gleich die Wilden viel theurer verkaufen als die andern. Ich habe auf der ausgemahlten Platte, n. 120, einen solchen tapirierten Krik o) vorstellen lassen, und man muß den durch **Klein** und **Frisch** angezeigten Papagey zu ihm zählen; beyde Verfasser haben ihn für natürlich angenommen, und deßfalls eine Beschreibung davon gemacht, die man unnöthiger Weise hieher setzen würde p).

n) *Voyage de M. de Gennes au detroit de Magellan.* Paris 1698. p. 163.

o) Woselbst er Perroquet amazone varié de Brefil genannt ist.

V.

p) Psittacus viridis major, maculis rubris luteisque, fronte caerulea. *Klein, Av.* p. 25. n. 12.

Psittacus major viridis, maculis luteis et rubris. *Frisch.* pl. 49.

V.

Der große grüne Papagey mit rothen und bleichgelben Flecken und himmelblauer Stirn. Klein Ord. d. V. in 8. S. 47. n. 12. in 4to. n. 16.

Bayerische Staatsbibliothek München

Die

Die Papageyen. (Les Papegais.) 1)

Die Papageyen überhaupt sind kleiner als die Amazonen, und unterscheiden sich sowohl von ihnen als von den Kriken dadurch, daß sie nichts Rothes auf den Flügeln haben: aber alle Papageyen sind, sowohl als die Kriks, Aras und Amazonen der neuen Welt eigen, und werden in der alten nicht angetroffen. Ich kenne eilf Gattungen von Papageyen, zu welchen ich diejenigen setze, die bloß von Schriftstellern angezeigt seyn, ohne daß sie die Farben ihrer Flügel beschrieben haben, welches mich außer Stand setzt, zu entscheiden, ob sie vom Geschlechte der Amazonen, der Kriken, oder der Papageyen sind.

1) Man sieht, daß des Verfassers Papageyen nur eine Familie des ganzen Geschlechts der Papageyen ausmacht.

O.

Bayerische Staatsbibliothek München

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Buffon, Georges Louis Le Clerc <<de>>, / Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm, / Otto, Bernhard Christian,

Herrn von Büffons Naturgeschichte der Vögel

Bd.: Neunzehnter Band

Berlin 1792

Zool. 635-19
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10309551-4
VD18 90198999